


Des Maladies des Voies urinaires

Mdies des voies urinaires — Les mdies qui affect les voies urinaires sont extrem nombreuses — mais non égalem. faciles a connaitre, pas toutes égalem. soumises a l'action des remedes surtout chirurgie. C'est pourq on sbornera les mdies partiel aux reins et ureteres à la. Vessie que sont en rapports chirurgicaux — on examinera plus frequent qui peuvent exiger les secours du chirurgien —

Divisées en trois Classes — on peut les reduire 3 class 1o. toutes lesions organiq des reins des ureteres de la vessie 2. toutes les affectio consistant dans dérangement de la secrétion et de l'evacuation de l'urine.

3 les corps étrangers qui peuvent se former et se trouver dans les reins les uretères la vessie et l'urèthre

1°
Maladies organiques des reins

Maladies organiques des reins

Les reins peuvent présenter différentes affections organiques. ils peuvent être blessés par les corps extérieurs l'inflammation peut s'en emparer se terminer par suppuration produire un abcès qui se prononce au dehors quelquefois, dans la région des lombes d'autrefois s'ouvrent dans les entonnoirs le bassinet et alors la matière purulente est évacuée par les urines

Inflammation des reins

à la suite de inflammation il reste un ulcère. De plus les reins peuvent devenir durs

résultat

sérieux carcinome même mais rarement était mortel = enfin les reins peuvent être convertis en une tumeur volumineuse une kyste une qui peut se - prendre pour une hydropisie enkystée et qui peut donner abondamment l'urine limpide

= Mais le plus souvent ces affections ne se reconnais qu'après la mort et si s'ont promises pendant la vie, mal s'en on presque a y apporter =

= Ce pend examinant les plus grosses de ces études

Les plaies des reins

= pouvant être cause

= Les plaies ont été traitées possible après car les lésions des reins ne présente aucune indication qui les fasse différer du plaies pénétrant de l'abdomen avec lésion d'un viscère

En effet après les viciées les inoltiens lapriques dun tout est fait.

= l'inflamm est une malie qui se rencontre chez quelque peu Jeunnume

Cause de l'inf^tion des reins

= les person sujettes a rendre du graviers ds les urines y sont exposées ou s'appelle aussi de colique nephretique = colique ayant rapport aux colique = Et nephretiq a Cause de son siège ou reins =

Signes

= Signes de cette inflam doul leive entre la coule de l'os des iles et les 2 dernieres fausses côtes, douleur differant essentiellem du lumbago qui siège ds les muscles, ici elle est profonde aigue, avec pulsation continuë ou laissant un intervalle forte court

= douleur prolongée au testicule qui s'en re[?] jusqu'à l'aineau = respirat plus ou moins génée, douleur car la contract du diaphrage sur lequel est le rein pousse cet organe d'où douleur vive qui fait que l'on entrecoupe la respiration =

— fièvre plus ou moins gde = les urines se sep du côté du rein enflammé d'où diminut. de leur q[uanti]té elles sont limpides a cause du spasme la constriction nerveuse qui ne permet passage qu'à la partie la plus fluide - urines [?] =

Terminaison — terminaison

ou par résolution = ou par gangrène = ou par suppuration

= qd la ... n'était pas

résolution produite par des ... irrégulières et que s'élève à terme ordinaire résolution =

= Mais si l'infl. est plus haut degré si la cause irrit. est plus forte profond engagé dans les portions ... du rein et dans les

gangrène conduits excréteurs l'inflam peut être si intense que la gangrène survienne ce qu'est rarement =

= enfin la suppuration

suppuration est un degré moyen entre le degré qui permet résolut. et celui qui produit la gangrène

détermination du pus = Mais le pus est déterminé ou vers l'extér. ou vers l'intérieur =

= qd l'inflam occupe non

ai l'extérieur seulement le rein mais encore le tissu cellulaire

la nature par ses efforts
peut determiner le point de
suppuration à prononcer les l'externe
il Pater a besoin aux boules

Par les urines
= Mais si le point qui supprime est plus près des calices ou si est mal conduite rein formant le obstruit ou le rein. Or ... le pus se determinera par la ... se tirera interieurement puis il sera jeté par les urines

Signes de la determination à l'enterieure
= Si le premier cas la region lombaire est empâtée gonflée et les signes de la chute de bas de la ... douleur ... a douleurs vives de frissons irreguliers de ... ... point une tumeur plus ou moins prononcée =

Cas d'emolliens
= C'est alors le cas d'appliquer des cataplas. émolli. et des ... à maniféster a la suite de la

ouverture artificielle

naturelle

Suitte des ouvertures

Signes de la determi nation a l'interieur

succession exacte des signes
... ... on en tire
beaucoup de pen et même
des calculs cause s'ensuit la
la sudie
si la tumeur est abandonné à la
nature elle prononce au dehors
et s'ouvre mais il reste une fistule
car le pus ne peut s'écouler
mais si on lui donne
bien jour elle peut guérir
mais s'il reste un
cal difficile à extraire
au medecin il peut rester
une fistule on trouve
des exemple de ces fistules
ou l'on a fait des recherches
qui ont permis d'extraire
le calcul ce qui a s'aucun
la procuré la guerison

si a lieu on les
signes ... suppurat
on voit ...
que le ... ...
pour par les urine.

nul doute que l'abcès ne
se soit ouvert à l'intérieur

= mais s'il a tout reste
un ulcère interne qui donne du
pus — le malade souffre
plus ou moins il n'a
souffre par tout que le pus
s'écoule = mais quand
l'urine devient limpide il
est tourmenté de douleurs
de néphrétique très violentes
= on a vu des malades
chez qui cette alternative
se faisait remarquer plusieurs
fois dans le mois =

= un homme éprouvant tous les
symptômes d'inflammation des reins après
[illegible] frisson douleur
obtuse, rémission = bientôt
urine purulente [illegible]
il se remit peu à peu
= tant que les urines étaient
chargées de pus la douleur = il
[illegible] elles devenaient limpides

Ses résultats =

observation =

Que faire? = L'art ici peut bien peu
prescrire, seulement tirer diuretiques, alliagineux ... favori l'écoulement
des urines et l'évacuation
de la matière purulente = mais
si elle se supprime, les aines forment
... la région
des reins =

rein skirreux = quand un rein devient
dur, skirreux il perd sa
fonction mais alors l'autre
effet supplée la sécrétion, on souffre
par =

signes = la douleur, une
tumeur ou de la pesanteur
peuvent faire soupçonner mais
jamais de certitude
qu'après la mort —

Rein devenu = le rein est susceptible
Kiste d'une dégénérescence singulière
... augmentée de volume

il se convertit en une
tumeur prise souvent pour une hydro.. en kistée
= que l'urétère soit obstrué
Cause et Mécanisme (par exemple) par un gravier
qui devient un filtre a travers
lequel l'urine passe difficilement
la partie supérieure de l'urétère
se dilate bientot il en arrive
autant au bassinet, la substance
du rein est écartée
dilatée amincie et devient
assez mince pour ne faire parroitre
qu'une poche =
= Signes
= Tumeur à la partie ou ter inferieure
Signes latéral de l'abdomen
representant un kist rempli
de serosité = un diffi
cile a caractériser qui ne
se connois le plus souvent
qu'après la mort =

Qu'y faire.

= que l'on fasse ponction ou un simple oeillage momentané si la v... se remplit de nouveau ou le vide revient et l'on trouve la poche

= sq. dou cette ... ...
Comme on ne pouvoit y rien faire d'utile et mal hâtivement on voit ainsi de toutes les affect organiq internes que l'on peut soutenir a l'entretien

= on ne dira rien des aberrations de situat des reins de leur volume ...
car la mort seule peut en avertir ce n'est p. méd.

Médie des ureteres

Médie des ureteres
inconnues

= les ureteres sont rarement sujets a des médies qui ne dépendent pas d'un corps étrang ... de leur ...
Cela sera traité en

portant du corps etranger

Maladies organiques de la vessie =

Maladies organiques de la vessie

La vessie est sujette a des affections organiques toujours incurables qui tantot ont des signes communs qui en rendent le diagnostic difficile et on est parvenu a reconnoitre l'absence d'un corps etranger une fois decouvert.
Decouvrir les lesions organiques on n'a que des moyens palliatifs

Vices de conformation

Vices de conformation

=D'abord la vessie peut presenter des vices de conformation qu'il ne faut pas confondre avec d'autres maladies
on ne parle pas des vices de forme des poches particulieres qui ne sont visibles qu'apres la mort et ne sont pas maladies

	= dans lesquels naissent
l'orifice ouverte =	avec une [illegible] la bonne fendue depuis la [illegible] jusqu'au milieu de l'intérieur qui sépare l'orifice du pubis =
aspect =	= dans ce cas la vessie est tendue et les bords de sa fente adhèrent à ceux des tégumens de sorte que continuation entre l'épiderme et la membrane interne de la vessie.
se fait renversement =	= dans ce cas la vessie se renverse, est tirée [illegible] par les efforts [illegible] et elle forme un champignon rougeâtre avec un [illegible] inégal à [illegible] la base duquel sont [illegible] l'urine [illegible] les uretères s'ouvrent en ce lieu =
il y a défaut d'urèthre	= il n'y a pas dans ce cas d'urèthre et [illegible]

regne tout le sang de la verge — les os pubis immobiles & sans d'union — il en a vu lui même deux exemples : un sur un adulte, l'autre sur un petit enfant.

= Ténon l'a observé aussi & en a donné des détails fort exacts dans un mémoire inséré dans ceux de l'académie =

Une preuve à retenir —

= Le vice de conform. est incurable mais il ne faut pas le confondre avec les tumeurs contre nature ou accidentelles car on employerait des moyens qui nuiraient

Sortie des urines par l'ombilic

= on a vu des personnes rendre les urines par l'anneau ombilical avoir un canal

qui du fond de ve[la vessie] porte

Comment cela se fait

à l'ombilic [appellé] il ouraque. Dans l'examen si l'ouraq est un conduit ou un ligament on peut dire qu'il a été un creux et donnant passage aux urines =

Il y a défaut d'urèthre

= Ds les cas observés d'un conduit de la vessie au nombril = où de la vessie [illegible] jusqu'au nombril ou [illegible] = de [illegible]. il n'y a pas d'urèthre =

Traitement

= l'on ne peut remedier qu'en rehabilitant l'urèthre ainsi si une membrane bouche l'urèthre, il faut l'ouvrir puis lier l'espèce de [illegible] qui donne passage aux urines à l'ombilic – il tombe, la plaie se cicatrise, les urines coulent comme à l'ordinaire =

Hernie de vessie

la vessie peut se deplacer c'est hernie de vessie
— on considere sa situation assez sure on est tenté de croire qu'elle ne peut se deplacer elle est plongée ds le tissu cellul. du peri qui semble la tenir ferme. Ce pend exemples nombreux de deplacements =

Lieux où elle se fait

= elle peut se deplacer au dessus ou au dessous du Pubis
= au dessus = par l'anneau inguinal ou p. l'arcade crurale =
= au dessous peut refouler les parois du vagin prend ds toute vaginale = aussi ceu que ds l'homme elle peut ecarter fibres d's muscl et venir au perinée produire une cistocele

Au dessus du Pubis — Comment fait elle saillie au dessus du Pubis ? =

= lorsqu'elle conserve sa place et sa forme médiocrement rentrée derrière les os pubis elle ne peut s'en déplacer =

Causes — Mais qu'elle soit distendue énormément pour il arrive aux personnes paresseuses d'urinera ou qui distraites négligent d'évacuer leurs urines — qu'à la suite de ces retentions elle devenue foible relachée ne se vide pas complettement = ses parois se dilatent alors si l'anneau est déjà relâché les efforts des muscles abdominaux peuvent l'engager dans l'anneau

naire =

alor elle form une calebasse
dont la partie étroite est
en dehors de l'anneau
= quand sa partie antérieure seulle est
sortie elle ne pousse pas le péritoine donc
a t elle un pas de sac herniaire
sac = = mais qd la vessie est
considérable que la partie antérieure
entraine la partie postérieure il peut y
avoir un sac et les intestins
et l'épiploon peuvent
s'en être entrainés et la hernie
complicatius compliquée de tout cela
— = qd donc la vessie est dilatée elle
peut sortir si le mal reste couché
sur un côté, s'il
rappel du fait des efforts extérieurs pour
uriner. et en effet
mécanisme cela arrive a ceux qui
seva ont la vessie faible
partie parce qu'ils font des
— efforts avec le diaphragme

Et les muscles abdominaux
pour comprimer la vessie et la
forcer à se vider puisqu'elle ne
peut le faire par son propre
ressort = c'est pendant ces efforts
qu'elle peut s'engager dans
l'anneau ou dans l'arcade
crurales relachées =

Du 14 messidor

= il faut ajouter a l'étio
logie de la hernie de la
vessie que la vessie peu adhé
ant [illegible] basin est
susceptible de reduction
= mais à mesure que
les portions voisines s'allongent
devant le [illegible] elle devient
de plus en plus adhé-
rente [illegible] et sa reduction n'est
plus possible. C'est alors qu'elle
prend la forme d'une calebasse
dont les bouts sont séparés
par l'anneau =

= La hernie par arcade
crurale est plus rare
que l'inguinale = la
crurale
... naire =

inguinale
plus frequente
que crurale =

il a été vu que chez les
femmes où l'arcade crurale
est plus ample que l'anneau
– D'ailleurs chez celles qui ont
eu des enfans la vessie est apoplatie
comme un Baril s'étendant
sur les cotés jusque vers les
arcades crurales

= signes des hernies de

vessie = tumeur oblongue descendant plus
ou moins, molle contenant
un fluide, fluctuante – plus
volumineuse de long temps
sans uriner que qd. urines
récemment rendues =

Signes

– si comprimée rentre tout
par pression, mais tout se
perd dans toile où les mains
elle rentre peu à peu et
non tout à coup comme
une hernie intestinale l'envie d'uri
ner est procurée par
cette rentrée =
= ces signes manquent à coup
sur la fistule inguinale

on ne confondra pas avec l'hydrocele =

— Ds hydrocele la tumeur ordin.t (Hydrocele vaginale) monte rarem. a l'anneau = si elle y monte quoique fluctuante elle est irréductible la pression n'y fait rien = la distension reste toujours la même ds l'hydrocele et par consequent la plénitude — tandis que dans la hernie de vessie la plenitude varie — D'ailleurs l'envie d'uriner se fait ici sentir plus souvent car la portion intra-abdomi étant très diminuée elle est promptem. remplie =

Comparaison avec l'hydrocele

— on la distinguera de la hernie intesti-entérocele

— Dans l'intestin par la fluctuation quoique locale sa réduction se fait tout d'un coup avec gargouill. sans envie d'uriner provoquée

avec la hernie intestinale =

naire =

tandis que la reduction de la vessie
s'è fait seulement par ce que
le liquide ne peut être ceci
a l'exterieur ... ...
et en outre par ... qui ...
apres la reduction
= Malgré la clarté de
... il y a des
exemples de ponction de la vessie
... pour une ...
il en est resulté fistule
par le ... on ...
de ... de la vessie

Arrtoaeles avec des calculs = Vessie

= ... la vessie
de vessie contenant des calculs
= on ... comment que le ...
... à l'interieur
par leur ... et ...
arrive qu'ils ...
le detroit de communication
et l'empeche ...
l'urine, et ...
en ayant eu ... egard aux
... rendus p. le canal

de l'urethre ou tact a.
la dureté, intie ou douleurs
les symptômes, Q̄uin se connoît

Pronostic des — Pronostic
Cistoceles — cette hernie est peu dangereuse
mais, non incurable.
=
indication
— réduire les urines ou
faire passer l'urine entre dans
la portion de la vessie intra-

Traitement — abdominale = réduire
la portion ôtée de la
=
vessie = contenir pour
empêcher cette hernie récidivée =
= la réduction n'est possible
que dans les hernies récentes

Anciennes — et peu considérables dans
irréductibles — ces cas connus les anciens
= n'ont eu recours à
l'art que fait tant
la hernie étant ancienne et
adhérente =

naire =

= alors on réduit bien
l'urine, mais on sent
les membranes molles ce sont
les parois de la vessie
— il faut soutenir cela

Bandage — par un suspensoir bien — fait-on avec
un bandage à pelote concave = quelquefois
peu à peu on fait rentrer
un peu mais jamais tout
réduire mais on peut vivre
long tems ainsi réduit

= si il s'y trouve un
calcul. ouvrir les teguments

Si calcul incisée — et la vessie et faire l'extraction du corps étranger,
operation d'autant moins dangereuse que la taille qu'on
seroit obligé de faire si son réduisait.

= pour éviter fistule

Route chemin des urines — bande élastique de la vessie pour chemin urinaire

= si l'étranglé p. pierre
Calcul engagé ou détroit, incisez la portion
dans l'anneau de vaine formant la
tumeur dégagez le corps
= étranger et si impossible
de couvrir l'anneau le
de laissez qui étrangle
calcul —
= cela vaut mieux que
ponction qui ne fait que
enlever l'urine inférieure
mais qui ne détruit
pas la cause de l'étran-
glement —
Cystocèle avec = Cystocèle à compliquée
intestin étranglé hernie intestinale étranglée
pratiquer l'opérat de la
hernie comme dans les
cas ordinaires ayant égard
à la vessie qui est dernière
bientôt se trouvant de rien
ne tranchez — rien pour
l'irriter —
Cystocèle = La cystocèle crurale
crurale = offre mêmes indications
... naire —

Cistocele au dessour du Pubis

hernie de vessie au dessour du Pubis =

La vessie peut faire hernie au dessous du Pubis par perinée de l'homme et par le vagin de la femme.

Par le Perinée

= quoique cette hernie du perinée semble impossible on en a cependant des exemples =

exemple

= un homme fit un écart sur le parquet d'une salle dont au perinée en sautant une fosse, outre écart d'ailleurs idem = douleur augmenté tumeur a coté du raphe a coté de l'anus la longueur devenu devant peau non changée tumeur indolente ou toujours qui comprimé causait envie d'uriner il était urinée tumeur ..u Cone ce

alors
rétenie elle dès parroissait
et le contre urine s'étoit = on la
tirait sortie a travers l'écartement des
... de reléver de l'ami

= pour cette tumeur que
la Mort, elle aurait
peu ... au ... de
... ... qui
qui la fit disparoitre
mais elle fut guérie ...
ment

= vu cette des ...
du Périné sur le ...
les derniers terme de la
grossesse
= entre la ... et l'anus
sur la partie latérale du ...
= oblongue sans change
de couleur a la peau mollasse
fluctuante - disparoissant
a la pression avec sortie
d'urine
= cette tumeur disparoit
après l'accouchement

vue chez
la femme

Vigner

naire -

Cistocele vaginale

hernie de vessie dans le vagin =

La Cistocele vaginale est rare mais on en a vu exemples =

= elle se présente de 2 manières

= ou le vagin est renversé dans

avec renversement du vagin

une chute de matrice et le vagin est entraîné d'où tiraillem douleur d'urine envies d'uriner impossibilité de la faire mais ce n'est pas la indic principale voyez les déran gements de la matrice =

Sans renversement cisto ordin

= La vraie cistocele vaginale mentionnée à la partie antérieure du vagin contenant liquide [illegible] le bas fond de la vessie qui tient fortement au vagin paraît avoir moins de résistance de ce côté que la vessie pleine [illegible] les parois de

vagin et meme peut le
boucher et sortir la vulve =
= tumeur plus ou moins volumineuse
molle. en pressant on excite le
besoin d'urines et quand la

Signes

Malade veut d'uriner s'il l'on
presse la tumeur on en fait
rendre d'avantage
- elle cause des ardeurs d'urines - puis les
conque...ues de urine
en... est supri... =

Pronostic =

Pronostic

on peut vivre long tems avec cette tumeur
mais si la ... est exposé a faire des
e... le vagin affoiblit
la tumeur sort au dehors
et cela devient dangereux

traitement =

traitement = on peut pousser
en bourdon lein

... maux -.

l'onteur (ut supra)
ordinaire les femmes refusent
de s'y assujetir il n'y
a que qd la mdie a fait de
grands progrès qu'elles
s'y resolvent =

Poches vesicales =

Poches vesicales

= Outre les de f. la [illegible]
on a vu [illegible] autres
vices d'organisat. dilatation
d'une portion de la membrane
vesicale entre les colonnes
formant d'une poche
plus ou moins gde. et où il peut
se renfermer des calculs.

Fond enfoncé

enfoncement du fond =
Ede outre le fond l'experience
le sommet de la vessie sort.
ou enfoncé dans le corps
de la vessie formant
un tumeur [illegible] dans [illegible]
vessie
et à l'exterieur une cavité
proportionnée

les intestins, ils logent
et produisent le retrecissement
et la pression des ... &c.
= les ... pierres et autres
... à leur des
calculs on se determine
à l'ordinaire = en sondant
on sent la tumeur
cette tumeur en a imposé
au point de faire croire un
calcul et faire faire
l'operation =
= ... rapporte
qu'un vieillard éprouvait
des envies d'uriner et de la
dysurie, ou dans ... le faisan
on le sonda on sentit un
corps que l'on prit pour un calcul on
voulut le tailler il
mourut sous l'être = on ouvrit
on trouva la vessie
... enfoncie, formant
à l'interieur une poche
qui logeait des intestins.

Crainte de
prendre cela
pour un
calcul
=
exemple

qu'y faire | ceq. d. un . auparavant cette lui dit, rien a faire mais on empechait de tailler et de tourmenter le md. par des remedes inutiles

relachement et sortie de la membrane interne de la vessie | enfin on a vu la membrane interne de la vessie chez les femmes se relacher et sortir au dehors par l'urèthre former une tumeur que l'on a quelquefois excisé que l'on a pris pour le bouton fongueux indiqué plus haut

erreur | en general qd il paraît là des tumeurs molles et fongueuses il faut examiner si elles sortent de l'urèthre ou si elles naissent des environs car dans le premier cas danger d'exciser et le second avantageux de les cirer

= Les parois de la vessie sont exposées a l'inflammation — gangrène à l'épaississement — aux fongosités — à l'inflammation ~~[illegible]~~ de la membrane interne ~~[illegible]~~ ulcération de cette membrane — varices = épaississement de ses parois =

du 16 messidor

Maladies des Parois de la Vessie

= Maladies des parois de la vessie

La vessie peut être affectée dans ses parois de diverses affections dont tous les symptômes presque tous du moins sont communs à presque toutes ses maladies, d'où un diagnostic difficile pour chacune d'elles =

= la muqueuse interne
y (?) plus d'engorgée (?) epaissie
et qui engorgée irritée
v (?) folicule muqueux sécréter
abondamment secrétion
et les urines rendent tantôt
claire, tantôt contenant une matière
muqueuse, gluante, filandreuse
qui varie chez les
[illegible] = cette catarrhe
de la vessie

Catarrhe de la vessie

= d'autrefois les parois
de la vessie [illegible] épais-
sies plus ou moins également
et s'ont engorgées = sa
capacité diminue même
tems = les colonnes
charnues qui naturellement
v (?) un peu
rendu (?) interne, sont
très saillantes et la vessie
est [illegible]

Epaississement des parois de la vessie

engorités qui ne sent-
ent être bien, et en ont
imposé pour des calculs
dans les cas d'épaississe-
ment d'engorgement, de rétrécissement
de la prostate urines sur
elles, peu, abondantes de gros sont
ou dépôt du nuage une
matière glaireuse uniforme
ou filante comme
du blanc d'œuf =
— ceci n'a pas été
des nombreux symptômes
tous à peu près communs
aux affections de la prostate
— quelquefois l'intérieur
de la vessie a des
points d'ulcération d'où
se coule une matière purulente,
que les urines entraînent,
qui se ramasse
quand elles sont refroidies =

Ulcère de la vessie

ce appelle un ulcère de
la vessie peu observé ayant beaucoup de rapport par ses
les symptomes avec les maladies
précédentes =
= il vient des polypes
de la vessie, des fongosités qui ressemblent à celles
du nez, de la matrice
du rectum — des polypes qui
diffèrent par leur situation-volume
- forme de la partie
adhérente à la vessie — par
consistance — étendue
et nombre = leurs
symptomes ont encore de
analogie avec les précédents = mais ils présentent
des particularités qui peuvent
les faire reconnaître
sont peut être les plus
dangereux conduisent promptement
à la mort =

Polypes de la Vessie

Dans ces diverses affections chroniq qui font traîner une vie misérable pour conduire plutot ou plus tard à la mort il se presente des symptomes communs que voici urines fréquentes et en urinant, douleur tout le long de l'urethre et qui est rapporté quelquefois à son extrémité = difficulté d'uriner ... quelque fois besoin toutes les 1/2 heures les quarts surtout la nuit la sortie des urines est plus douloureuse quand le dernier ... est rendu en même temps il paraît comme une ... cuisante qu'on peut s'en ... totalité sans qu'elle se ... paroi

Symptomes communs

= les douleurs augmentent peu
à peu - privation alors
entière de sommeil
d'où marasme d'autant
plus prompt que souffrances
plus grandes et insomnie
plus considérable - envie d'uriner
se reproduisant souvent surtout
la nuit.

= tous ces symptomes
difficulté d'uriner sentiment
etc supra à se montrant
examiner les symptomes
concomitans pour voir à quelle
lesion organique il faut les rapporter
= d'après leur existance.

= on peut soupçonner
- un calcul = un catarrhe
- ou encore des parois
ou un [illegible] diminution
du calibre - ou fongo
sité - ou bien un [illegible] médian
de l'urètre qui fait éprouver
aussi

ce quels peuvent faire soupçonner

la plupart de ces symptômes —

= Mais comment au milieu de toutes ces symptômes semblables distinguer les diverses? = D'abord si on s'informe si le précédemment gonorrhée virulente s'il a passé gonorrhées il a toujours uriné à plein canal, si par suite graduelle du jet = s'il urine bien ou au filet d'urine si quand il urine écarte l'idée d'un rétrécissement = si au contraire envie fréq. d'uriner qui nécessite des efforts grands lesquels font sortir l'urine goutte à goutte ou en bavant, ou à jet fourchu

Signes de la coarctation de l'urethre à exclure

et sentiment de gène a la region de la vessie - on juge qu'il y a retrecissement et que la vessie ne se vide jamais completement

= les urines alors peuvent faire croire un cattarre parce qu'elles deposent un nuage blanc jaunatre. ... de l'urine qui se précipite au fin -

erreur

= un homme de 38 a 40 a eu differentes gonorrhées traitées differem. quelques unes par les injections - peu a peu jet des urines diminue effort pour uriner - douleur ... hypogastrique - urines deposent abondamment ... vesical

exemple

– L'éjaculation se faisait intérieurement mais la contraction, d'ailleurs ne poussait pas le sperme au dehors –
= il a consulté = les uns bains les autres pillules &c. enfin un médecin qui lui prescrivit les eaux de Barrège pour un catharre ou un ulcère de la vessie qu'il soupçonnait – sur cette proposition il consulta Boyer qui reconnut non une affection de la vessie proprement dite, mais un retrécissement de l'urethre = il proposa une sonde – elle fut introduite, elle arriva à peine au milieu

en Parmée ou un obstacle
se présenta — il retira.
Conseilla des Bougies
d'abord petites puis
augmentées graduellement.
— il n'alla point à
Barrège et guérit par
l'usage des Bougies
— Voilà qui distingua
l'coarctation de l'urètre
— Mais si gros jet de
l'urine pas de gonorrhée
Mais que je voiture
équitation marche sur
terrain raboteux et y
ait douleur a la vessie qui
y répond vivement
idée de pierre ou de
de calcule — il faut
sonder —

Ce qui exclut la coarctation

= Car la Pierre pouvant
produire tous ces symptômes
il faut s'assurer de sa
non existence avant de conjecturer =
= Exclure le Calcul = autre éd. ? vraiment
l'ordre est ainsi = en
touchant on sent malgré la vérité
la sonde cause
douleur, fait saigner,
ne sent point
de pierre - on juge
qu'il n'y a pas de
Calcul. mais qu'il y a
ou épaississem= ou fongus-
ou ulcère= ou catharre
= telles sont les in-
= Décider sur les 2 indications suivantes = sur lesquelles il faut
choisir =
= le fongus se sent
avec la sonde il
Le fongus a tant de résistance

	qu'on n'a peu pu
eviter une	un Calcul et que l'on
erreur –	a taillé = cela est arrivé
	à Lion = où l'on trouva
Exemple	un polype à pédicule
	etroit qui fut arraché
	le mde guérit =
	= q fois ds le polype
	la fongosité arrête la
Signes	sonde à l'entrée [in la derangé] et elle
Du Polype	passe en arriere = D'autres
	fois on en juge par la
	difficulté à la promenée
	ds le cerné & à la
	detournée –
	= un hom avait eu des
Observa-	frequentes d urines rendant
tion –	une u blanc comme de pus
	du foie

même du morceaux du sangsue — la sonde introd entre la tumeur et les parois de la vessie impossible a mouvoir = retirée et poussée par l'autre côté de la tumeur, elle passa librement et peut être promenée = on jugea un fongus = après la mort l'ouverture du mal qu'on ne s'était pas trompé — il était volumineux = on pourrait donc

résumé des signes

par la résistance de la sonde par la sortie d'une substance noire liquide reconnaître s'il y a un polype non fongueux dans la vessie

= Mais, s'il n'y a pas de
polype, peu de sang =

Signes de l'épaississement des parois

vessie rugueuse avec calculs = Sortie
beaucoup de mucus — urines
fréquentes on suppose une
épaisseur et racornissement —

= si douleur très vive
en sondant surtout s'

Signes de l'ulcère

un point très douloureux
de la vessie = si
il y a évacuation d'une humeur
purulente non filante
(ut dixeram) on suppose
ulcère de la membrane
interne de la vessie

= si la vessie est moins

Signes du catharre

sensible moins rugueuse
qu'il n'y a pas de pus mais
beaucoup de mucus
filant — engorgement de

la Membrane interne qui
filtre, forme dans le coriza,
une très grande quantité
de mucus.

= Malgré ces differ-
ences de symptomes

incertitude le plus souvent

on peut determiner difficilement le plus souvent, quel
est le vice organique
= (p. ex.) on peut
bien exclure la coarctation
de l'urethre = le polype, le
cancer. Mais les autres sont
difficiles a distinguer entre
eux.
ou reste que faire
quand on les reconnoitrait?

= Desault la reconnoissance

Prognostic sur toutes ces maladies &c.

incurable = si les symptomes
malgré qu'on ait augmentent et
conduisent le Malade a dee

a plus forte raison
le polipe, les ulcères &
ut. il a des ... incurables
en peine même peut ou soulager
que les maladies = par
= ... effet ... excité
une ... expression au tonne
que l'on puisse essayer
Que faire . de repousser au ... dehors ... que
les remèdes ... évacuans ... appli
ques = tous soit
les ... les boissons ... les
... ou ... = & contrefois
des remèdes plus actifs ... la
... sur ... tique la
racine d'arnica ... =
= souvent on peu de ... après
Effet des ... un ... soulagement
remèdes ... retombent et finissent
par ...

= ou a donné
Souvent on voit l'opium
et l'intérieurement même
en injection dans
plusieurs ouvrages
ou cy persistera
Vices de l'excrétion des urines
Vices de l'excrétion des = urines =
de toutes les maladies
des voies urinaires les plus
fréquentes sont les vices
de l'excrétion des urines
Ce liquide qui doit
faire un grand chemin depuis
par les reins jusqu'à la vessie
peut rencontrer divers obstacles
par un grand
nombre de causes
qui donnent lieu aux
accidents qui suivent la
suite de leur rétention

de la retention d'urine

La Retention d'urine merite d'être examinée avec soin à cause des suittes qu'elle peut avoire

— Denomination —

La retention d'urine est tellement significative par elle même qu'une définition seroit inutile — c'est

deffinition — l'arrêt du cours des urines soit qu'il se fasse dans les reins, les ureteres, la vessie, ou dans tous ensemble.

Differences — on a donné à la retention divers noms indiquant ses differens degrés —

dysurie — Dysurie que les urines coulent difficilement avec douleur besoin freq. d'uriner

strangurie — Strangurie degré plus avancé où les urines sortent goutte à goutte par un petit filet

135 Ischurie — Ischurie q^d les urines ne sortent nullement = la vessie etant distendue avec ardeur fréquentes d'uriner que l'eau ne peut satisfaire =

Siege de retention — = les urines peuv être retenues ds les reins les ureteres et la vessie et quand elles ont retenues ds cette dernière elles peuvent à la longue s'accumuler aussi ds l'uretère et le rein.

retention ds le rein — = la retention dans le rein independante des autres est extrêmement rare. de la plus g^de obscurité, il n'y a aucun secours chirurgical a y apporter on n'a rien dit mais on acceptera

tournement de la retention dans la vessie il resulte accumulation dans les ureteres et dans le rein =

retention dans la vessie

= la retention de la vessie depend de diverses causes qu'il faut examiner avant de rendre comptable ses effets et d'exposer ses signes =

Causes

— Causes de la retention d'urine dans la vessie

Deux conditions d'evacuation

= pour les connoitre se souvenir que l'etat naturel deux causes sont essentielles a leur cours et a leur sortie libre

1re Condition

= 1o. il faut que la vessie jouisse d'etre pourvu de contraction en vertu de laquelle elle puisse presser de toutes parts les urines alors forcées a s'un par [illegible] de resistance par l'uretre

cette faculté reside dans ses
fibres musculaires et est aidée
du concours des muscles et
des viscères de l'abdomen
= 2° = la 2e condition est

2e condition — que le col de la vessie
et l'urethre n'offrent
f contre resistance que
celle qui resulte de leur
elasticité et de leur
force naturelle laquelle
peut être surmontée par l'impulsion
que la vessie imprime
aux urines =
Cela posé cherchons
les causes

classification des causes — = on peut les ranger en
plusieurs classes
1° = les unes dans le corps
même de la vessie
quelque affection de ses
parois
2° — les secondes ont leur
siège au col dans
son epaisseur

3° les z... et l'étendue
de l'urethre dans son épaisseur
4° les ... de l'urè... les corps
extérieurement à la vessie autour
de son col de l'urethre
5° Et enfin les ... renfermés ... la
cavité de la vessie
soit dans celle de
l'urethre. =

1re classe
Causes des parois du corps
— les Causes du corps
même de la vessie
agissent ou en ... la contractilité
ou irritabilité ... =
bien que lui étant cette
irritabilité cette faculté d'agir
= or deux ... différentes
agissent ainsi — ...
... contre l'irritabilité ...
contre ou la détruisant.

2 indic
= ... l'inflammation
du corps = contre la
paralysie —

inflammation du corps de la vessie — L'inflam est rare mais q^d elle a lieu elle empeche comme par tout ailleurs la contract. des fibres musculaires et ainsi empeche l'expulsion des urines ainsi la vessie se remplit elle, urinaire

— Cette inflamm est produite ses causes ordinairement par la percussion d'une humeur qui se porte a l'interieur par cantharides &c.

— on transporta a la charite un jeune

observation homme qui s'etoit repercute avec de l'eau vegeto-minerale une dartre de la cuisse — elle disparut aussi tot — douleur hypogastrique, fievre tout cela augmenta pendant huit jours. Excretion des urines impossible.

bientot etat deplorable
— Desbois de Rochefort
medecin alors de l'hopital
de la Charité conseilla vesicatoires
sur la cuisse pour rappeller &c. après
les bruler — tout cela fut
sans succès — on le
sonda, il fut point
sans soulagé la douleur
continuait mourut
on trouva la vessie
rouge enflammée —

traitement de l'inflammation — — on juge que dans ces
cas les saignées les bains
les lavements emolliens les
cataplasmes sont les moyens &c
que la sonde doit être
promptement introduite pr. évacuer
l'urine alleger l'inflammation

Paralysie de la vessie — — La Paralysie est beau
plus fréquente —
— Causes
elle depend de diverses

Cause de la Paralysie

—

1° cause Commune à tous les ages

=1°=

affections de la moele epiniere

—

par les fievres malignes

Causes dont il nous a paru convenir à tous les ages — les autres à la vieillesse au point que la relaxion est regardée comme une des indices de vieillesse = que la 1e fois ayant premiere depend d'une affection de la moële de l'epine des nerfs qui en partent et vont à la partie = la cause de cette affection de l'epine est tantôt une matiere morbifique qui se porte sur les nerfs, tombe directement sur les nerfs et à ceux, d'où paralysie — il est ordinaire de voir les person attaquées de fièvre maligne avoir probablement tendu la vessie tombée maintenant à l'ombilic empêchant d'uriner parce que la cause morbifique a agi sur les nerfs, s'a paralysé et a produit leur inertie

conte d'attention on peut prend
cela pour le meteoris du ventre
et negliger un remede vrai
capable de remedier
= Ceux qui fréquentent
les hôpitaux ont occasion
de s'assurer de la fré-
quence de cette affect quoique
les auteurs aient peu
parlé = il a vu des
gens attribuer cette tumeur
de l'abd au metoris
il vouloit et evacuoit de l'urine
avec abondance
= un tailleur demeurant
rue de Seine a la
suite d'une fievre senti
le ventre distendu surtout
inferieurement = on attrib. cela
a de l'air mais
en appuyant sur le ventre
il se plaignoit d'une douleur
en urinant car
il n'avoit pas de connois
sance.

Sa frequence

Observa-
tion

apud on trouve grande
quté d'urine, réellement
et le prétendu [illegible]
me tomba

= il faut donc examiner
soigneusement le ventre l'hypo
gastre [illegible] et
si la vessie paraît
distendue bien dessinée
au [illegible] — cette para
lysie n'est que momentanée
elle s'est dissipée avec
la [illegible] = mais elle
annonce que la maladie est
extrem grave et prouve une
lésion profonde du princip
des nerfs. —

attention à cette cause

= Si les apoplectiques
souvent la vessie se
trouve paralysée
il faut donc visiter
examiner la vessie

pour l'apoplexie

Et si on la i a été descendu
au la ronde de terre
en terre ou au la carrille
s'est laissé re ariminant de la
devenir de terre a autre

= les cou 8e poiriergement
sur la moelle gle
Le premier des nerfs qui
qui partent sous la corde
de lesion organique sensible
a l'ouverture des cadavres
mais on voit qui agissent mecaniq

par la
lesion
traumatique

= Mais l'ébranlement de la moelle de
l'epine, la distension de
cette moelle des
mouvements forcés de la
colonne vertebrale
est fréquemment cause, non
seulement de la paralysie de
la vessie. mais encore des
extrémités inférieures

ébranlement
et distension

..me ..hute ... en gestes
..me ... de la
..rale. ont été vue par Boyer
produire tous ces accidents
= un Officier Jribout
en s'amusant avec ...
Observation ... des tours de force
il s'employait ...
ment, il éprouva des douleurs
... le lendemain les
douleurs ... de se dresser
foiblesse paralysie de la vessie
et des extremités mort
= D...tes Cest la
Compression ... sang, épanche-
ment = une vertebre fracturée
Compression = une ... de la Colonne
paralie qui produit ... courbure ...
Courbure de la ... la direction de la
Colonne moëlle la compriment
ainsi que les nerfs qui
en partent ... independamment
d'elles la
= la distribution ...
me

=2=

distension de la vessie — Les fibres de la vessie donne lieu a Paralysie de cet organe fait perdre aux fibres leur vertu contractile

ou prompte — Cette distension peut avoir lieu en peu de temps — ou se faire graduellement en plusieurs années

ou lente —

distension prompte — Lorsqu'on n'obeit pas a besoin d'uriner, que les urines s'accumulent en vessie elle perd une partie de son action et quand on veut le satisfaire on a plus au moins de difficulté la vessie semble se reposer ou plus a plusieurs fois — en fin a un degré de distension plus grand l'expulsion devient impossible

effets

Cette distension peut donc
~~[illegible]~~ produire la paralysie
qui ~~[illegible]~~
chez les vieillards et quelquefois
in aura — ainsi Tichobrahé ayant
retenu par decence ses
urines est une diète
exemple
il voulut uriner il ne
put — lui l'un par de
la vessie rien ne put
le sauver

= si donc la élasticité
est portée loin paralysie
en [illegible] la sette cependant on a de trop bien
de lui rendre son élasticité

= la [illegible] agit
distension autrement —
= les personnes fort occupées
les personnes paresseuses d'uriner
n'obéissent pas au
besoin — peu a peu
la distension s'accroit

tente

de temps en temps le besoin d'uriner, [illegible] ils éprouvent ... cette ardeur, enfin elles urinent de [illegible] ... par [illegible] ... promptement et les mêmes causes continuent d'agir dans ce parage =

= les personnes avec cette habitude jeunes, fortes, vigoureuses ... mais ... elles ... parviennent à l'âge où les facultés de la vie et surtout l'irritabilité musculaire commencent à tomber, elles ... dans l'impossibilité d'uriner =

traitement = Consulté par les personnes = leur conseiller ... ... en leur peignant les accidents qui les menacent dans l'avenir

leur dire
de mettre un corps
froid sur la particulier l'experience
des cuisses =

= un marchand
de vin dit Petit
avait de la peine urine
Observation disposition a la paralysie
= Il Petit lui conseilla
de mettre un pot
de chambre dont va
casse de rien tendre
devant pour urinee
et il appuya le pot
de chambre sur ses
cuisses — Cela reussit =
= tout autre corps froid
aurait le même effet =
= quelque fois quand
un vieillard est pris
brusquement d'une paralysie
de vessie dont on
ne peut connaître la source

2e Classe
Causes de
l'épaisseur
du col

Du 18 messidor =

2e classe = Causes siégeant dans l'épaisseur du col de = la vessie et autour

= deux indications le col de la vessie s'opposent à la sortie des urines et conservant son action

= l'une est l'inflamm. du col de la vessie = l'autre l'engorgt. squirreux de la prostate

Deux causes

= l'une et l'autre agissent en rétrécissant le diamètre de l'ouverture du col, par l'épaississement de ses parois en leur donnant une force qui ne leur permet plus de céder à l'effort des urines, =

= il ne faut pas dans le cas un gonflement bien gd pour produire la rétention le plus léger suffit car les parois se contract et les urines

qu'il ont obligés de les écarter
[illegible] Partie alors
les urines ne sauvant
(ut supra) la resistance

inflammation du col de la vessie

= L'inflam du col fréquente
aux person sédentaires et
ou les bains [illegible]
et le plexus vesical
se trouvent constamment
engorgés = mais les
les person que la pléthore
dispose — la ... est déter-
minée par des causes internes et exter-
nes

Causes internes

= parmi les causes
internes se trouvent
d'une humeur qui porte
là irritation, ... affecte
les humeurs et la sensibili-
té d'où inflam... les parti-
cules âcres des cantharides qui
par une affinité parti-
culière

repercussion. âcre

Cantharides

par leur action sur le col ext produit sinon retention du moins dysurie

gonorrhée

= la matiere irrytante d'une gonorrhée qui est fois telle qu'elle affecte le col et produit l'inflam— a la verité cela n'arrive que dans les gon— très veritables très vigoureux chez les person sanguines qui ne veulent pas s'assujettir à un regime

Causes externes

=

Sonde

— Causes externes sont l'introduction d'une sonde qui irrite déchire la membrane interne - irritation qui ajoutée a une cause de retention sanguine et necessite quelquefois la ponction =

Cathéretiques

— = l'usage des catérétiques et des caustiques dans le sac de détruire un engorge du canal supposé [illegible]

Skirre de la Prostate — = Mais lorsque Skirre de la Prostate a la suite des chaudes pisses irritées produit elle son exquise retention en pressant les parois l'une contre l'autre

par la gonorrhée — = lorsque la gonorrhée a ses profondités l'urèthre d'ou il conduit jusqu'au cou de la vessie elle peut donner lieu a l'engorge de la prostate qui produit la strangurie laquelle se convertit en ysurie

Progrès — = Cette retention se produit par des progrès insensibles d'ysurie — d'abord puis strangurie l'urine goute a goute avec effort et ... l'art et le regime

determine la [illegible] [illegible] vers le col de la vessie les urines [illegible] completement retenues

= Pronostic de la retention par engorgement de la prostate

Pronostic — = Heureusement les plus [illegible] [illegible] ont rendu [illegible] urines avec peine ou a porter des sondes = mais la nature peut recourir produire la fonte [illegible] de la prostate [illegible] par les urines ou s'ouvrir des [illegible] et sortir avec les matières fecales =

Causes Supposées

Flaccidité

L'affaissement des Parois de l'urethre est regardé comme cause de la retention mais peut il en être la cause [illegible] qui n'existe pas ou

De l'urethre — qui excite — il — soit incapable de produire cette maladie — on a vu (par exemple) que chez les viellards la flaccidité de l'urethre produisait par la retentention a plus ou moins volonté long tems l'excrétion de l'urine

explication — = pour le convaincre du contraire il suffit de reflexions suivantes = dans l'état naturel pas au moins — les parois de l'urethre se touchent, sont lubrifiées par l'humeur des follicules muqueux — en conséquence de cette juxtaposition il faut que les urines poussées par toutes les puissances qui les expulsent, les écartent pour se faire jour

preuves du contraire

ne se voit que par
que quelque plaques
qu'elles soient à la vessie
la ressort elle vaincra
d'autant plus facilement leur
résistance qu'elles seront plus
relâchées =
= les vieillards sont sujets
Vraie cause de la rétention des vieillards — à la rétention parce
que l'irritabilité de leur
vessie est détruite et
qu'il ne lui reste
plus assez de force
pour pour se contracter suffisamment
= on a regardé comme
état variqueux de l'urètre — cause l'état variqueux
de la partie spongieuse
de l'urètre ou celui des
vaisseaux et de ceux du
bulbe — depuis la
pointe de la prostate
jusqu'au gland = il
ne serait pas à la dilata-
tion variqueuse des vaisseaux de l'urètre ils sont trop
petits et s'ils venaient
Cela est faux = distendus formeraient empêche-
raient-ils l'urine de passer

Quant a la debilité du tissu spongieux de l'urethre elle n'est pas plus d'un auteur mais qd il y rentrerait du sang il n'y en aurait jamais assez pour empecher l'inflammation = dans l'érection extrême par très violente le tissu spongieux de l'urethre quoique très gonflé n'empêche pas que l'urine ne se viennent le passage quoiqu'elle ne peut difficilement

preuve du contraire —

Mais on cite en preuve de la débilité variqueuse des vaisseaux de l'urethre et de celle de l'autre tissu des exemples

qui ne paroissent pas
concluants = on se fonde
sur le pretendu degorgement
de l'urettre — tel est l'exemp-
le de jean Louis Petit

= Petit rapporte
qu'une personne avait une retention
d'urine petit ne peut
la sonder il le fait saigner
beaucoup — il recommande
le bain se disposant a essayer
de nouveau le malade va chez un chirurgien
qui le sonde = le
lendemain chirurg. ne peut le
sonder et petit appellé le
sonde aisement = de
on a conclu que le
degorgement du tissu
sanguin avait facilité
l'introduction de la sonde
= mais on sait que
malgré que très souvent
le sang coule

Observation

fois on ne peut
l'avaler — et l'on
dit de plus que
pour que quon fasse
faire des plis à la
membrane la difficulté
augmente

il ne croit donc
pas que l'état variqueux
de l'urethre produise la
retention

Mais il est une
autre cause très réelle
et très fréquente

~~[illegible]~~

Cause fréquente Coarctation de l'urethre — C'est la Coarctation chez les personnes qui longtemps ont éprouvé des gonorrhées virulentes — bien souvent la gonorrhée entraine après elle un rétrécissement qui va croissant et qui

a la qui peut obliterer
en entier l'uretre
— on ignore pourquoi des
les yeux veillez les person
des tout age s'ont exposées
a cette retention

il n'existe point de carnosités — on a supposé des carnosités dans la vessie mais beaucoup des cadavres n'en a pas montré — Morgagni n'en a pas vu — Hunter n'a trouvé qu'une seule fois une végétation vermicale

point de brides — d'autres ont cru qu'il se formoit dans l'urethre des cicatrices qui le retrecissoient — d'autres qu'il s'y formoit des brides

— mais des engorgements — même — Mais il paraît plutot que ce sont des engorgements

de l'urethre | s'epaississent, s'en approch
ent, se pressent tellement
que les urines ne
peuvent plus les ~~[illegible]~~
L'obstacle se trouve
tantot dans l'espace
Compris entre le gland et
leur siege | le Crotum plus ou
Moins ecarté —
D'autrefois vers la
portion membraneuse de
l'urethre d'autrefois en divers
endroits de l'etendue
de l'urethre en meme
tems &c

— Les retrecissement
sont encore relativem
ent a leur ancienneté
au degre et aux
complications

= On conçoit comment
un rétrécissement de l'urètre
rend des urines difficiles
= Comment pourra-t-on que
faire un exercice en ville
en femme en exercice
— alors l'urètre ne permet
plus qu'à peine le passage aux
jets il se bifurque et se
tourne en spirale,
d'abord l'urine est en
arcade étant poussée
subitement puis elle
tombe perpendiculairement
— elle produit des effe-
rences chez qui seront
expliques.
— Causes renfermées
dans le corps de la vessie
un corps étranger de
col retient les urines
un s'arcoure en dedans
mais il n'est pas
[illegible]

Causes déterminantes de cet engorgement

Signes

[illegible] classe —

Causes dans la cavité de la vessie

Calcul, = les corps étrangers plus souvent contenus dans la cavité de la vessie sont les calculs

agissent de 2 manieres = de 2 manieres ils empêchent l'excretion de l'urine ou bien en s'appliq au [illegible] l'embouchure de l'urethre

s'appliquant au passage = c'est ce qui arrive la personne lorsque en pissant lache urines, & supprimant tout à coup un mouve du bassin derange le calcul et retablit le cours des urines

s'engageant dans l'un bouchure = mais si le calcul s'engage comme un bouchon de l'urethre il empêche encore la sortie cependant comme il ne bouche pas le passage exactement = c. [illegible] à force de se tourmenter

en fait s'ortie un peu
et si le calcul n'est
pas de place, les urines
s'y creusent une rigole
sur le calcul pour
laquelle l'urine s'écoule
même ici, à l'ordinaire,
le col n'étant plus fermé.

Du numéro = Du numéro enga-
gé dans le col de la
vessie

Un caillot = un caillot de sang
peut s'engager de la
même manière — ou
le cas s'avérait se forme
des caillots en faisceaux
qui peuvent s'échir.

= Les mêmes corps étrangers
s'engageant plus ou moins
profondément dans l'urètre
= y les causes et
en tir

5e Classe — Causes autour du col et de l'urethre

du 19 messidor an 8e

5e Classe = causes qui ont leur siege autour du col de la vessie ou de l'urethre
il en i autres causes qui se trouvent exterieures a l'urethre
— parmi ces causes il en ont de communes a l'homme et a la femme et de particulieres — toujours d'abord les causes communes =

Communes aux deux sexes

= on a vu une tumeur une exostose derriere le os pubis comprimant la vessie et s'appliquant tellement les parois que les urines ont été entierement retenues =
= ce que cet exostose a produit en comprimant le col de la vessie et l'urethre =

exostose

esquilles

un fragment du pubis de ro[illegible] grandeur d'un corps ont été vu le produire comprimer l'urethre retenue ici

urine peut lorsquelle a cessé leurs tire et a resté une fistule urinaire qu'a pu se guérir la cautérisation =

= une tumeur très commune entre le rectum et la vessie d'air.

Stéatome — Le homme entre la vessie et le rectum, la femme au ?? tissu cellulaire latéral ou antérieur qui unit ces parties au pubis = c'est ici une fausse d'eau plein la première qui se coure = mais au dessus des ressources de l'art =

propres à la femme — = Causes particulières à la femme

= les vices de la matrice sa chute complette ou renversement à ce excessivement qui agissent ou en comprimant le col ou en changeant

= Déplacement de la matrice &c

la direction de l'urèthre
= cette rétention devient plus
fâcheuse que la [illegible]
principalement plus difficile
la guérir = ainsi
celle de la [illegible]
est plus fâch. que celle
du [illegible] du [illegible]
faciles à rétablir
= la pression de la
tête d'un enfant
au détroit supérieur
dans le petit bassin
de la femme
= qd la tête engagée
au détroit supérieur
séjourne longtems
que l'enfant a de
longs efforts que la
tête est fort grosse
l'urèthre se trouve
comprimé et la réten-
tion d'urine en est la
suite =

pression par
la tête d'un
enfant

mais la retention d'urine par l'accident le plus grave qui puisse resulter de ces jours et le lumbre du ...

autres effets de cette cause

= la contusion du vagin, les escarres qui en resultent, la crevasse du vagin, celle de la vessie, la fistule dans le vagin, voila des accidents bien plus terribles =

Squirres du col de la matrice

= on a vu des squirres du col de la matrice produire retention d'urine habituelle comprimant l'urethre sur la symphise des os pubis.

Causes propres aux hommes

= Causes externes propres aux hommes une tumeur inflammatoire

tumeur au périnée
au périnée

grands abcès

excréments dans le rectum

observation =

au périnée comprimant
[illegible] libre cours [à l']urine
di Micheau la [illegible] exprime
ainsi les grands abcès
qui s'étendent au tissu
cellulaire autour du bassin
environnant la [illegible] et la
[illegible] qui se terminent
aux [illegible] comprimant
l'urèthre ou [illegible]
[illegible] l'introduction de la sonde
= Les excréments
retenus et durcis dans
le rectum peuvent aussi
comprimer l'urèthre
et devenir cause de
rétention d'urine
= on voit une chose
semblable dans [l'obser]vation suivante =
= il a pratiqué
l'excision d'une [tumeur]
[illegible] hémorroïdale

intempérie person craintes l'hémorrhagie ne voulait entreprendre il y eut en effet une de hemorrhagie mais il l'arrêta par la cautères avec charpie a dans le rectum d'où resulta une retention qui exigea la sonde pendant son séjour

= les affect. de la verge

affections de la verge

phimosis paraphi ligature mise imprudemment autour de la verge — les hydro ... par coudes &. en changeant direction de l'urethre peuvent produire la retention d'urine mais tous cela est inferieur à la ... = de toutes ces causes s'en sont observées frequemment de ...

de toutes ces causes

les 2 plus fréquentes

paralysie est la cause la plus fréquente
— 3° les yeux, en
troisième âge le rétrécissement
ou l'inflam[ma]tion du col
de la vessie —
= appellée Cause.

Paralysie

au jour d'un vieillard on augure la première
cause la 2me pour les
adultes sera le rétrécissement

rétrécissement

s'il a eu des
gonorrhées = enfin
après le rétrécissement

=

l'inflamm. du col

une 3e

les sanguins pléthoriques
et ceux qui se livrent aux excès
qui commettent

l'inflammation du col

des excès de toutes
espèces =

progrès marche des symptomes =

Progrès

= dans l'état naturel quand la vessie est vide ses parois se touchent elle est plongée, couchée dans le tissu derrière les os pubis = mais à mesure que les urines arrivent elle écartent les parois, le diamètre vertical conserve le plus de longueur = en se distendant elle se porte en haut les airs [illegible] intestinal poster. et laterallem. — en bas elle presse le rectum tellem. que le doigt dedans [illegible] soit bien — en se distendant elle monte au dessus du pubis et [illegible] ient

une tumeur
sensible oblong. de haut
en bas s'élevant plus
ou moins quelquefois jusqu'à
l'ombilic suivant [illegible]
son extensibilité = 3
= tant que distension
est médiocre seulement un
peu au dessus de l'état
naturel, point de douleur
= mais un peu
plus, il y a point au besoin
d'uriner en un ballon
dans l'abdomen
= bientôt effort pour uriner
fréquents et grands
[illegible] tout un poids
aux
la [illegible] et l'angoisse
de l'abdomen
augmentent = inflammation
deux [illegible] des
la vessie et [illegible]

pression contribue a celle des
voisins organes = les
vaisseaux que leurs épreuves
n'ont au dessus de celle
de toutes les autres urines

— Signes

— De fait d'excretion de
l'urine, malgré d'envie
et des efforts violens
et multipliés = cependant
cela vient certainement
que la region hypogastrique
est tendue, douloureuse avec
sentiment de pesanteur
en effet =
= les calculeux ont des
envies d'urine qd ils
n'ont pas d'urine mais
la region hypog. n'est pas
tendue dans par retention
d'urine

Signes

le contour de ces signes
ne peut laisser aucun
doute sur leur, pression
sur le rectum
introduire le doigt
pour plus de certitude
si besoin est =

Pour recon-noitre la cause — il faut reconnoitre
quelle est la cause
qui produit la rétention
pour pouvoir y remédier =

pour l'inflammation du corps = ment si le sude a senti-
de replétion, quil y
ait douleur sise à la
région hypogastrique
si effort douleur pour
rendre les urines, (chaleur)
chaleur & un conclut
inflamation col de la vessie

pour la paralysie — quand la paralysie
signes sont tirés

de l'age, des circonstances
de la cyde distension
peut queé qui pas lorsque
aussi peine = de la facilité
à introduire la sonde d
la vessie = une circonstan
a fait croire tumeur hemorrode
oral plutot que tumeur
de vessie = C'est la
sortie d'urine plus ou
moins tantot avec effort.
tantot sans effort c'est
ce qu'on appelle
urine par regorgement
- q la vessie est distendue
nequa plus ultra = l'urine
qui arrive ne pouvant
plus être contenue
par la vessie elle est
expulsée

ecriteau une
erreur
=

ce-

Mais maladie cette
évacuation la vessie cette
tendue et grand danger
croit de [illegible] cela
pour une tumeur humorale
et d'ouvrir
= on s'assure toujours
de la tumeur [illegible]
par la sonde [illegible]
qui donne beaucoup
d'urine et fait disparoître la tumeur qd elle
est urinaire — si
au contraire elle
persiste malgré la sortie
des urines on la
juge d'une autre
nature.

Moyens
sûr de ne
pas y
tomber
—

Pour le connoit l'inflammat du col de la vessie

Pour l'inflammation du col — Si une personne urinait bien avant — Si ne peut contenir ses urines — s'il y a des cuissons irritation par la goutte — douleur vive — envie fréquente douloureuse — douleur vive au col — par au corps — sentiment de pesanteur hypogastrique — on reconnait l'inflammation du col de la vessie

Pour le gonflement de la prostate

Pour le gonflement de la prostate — Si les urines ont perdu par a peu leur grosseur du jet. Si pesanteur au périnée si le doigt introduit dans le rectum a senti une grosseur c'est la prostate.

Vigne ajoutée par Petit =

=

Petit ajoute que les urétères calcs permettent une ouverture en leur partie inférieure, par l'intermédiaire de la prostate. Cela n'est pas exact, car d'ailleurs la réunion peut s'effectuer = mais le doigt suffit toujours car si la prostate n'est pas squirrheuse le doigt va bien au delà ... on peut ... de la ... de l'urine ...

= Pour la coarctation

Pour la coarctation =

= s'il y a un bouchon ... peu à peu le ... est retenu = si aussi il ... supprimer ...

Mais (les) signes ont rapport avec les precedens, il faut y joindre la sonde

se distingue surtout par la sonde = tantot elle va au perinée d'autrefois a la portion membra. jamais plus loin = tandis que ds luxation de la prostate elle va jusqu'au col et ne peut passer outre =

pour le calcul = q.d la retention depend d'une pierre on en juge par une sonde introduite ds la vessie

pour le fongus = si fongus ds la vessie il se connait a ses signes et à la sonde

= s'il y a eu perte

pour un Caillot

de sang. et que la
selution revinne a(?) rée
on juge que Caillot retient
(urine) [pour]
= y dut aussi retenu par
tumeur ces peuvent re
ne commencer qui a pein
la mort =

pour les tumeurs :

pour les Causes des Vexes

= Les Causes peuvent venir
a chagrin ou ventre
au lit a la mode qui les
occasionne ceux cy que
on doit y tourner venues

Terminaison

Terminaisons d'infection du corps

— Si rest du corps
de du col. et que par
prompte remede
gangrene peut venir
et mortel y a 8
jours — on la

vessie v. e. de Mucef
et le m de petit de
Jum. ou des deux causes
réunies
= Vi de paralysie
et quelle v. rude ait été
introduite par autre chose
que la nécessité de l'usage
d'une v. onde = on
ne parle pas de la
paralysie le pendant l'effet
de la Maile —

De la Paralysie

= qd de bengor. Tirzeny
de la pro-state presque
toujours mortelle à moins
que la glande ne s'apperçoit
et que le pus s'évacue
par les urines ou par les selles

Du Squirre de la Prostate

= qd de dépend de
rétréciss. de l'urèthre
vésique toujours

De la coarctation

les effets violents produits
di la dilatation [illegible]
du journal de l'urettre
difficultés d'uriner [illegible] plus
de volume
Mais il résulte de cet état
engorgement qui quel
quefois est très dange
reux
quant aux autres
causes, si rien ne
peut guérir la maladie
qui cause la retent.
la crevas. de la vessie,
un inflammation s'ensuit
la suite et causent
la mort

Des autres
Causes qui
sont médies
principales

Nota quelque distendue que
soit la vessie jamais elle ne
se déchire, sans inflammation
fait toujours une escarre gangr.
qui se rompt. = la vessie au
contraire prend l'épaississement en
se dilatant =

du 21 messidor

Pronostic de la retention
= d'urine =

Pronostic

= maladie desagréable fâcheuse
mais dangereuse toujours en raison
de la cause et pour pronostiquer il
faut avoir egard à la cause

Pour l'inflammation

= par infl du corps extreme
dangereuse car si une tentative
déplacée pas elle se termine
par gangrene si non il
reste un vice organique
qui finit par faire perir =

Pour la Paralysie

= par Paralysie toujours plus
facheuse si depend d'une cause
forcée [illegible] la moelle = mais si
une [illegible] qui ne finira malgré elle
[illegible] avec la maladie =
= celle qui depend d'une affection de la moelle avec paralysie et mortelle
[illegible] les [illegible]

Pour la Distension

= la paraly par distension n'a
pas de suite chez les jeunes
gens = peut devenir incur
chez les viellards = la
paralysie aus cause [illegible] parente

chez le vieillard tantot qu'il tantot est incurable le plus souvent dans ce cas en vieie et qu'il n'y a rien

== la retention par inflam

Pour l'inflam.tion du col — [illegible] danger si recours a temps mais il faut tacher d'en prevenir le retour par les saignées les topiques locales =

= par gonflement de la prostate [illegible] en suite
Pour gonflement de la Prostate — Lordinaire mortelle, si la nature ne prouve resolution par une purat. la prostate ; abcedante qui s'ouvrant dans l'urethre dans l'intestin rectum ou au dehors =

== par l'engorg des parois de l'urethre et retrecis
Pour la coartation — peu facheux qd recours a tems = toutefois si recours retardé la cure devient longue =

== Pr les causes particulieres
Pr causes particulieres — ainsi [illegible]

plus ou moins grave et dangereuse selon le mode qui y a donné lieu =

= Par le calcul plus ou moins, suivant volume idem et calcul les symptomes et la disposit individuelle

= Par toujours ou par come [illegible] [illegible] pendant les mois

Par le calcul

Par le toujours

indications =

indications

deux indicat a remplir
1° indicat. générale, le rendre la vessie =
2° indicat. partiq qui serait comme les moyens propres a la cause =

2 =

= toujours toutes deux doivent être remplies mais la 1re est urgente, l'autre peuvent se retarder mais devant toujours être remplie

= il est des cas ou en combattant cause on [illegible]

Car

Particulier — plus a tomber l'effet les urines qui leur cours ainsi l'inflam. du col tombée les urines reprennent leur cours et l'incubation générale le sang ne se présente plus =

pr indication générale — = moyen de la ... sation générale — dévoluer les urines

Videe la 2e serie — = si la ... est inflam... antiphlogistique générale et partiel et quelquefois par le moyen ... la ... et ... de la ... de la ... =

dans les inflammation — antiphlogistiques — = les ... générales et surtout les ... ou ... sont les meilleurs moyens pour combattre l'inflam. du col ou du co...

= les boissons antiphlo... et rafraîchissantes conviennent

pas de boissons

point ... car elles ont au moins trop de liquide ... la vessie — on leur fait plus de mal par cette ... que de bien par ... ou ... boisson — mais souvent arrivant près d'une ... on le ... gorgé de boissons bien ... à propos —

— on emploie aussi les lavemens emolliens et relachans, bains, ... par la proximité — les applications emollientes plutot ... que ...

Des lavements fomentations bains

— et les bains emolliens et même les bains ... quand les ... peuvent les ... car souvent ils ... la douleur —

— Si les moyens ne procurent pas la sortie, vous pouvez ... plus de tems ... à la sonde — et toujours ... remedes antiphlogistiques. l'inflammation n'est pas ... sonder

Sondes

réflexion sur l'impossibilité
de sonder ds la rétention —
= ou bien c'est par
paralysie ou par engorgement
engorgem de la prostate inflam du
col —
= ds le 1er cas (paralysie)
on ne trouve aucun

Facile dans
la Paralysie
—

obstacle matériel — alors
employer une algalie plutôt
plus gros que médiocre
car un gros algalie écarte
les parois ouvre un passage
et entre mieux = si obstacle
ils viennent s'ensuit de sonde
qui trop déliée glisse
la membrane et éprouve
de la résistance = mais

D'ou viennent
les difficultés
—

si la sonde est grosse
la difficulté vient de mal
adresse c'est pourquoi il
ne faut pas s'obstiner
on irrite beaucoup et l'on
peut augmenter l'inflam du
col à la rétention d'uri

n'étant pas examiné = il vaut mieux s'exposer au sondage que de s'obstiner celui qui s'obstine ordinairement n'en vient pas a bout irrite lestisse enflam le col

∥ q'd on sonde pour l'engorg de la prostate on rencontre des obstacles que la sonde force peut faire s'ouvrir = si ds le pr cas (de paralysie) la sonde doit entrer presque par son propre poids ici il faut violence on doit se representer les parois epaissies se pressant fortement de façon que sans une de violence impossib de pénétrer = il faut donc violence et pourvu qu'on suive la direction du canal on parvient ds la vessie rien ne resulte du déchirement

Sonder pour l'engorgement de la Prostate

—

faire violence

que l'on a fait
mieux tête violence vaut mieux
plutot que que la Ponction car a
la Ponction- quelle ne remedie pas
ner a l'obsta il faudrait longue
le vaincre le ride
supporte plus certain. les
tentatives couleur qd le
besoin d'uriner... le
menacent —

= il est bien rare
qu'un chirurgien aequit la
rarement hardiesse le ... en
cela est guidant avec le doigt et
necessaire le rectum ... soit
obligé de faire la ponc
tion —
= qd on a été assez
heureux pour faire sortir
les urines on doit bien
être ... ...
passage de la mort à la
vie

Sonder impossible que fouire - Si sonder est impossible que faire ? = egard a la faire

Pour Paracysie. - = Si c'est une paracysie et que l'on n'ait pas trop irrité appeler une contraire plus adroit - Nous si le chirurgien a voulu persister a produit inflam et n'a pas encore réussi que tourmente

Si l'on a trop irrité - enormes plutôt que de combattre d'inflam. du col faire la ponction

Ponction - = ponction parceque l'obs se dissipera et que facilement apres la sonde sera introduite

Exemple - = il a vu de ces tentatives resulter une fausse voie de la prostate - il s'introduit cela avec la sonde et avec les doigts plutot que de forcer il fit la ponction la counde ella

Six jours l'instrument tomba le mède fut sondé par une algalie d'argent — puis 2 jours après été [illegible] elastiq et le mède a sentime de s'en servir —

— Pour retrecisse-ment — Bougies

— si la retentions est de rebegins de l'urethre ou de gonflem. de la prostate — si l'on n'a pu sonder on peut se servir de Bougies

[illegible] ent — on n'a pu sonder un homme une Bougie — elle n'avance pas elle reste 8 a 10 minutes il vient besoin d'uriner quelques gouttes passent quelquefois et en insistant sur les bougies on parvient à pouvoir mettre une sonde

leur effet

Bougies insupportables —

mais si la Bougie est insupportable alors il faut faire la Ponction — qui se pratique par dessus le pubis, ou par le Perinée ou par le rectum, ou par le vagin

Ponction

il faut préferer la ponction au dessus du pubis et laisser la canule jusqu'a ce qu'on puisse introduire une sonde et si le calibre se retablit la guerison est radicale.

2e indication

indications Particulieres

2e indications indications Particulieres

Pour une inflammation

— pour une inflammation autre (et signes) generaux et particul: moyens propres a detourner la cause irritatoire ou était la dart &c.

Pour la Paralysie

== Pour Paralysie traiter differem. selon sa Cause

par un principe morbifique

== par le princip morbifiq d'une fievre maligne s'il fau vuider le tems ou laisser une sonde et si le malade survit la vessie se retablira — quelquefois la sonde est necessaire 3-4-7-8- jours ==

par lesion de la moelle

== paralysie par Commotion, Ebranlem Contusion tiraillem de la moele épiniaire indépend des moyens généraux &c on retire de bons effets des frictions sur la Colonne et sur la distribut des nerfs avec teinture de Cantharides ventouses scarifiées sur partie cautères moxa ventoutoire idem et si.

convalescence les eaux
minerales thermales mais
le plus souvent les malades
succombent aux escarres
gangreneuses à la suppuration et
etat cachectique qui les suit

Par distension — Si la paralysie est due a la
distension momentanée il suffit
Chez les jeunes — d'avoir sondé pour
que la vessie reprenne
son ressort chez les jeunes gens

Chez les vieux — Mais si c'est chez
un vieillard paralysie venue
subitement sans cause apparente
ou lentement il faut mettre
une sonde dans la vessie
La sonde à demeure — la laisser continuellement
ouverte — mais si le
malade veut se lever il faut
boucher la sonde la
deboucher tres souvent

toniques

frictions irritantes

injections toniques

Signes de guérison

ensuite outre les toniques les vulnéraires intérieurement pour donner du ton général — l'infusion d'arnica animée avec teinture de cantharides augmentée successivement — frictions faites sur le bassin le dos — teinture de cantharides — vesicat sur partie poster. du bassin seulem. 7=8 9-10 heures puis on les panse avec du cerat et on applique ailleurs pour irriter les branch. poster. des sup. sacr. — les injections froides et même à la glace et la neige — injection d'eau de balaru d'une décoction, fécule, de kinkina

— au bout d'un certain temps de cet usage on voit les urines entre l'uretre et la sonde : la sonde n'étant pas bouchée par du mucus

on supprime la sonde pour voir s'il urine — mais il faut voir comment il urine — s'il ne urine que par efforts et en bav. ? il faut prendre un que ce n'est que progressivement

Précautions pour s'assurer
dans tous les cas qd il peut uriner de suitte, vider avec une sonde ce qui lui reste d'urine a chaque fois car la vessie ne se prend que lentement & son irritabilité et la vessie reste toujours chargée

Guérison complette
= 2° qd la sonde ne donne plus issue a rien on juge que la vessie a repris son ressort = par ce traitement on guérit les viellards radicalement —

incurabilité
= qd ces moyens ont été inutile la sonde est condamnée a porter

une sonde Elastique dont
Sondea il faut quil faille
Perpetuité usage toute sa vie
Sous peine de recidive

De toutes les causes de retention la plus difficile a detruire est l'engorgement de la Prostate

Traitement de la retention par engorgement de la Prostate

De l'engorgement de la Prostate —

Cette g[lan]de d'un tissu serré recevant peu de vaisseaux sanguins mais abondant en lymphat. q[uan]d elle s'engorge devient dure squirreuse [illegible] sa resolution difficile et même impossible

sa Cause

Presque toujours son engorgement depend du vice venerien les personnes qui en sont attaquées en ont eu des gonorrhées ou autres affections vénériennes

on fait fleurir aux
[illegible] ou [illegible]
pour le traite [illegible]
= [illegible] pendant le traite
[illegible]

Signes de son incurabilité
—

pas, ou que la
[illegible] ne [illegible]
pas [illegible] la [illegible]
[illegible] incurable
= [illegible]
[illegible] tantot [illegible]
la [illegible] rendu par

a ou elle guerit
—

les [illegible] autre ou
[illegible] années [illegible]
[illegible] fait
[illegible] en — guerie
= on [illegible] trouvé d'ex
[illegible] que [illegible]

traitée sans succès

sondée

= Lorsque l'engorgt a résisté au traitement d'usage de sorte que la sonde entre difficile - en aucun cas elle ne doit [illegible] ont on ne peut parvenir [illegible] nécessité qu'en forçant la résistance et si en le faisant on suit bien la direction naturelle il est possible de franchir [illegible] [illegible] substituer à la sonde forçant une sonde élastique [illegible] réitérer

il faut forcer

resultant d'une fausses routes

ce qui arrive qd l'engorg augmente

vers la réussite

... de la faculté d'uriner = mais si l'on suit mauvaise route pour ... la prostate ... infiltration ... ...

L'on reste qd on a réussi ... ... réintroduire une sonde Car l'ouverture fistuleuse tend toujours ... se ... lui

= qd l'engorg ... ou ... ... lieu ... ... par ...

de … oud — … inflam
gangreneuse = … … par
les infiltrat … leur
… -

Traitement de la retention par retrecissement — La retention par retrecisse de l'urethre est une des plus commune et difficile a traiter et demandant beaucoup d'attention

En commencement — Un … … une person qui a eu des gonorrhées. … s'apperçoit d'une diminution du jet de urine … … des Bougies portant les sondes elle previendrait les consequences

du retrécissement
Urail ou mare tant que
en des peuvent rincer
ils n'avellent pas tout
enfin ils arrivent au
point de ne pouvoir plus
urinier que goutte à
goutte sans jamais se
vider et ce qu'il
en est entraîné du
remède qui se dépose
au fond du vase

— c'est ce qu'on a appellé dy a
Du temps où l'urine sort à peine — temps par trop avancé
— on peut employer
les Bougies pleines
de caralé a Sayon
trempée Emplastiq
que l'on enfonce
peu a peu

Bougies

elles guirissent
le retrecissement
du Bulbe

= 10 le retrecis est à la sortie fulbeuse de l'urethre les simples bougies ordinairement guérissent, mais ...

Non vers la Prostate

Craintes alors de fausses routes

calcul sonde — d'un canal qui pour être retiré l'étincelle laissée quelque temps dans le creux percé avec la scie à une ou de plastique. Tant bien = tiles, ont les inconvén. d'élargir l'urethre y de ... pas l'en petite.

traitement du calcul ou la suppression complète — = mais ... une pu... de ... le ... urine pas de ... plusieurs heures après avoir combattu ... ou entièrement ... cite =

la sonde — = ... urine d'une petite sonde ... à ... mouvem... a ... épaisses ...

il faut toujours droigt
aux le rectum pour
lui relever le déle
Procédé lequel produit de préceder
a l' état ... il
lui semble que ouverts
yeux il aussi faire de
pratiquer la sanction
qui soulage sur
mais n'exempt pas
de la nécessité de le
récolter et le mé a plus
de de plainsant
Prémiers devoient qu'il
n'en auront apenu me [illegible]
bien fixer la
pour fixer roule d'argent la laisser
Colle d'argent 5 ou 6 jour jusqu'a
ce qu'on soit prépa-
ré la voie pour la canule
élastique qui est toujours

Plus difficile à contenir
= celle-ci ; une
par les moyens ils
Celle de gomme vont à leur affaires
Elastique — avec on la change
tous les 8 ou 90 jours
on augmente l'alc
[illegible] et [illegible] on
est parvenu à en
introduire de grosses
la dilatation de la suffisance
= Mais après cette
guérison l'urine
pour éviter ne continue pas les
la récidive sondes le rétrécissement
reviendra et au bout de
8 à 10 mois le rétrécissement
se reprend et les inconvénients
inconnus se présenteront
= Si ce trait est
résultat de pratiqué un trop relâché
le frottement [illegible] de l'urine

negligé | Et dépôt vicieux et citatus ou ... aut la ... ... vitte
= a l'egard des causes particulières voyez la ... primaire ...
Précaution pour l'usage des sondes
= lorsqu'une personne
Précaution ultérieures | est obligée de porter une sonde voici les précautions
= prefer les sondes de gomme élastique toujours les plus commodes
= Mais si on a été obligé de se servir de sonde d'argent quoique gênante il faut la supporter jusqu'à ce que ... ... étant ... étant devenue mobile on puisse ôter celle d'argent ... et en mettre une de gomme élastique

— ... sondes produits dans

effets des | cet

sondes | 1° pour la irritation évacuation
de matière muco-purulentes
qui ne doit pas inquiéter
a mesure que les ...
... habituent ils laissent en
sondes —
= la sonde agit sur
la vessie augmente la sécrétion
du mucus vesical, surtout
celle de gomme qui glisse
le mucus s'épaissit autour de
l'orifice de la sonde et
rend la sortie des urines
difficile ... en ...
a ... Pilet pour déblayer
injection d'eau tiède très
avantageuse

= mais qd a séjourné
importance | 12 ou 15 jours la
de les changer | retirer ... seulement
pour découcher ces yeux,

Mais encore pour Voir
qui pressoir faite par Lourimes sur
lar. Vernis quelquefois usé et
le tissu de soie se
trouve mouillé ...
zerouret le corde le cafse ... une
Morceau de la venne peut
voyoir de noyau a une pierre
il faut donc en avoir plus
les ... que elles ...
la ... ...
... ... pour ...
leur ... ... en avoir
de diverses grandeurs afin
bien augmenter ...
a mesure que ...
... ...
= les ... d'argent
qui exigent le sejour au
lit sont ... par deux
des cordons un devant
l'autre derriere attachés a
...

Ceinture — les ondes élastiques vont s'attacher au tour de la pierre ou à la base du trigone

— ainsi le calibre ou j'a négligé les voyageurs indiens — il ... les fibres éprouvent une sorte d'étaillement par là les urines filtrent dans le tissu cellulaire et suivant la quantité il en résulte dépôt urineux plus ou moins considérable plus ou moins suivi d'accidents

Causes des dépôts urineux =

— Mais toute personne n'a pas même degré aux dix obstacle est vers la vessie de la prostate —

Différences

[illegible] la [illegible] guérie
l'ondée urettre [illegible] l'urine
sont
[illegible] a goutte [illegible] [illegible]
[illegible] = on se supprime [illegible]

D[illegible]
[illegible]

= tantôt ils arrivent subitement par l'effet d'une rétention d'urine / strangurie = tantôt les [illegible] continuent a uriner et a prin. l'urine s'infiltre =

= [illegible] la terminaison [illegible] fort [illegible] par l'urethre [illegible] s'infiltra ; [illegible] lentement une tumeur [illegible] ou [illegible] avec lenteur [illegible] [illegible] fait peu d'attention [illegible] ouvre a la [illegible] [illegible] — une corde dure depuis ouverture jusqu'a la [illegible]

prompte

lente

[illegible] des [illegible] —

Vignes — les Crevasses se multiplient que quelquefois on a vu que toute la dernière des ardoises est criblé comme par un arrosoir percé d'une multitude de trous avec des duretés des callosités = il a vu un vieillard uriner ainsi comme par un arrosoir -

Progrès des — Prompte

= Mais si la crevasse vient à s'ouvrir pendant les efforts d'une urine il résulte tumeur [illegible] urineuse qui tantôt s'élève comme phlegmon tantôt fait des progrès rapides vers la gangrène = d'où

d'après tout cela trois especes — tuberculeux

trois sortes d'abcès 1°= tuberculeux qui dégénèrent en fistule

phlegmoneux 2° les p. phlegmoneux les noyaux qui s'y suppurent

gangreneux 3° Et enfin gangreneux ou l'infiltration des urines est portée aux loin. Et il suit de la gangrène du scrotum du périnée de la verge - etc.

traitement = Traitement =

pour l'infiltration médiocre — cette infiltration médiocre au fistule encore récente on conseille les bougies quelquefois par leur moyen la découverte de l'urine par le méat et point des fistules =

Sonde — cette la à lieu certains dans la relation subitement

Pour l'opération rapide | pratique de suite une incision sans attendre la situation car avant que le service aille au dehors il a fait des ravages effrayants au dedans progrès souvent très rapides le voit on vaste peine une petite tumeur le lendemain vaste tumeur

importance ouverte promptement | avec gé... noire gangrenée ou si elle était encore le tissu ayant moins de vie d'énergie est frappé de mort. —

... la ... indication | — Indication de donner issue aux urines — et d'empêcher qu'elle ne se remplisse ...

= ouvrant une seule incision
suffit. Mais le plus
nombre souvent il en faut au
des incisions moins ou environ &c.
une quantité plus ou
moins grande suivant
l'étendue et l'intensité du
gonflement =

= les incisions dégorgent
arrêtent les progrès, les combat
leur effet gangreneuse. De la chair
est après 10-15 jours les
incisions sont deux petites
= la suppuration bon quoique
toujours terne beaucoup issue
à un peu d'urine

= en faisant cela on ne
remplit qu'une indication

qui est de donner issue
par la matière épanchée

2e indication — la sonde est disposée
que l'urine ne s'épanche
d'avantage lui rendre
son ancien cours

rétablir le — (?) le de diminuer
chemin empêché — est médiocre et que
par déviation — le m(alade) fait usage de sonde
pendant longtemps on
peut guérir les fistules

Effet des — Mais si elle est
moyens — grande (cette crevasse)
et aucun analogue l'usage
des sondes elle ne se
referme pas.

(?) sont abandonnées
à elles même et que les
m(alades) n'y succombent pas
il reste des fistules

Du 23 [illegible]

Fistules urinaires — Des fistules urinaires

Lorsque les urines s'échappent par une ouverture de l'urètre, de la vessie qui a une ouverture ordinairement plus ou moins petite au dehors, on appelle cela fistule urinaire, soit qu'il y ait simple trou ou ulcération =

= tantôt l'ouvert fistuleuse intér. correspond à la vessie: fistules urinaires vésicales. tantôt à l'urètre: fistules urinaires urétrales

Différences — = Des fistul. urin. vésicales tantôt fistule aboutit à l'hypogastre du corps, ou pubis, dessus ou dessous, au périnée = tantôt dans une cavité viscérale voisine de l'homme l'intestin, femme qui a d'autres adhérences avec le sommet de la vessie.

et de femme de la vagin.

Fistules uri-naires s'ouvrant dans une cavité

Causes de celles ouvertes dans les cavités voisines =

= Dans l'homme on a vu une pierre dans le bas fond

Ds le rectum ds l'homme

pierre ayant irrité, percé la vessie établi communi avec cet intestin ouverture entretenue par le passage les urines] = peut encore resulter d'une frustion de la vessie par le rectum la chute ayant déjoué la vessie et le rectum étant devenu ulcéreux. =

Causes

= Dans la femme les pierres ayant (une) inl. le vagin l'urètre et la vessie ds tel jours et autres fabrique de cellules on voit le coup de cette ouverture par le doigt dans le vagin ... a ...

Dans le vagin

Causes

la Pierre — quelque fois les cancers de la matrice detruit vagin et vessie et dans l'etat avancé y fois les matières fecales s'introduisent p. le vagin etc.

= mais une cause plus frequente de ces dernieres c'est la contusion et la desorganisation du bas fond de la vessie et du vagin causé le sejour de la tete d'un enfant dans un accouchement laborieux = par cette contusion le vagin a été desorganisé escarres gangrene surviennent, vient inflamm. l'escarre tombe par la suppuration qui survient et les deux conduits communiquent a perdu les urines par la vulve sans cesse

Signes de la fistule dans le vagin

Signes de la fistule urinaire dans le vagin.

le rapport de la femme le vagin toujours mouillé point d'urines par le canal, point d'envie d'uriner = une pierre rendue par le vagin ou à l'endroit où les bords qui ont présenté, un doigt porté dans le vagin y sent une crevasse quelquefois assez grande pour admettre le bout de l'indicateur qui touche les parois de la vessie affaissées

Signes de celle dans le rectum

= signes de la fistule urinaire dans le rectum

Elle se connoît à un écoulement de matières fécales liquides à odeur urineuse

les Auteurs [illegible] points de la vessie mais loin du rectum [illegible] vessie et [illegible] par le canal de l'urethre?

— Si la crevasse de la vessie du rectum était plus considérable la sonde de la vessie serait [illegible] par l'indication de le rectum — [illegible] crevasse au vagin

= Indications des fistules

traitements urinaires de le rectum et des deux dans le vagin —

— de celle du rectum
— De rectum — [illegible] ce qui [illegible] c'est la sonde =

sonde
sonde grosse dans la vessie bien assujettie [illegible] le [illegible] le plus

lorsq[ue] [c'est] possible =
par la voie postérieure
les conventions et rétablir la
fistule urinaire = mais

elle guérit si peu grande

si il s'entretient un peu
de somme ses bords
sont lisses ils ne
font que se rétablir
mais ils ne réunissent
pas le tout moins
d'urine mais toujours
un peu il =

De celle du vagin

= Dd le vagin la
fistule ordinairement est incurable
cependant Lauter et postea
1° le premier moyen
vous sera impossible de
bien faire c'est toujours

Sonde

d'une sonde élastique
du plus vrai calibre
possible de la vessie

il faut qu'elle plonge
dans l'urine pour qu'elle
même une urine arrive elle
ne file la sonde sans passer
par la fistule — mais
comme elle est difficile
à s'y porter, la bien
Pour l'assujettir assujettir — Desault pour
cela avait fait construire
une espèce de brayer
à la plaque duquel
était fixée la sonde
précautions à ajouter = la sonde s'était constam
ouverte ou s'y écoulement
continue rend la [illegible] constamment
mouillée on pourrait la boucher,
mais la déboucher toutes les
heures ou demi-heures = la
femme s'était couchée sur le côté si
la fistule était [illegible] fend-
Couchée si la fistule est plus d'un
côté; couchée du côté
opposé

Cas où elle guérit

[illegible] est près du col
peu avantageux et
la [illegible] guérit quelquefois
tout à fait =

= Mais seulement loin
du col. Quand l'urine
passe, tant que jamais

Cas d'incurabilité

besoin d'uriner, on ne
doit rien se promettre
cependant il faut tenter
avant de la dire incurable —

Moyens proposés

= On propose quelque
point de suture puis une
sonde dans la vessie pendant
la consolidation

ses difficultés

= Mais difficulté pour
le rapport du rafraîchissement
des bords et pour celui de
la suture difficile à faire
aussi loin = [illegible]
on suturerait les [illegible]

ne s'interposeraient elles pas entre les parties de suture

= Cependant on connu

observation qu'un chirurgien de l'île de pratique d'une semblable operation

= Si cette rudé est incurable il faut des soins de propreté

Soin de Propreté

Jean Louis petit dit avoir fait construire un urinal particulier = il faut que les femmes se garnissent avec des éponges qu'elles les changent souvent et pour l'odeur et pour eviter l'excoriation et l'inflammation de la vulve du vagin et par le séjour des urines toujours plus irritantes

= Si cela arrivait bains ablutions fomentations pour moyens deja exposés (de propreté)

= Quant aux fistules vesicales

Fistule au dessus du Pubis — au dessus du pubis
elles peuvent avoir lieu
près l'anneau ombilical
elles paraiss quelquefois
depuis la naissance et
à l'anneau ombilical — une membrane qui bouche
l'urethre
= alors c'est que l'ouraque
soit creux ou que contracte
a la vessie les urines
rendent par là les urines =
Cure — = Et cela se rencontre
sert de voie à l'urethre
et presque toujours
= ou bien les fistules
au dessus du pubis
à l'hypogastre — s'établissent d'une
ponction pratiquée en
ce lieu = que la canule
Cause — séjourne 20-30 jours que même
adhérence s'est établie il
reste une fistule si
l'urethre n'est pas bien

Cure

Fistules au dessous du pubis urethrales ou vesicales

Signes comparés

les vesicales

traitement

Sonde

reta bli mais q.d il y (voi) bientot elles sont guerries fistules urinaire au dessous =du pubis=

Mais lor. fistules s'ouvrent s'ouvrant au perinée par la crevasse, le cul ou dn lieu dont les dernieres ont de l'analogie avec les urethrales mais elles different voici comment

Ds les urethral l'urine ne sort que quand la vessie est contractée pour expulser l'urine tandis que ds les vesicales les urines coulent continuellement &c. sont ss. le concours que le besoin d'uriner se fasse sentir ou non

Les fistules urinaires vesicales se traitent par la sonde ordinaire très grosse ou la tient debouchée les jours + e couche du coté opposé—

si l'on est jeune
a le précepte les fistules
Condition de guérison — guérissent = pour compléter
la cure il faut continuer
quelque temps l'usage de
de la sonde pour
donner le temps à la cicatrice
de s'affermir

= Mais qd extérieurement
Cas d'incurabilité — perte de substance de verrue
sont grands, alors
la fistule ne se guérit
pas =

= quelquefois les parois
raviver les bords — n'ont pas les conditions pour
l'agglutination alors = baume
vert de Metz, ou autre
stimulant, sont injectés
doivent rafraîchir les bords
et leur faut se cicatriser

Fistules urethrales — = Les urétrales viennent
d'une crevasse tantôt de la
partie membraneuse tantôt

tantot de la partie spongieuse
... repondent aux s [illegible]
ou aux 1d orinée ...
= differ par grandeur de la crevasse
tantot portion considerab tantot
peu = quelquefois

Differences
grandeur de la
crevasse
—
nombre des
orifices
—
situation
—
état
—
etat de
l'urethre

tente de s ... quelle
que la nature ne peut plus
... reunir ±
= differ encore par le nombre
des orifices leur lieu de
situation l'état de l'urethre
plus ou moins retrecie
= par rapport au
nombre des orifices quelquefois
un seul d'autrefois 8. 10 &
ils vont tous aboutir
au même point de l'[illegible]
... du canal.
= par les orifices les uns laissent
beaucoup d'urine les autres peu
= l'urethre est quelquefois
retreci d'autrefois il conserve
tout son calibre

Situation des orifices

tantot situés au perinée ou scrotum aux fesses jusque près des tubérosités où il y a souvent des duretés et callosités. Ce n'est qu'une simplification telle dont on doit pas tirer d'indications ce les urines ne coulent pas cela se [illegible]

Outre ces fistules urinaires il y en a encore de la glande [illegible] opération du 22 messidor

Cause des fistules quelconques

La cause première immédiate d'une fistule urinaire quelconque est le séjour des urines et le trajet fistuleux = Mais le passage suppose ouverture du canal qui suppose diverses causes ainsi que les [illegible] quand pour traiter

Commentse fait la Crevasse

par retrecissement

par une operation sur l'urètre

= le plus souvent celle-ci est une suite du retrecissement du canal qui ont eu des gonorrhées = les efforts qu'on fait les sujets ont determiné pression laterale plus que sur les parois celles-ci qui ont éprouvé l'erosion de leur tissu s'en écrasant la crevasse alors les urines passent dans la cellule et y séjournent plus ou moins et deviennent fistuleuse =

= La fistule est aussi la suite d'une operation sur le canal de la taille une incision pour extraire un calcul engagé [illegible]

= de la taille qui l'urètre a perdu de sa [illegible] la plaie ne peut se consolider les urines sortent par là et entre temps la fistule

= [illegible] en a [illegible] après les ouvertures faites [illegible] extraire

Calcul on n'a pas
mis de sonde, les urines
par entre les levres s'y cicatrisent
séparément et il reste une fistule

— on a une fistule
resultant d'une contusion
du perinée, qui a fracturé
l'urètre à la région perinéale
et les urines passaient
par la cicatrice une fistule

— quelque soit la [illegible]
de la [illegible] de l'urètre
les urines passant par ce
trajet fistuleux en empêchent
la réunion — l'irritation
que l'urine excite dans les parois
des fistules urinaires
qu'elle y séjourne y produit
un engorgement [illegible]
et qui se termine par induration
ne se résolvant pas
parce que la cause est
toujours là — ces callosités
représentent une espèce de corde
depuis l'ouverture jusqu'à celle de
la [illegible]

par une
contusion du
Perinée

—

Cause des
callosités

—

leur aspect

—

de là, la dureté que contract quelquefois périné le scrotum et les callosités de plusieurs fistules se rapproche se confondent.

Signes des fistules

Signes des fistules

— ou commémoratifs tirés des circonst. de la formation de la maladie = ou actuels tirés de son état actuel des phénom. accompagn. ...

Commémoratifs

— Pour les commémoratifs. Une person qui a des fistul. et des ... a eu des abcès etc = si l'on a ouvert l'urètre par la taille ou autrement etc. = si elle est sujette à la taille, de contusion au périnée par une chute etc qui a été suivie d'un abcès urineux qui auront à laissé fistu. le, ou juge la fistule urinaire

Pierre lis, ligne adulte

ligne actuelle

= en général consiste en trou au fond d'une cicatrice d'un enfoncement de la cut. de sa. duquel se présente un trou en cul de poule, toujours humide (caractère) une sorte de corde va à l'urèthre et indique le trajet — le pus est sans urines et même quelquefois l'est, de bonne heure dans des fistules coureur fecaleux = la fistule est toujours mouillée après avoir uriné et quelques gouttes sortent = il est des cas où il ne sort pas d'urine mais les circonstances commémoratifs les progrès de la formation d'une fistule urinaire certifient sa nature =

Diagnostic difficile

= il est des cas où le diagnostic peut être difficile

pourquoi

C'est quand l'ouverture .. ..a a ..rege ..ele .. .. qu'elle se dirige en haut vers la prostate ou voulons confondre avec les fistules stercorale =

Signes contraires

comparaison avec les fistules stercorales

= S'il y a eu des diffi d'uriner = si douleur même actuellement quand il urine et elle .. humecte = si la sonde tenue .. dirige vers l'uretre ou la surface urinaire —

= Mais que cela manque et que le doigt dans le rectum sent un stilet introduit par l'ouverture, on conclut fistule stercorale =

= Souvent le défaut d'attention fait que les yeux .. ..

eclairent cette erreur

observation

= Un particulier vint de Nevers à Paris pour fistule près la marge de l'anus .. chirurgien la crut urinaire

il Met une sonde Elastiq. qui mal assujetie sur sechasses urines de passer au lieu de les faire orter incommoditea = une autre fut appellé, examina plusieurs la malie et voyant certrajet dirigé vers le rectum et que les urines sortant à pas fist sans viciter le trajet, il la fit stercorales, fendit le rectum et guérit =

il n'est pas dangereux de faire cette ope. mais cela ne fait pas honneur au chirurg. Expose le Mde a un traitement desagreable lorsque la nature peut guerir sans inconveniens =

Pronostic

Pronostic des fistules

non danger. très incomm. et si bien des fois elles ne peuvent être guéries que par une traitement assez assujetissant auquel tous les mdes ne veulent pas se soumettre =

= Cependant peu sont qui

peu sont incurables — ne puissent être guéries il y en a cependant fistules après la taille des fistules ainsi que la perforation de l'ulcère de l'urèthre

Traitement — Deux indications générales

2 indications — = rendre aux urines leur cours libre par le canal en lui restituant son calibre s'il est rétréci — s'il ne l'est pas en facilitant le cours détournant par une sonde les urines de la fistule

rétablir le canal — = Le canal est il rétréci il faut lui rendre la liberté au bien guérira radicalement en faisant porter son effort latéral sur la fistule en la rétrécissant = le pourtant assurera la guérison

= souvent on guérit des fistules en mettant des bougies et de la sonde à l'urèthre

Mais si cela n'est pas
necessaire que le calibre soit ordin
aire et que seulement quelques goulées
se glissent ~~[illegible]~~ la sonde sert à les
detourner elle est encore utile =
= si malgré la liberté
de mettre la fistule continue

detourner les urines du trajet — — la sonde doit être
bien assujettie =

= D'abord petitte puis
augmenter ensuite cependant
le trop gros calibre
qui en distendant le canal
écarte les bords de la
crevasse et empêche leur
recollement. mais il faut
entretenir la liberté du canal de la sonde —

emploi des sondes —

= Mais la sonde ne
suffit pas si elle n'est
toujours débouchée — ce qui

importance de les tenir débouchées —

exige de jour au lit ou
urinal pour recevoir l'urine
= si on la tient
bouchée l'urine s'amasse
les mdes ne debouchent

que [illegible] besoin d'uriner, et
comme la vessie conserve son
ressort les urines sont
expulsées et comme les urines
ne peuvent passer assez rapidement
par la [illegible] pour corresp
ondre à la vivacité de la contraction
de la vessie, il en passe
entre la sonde et l'urethre qui
s'introduit dans la fistule et empeche
sa réunion =

= il en a vu porter des
sondes bouchées pend[ant] 7-8 mois
sans guérir et qui guérir
en 15 jours en la laissant
ouverte =

= le plus souvent ou
guérit ainsi, mais qq fois
la fistule rentre alors
voir la cause de ce [illegible]

autres causes qui s'opposent à la guérison

= la direct[ion] du sinus
fistuleux empêche qq fois on [illegible]
et la guérison il en est
où il ont fallu exterminer à la racine
les [illegible] la fistule
se dirigeant en haut et en
arrière

Direction du sinus

de l'orbe que son fond
est déclive circonstance qui
seule peut empêcher la guérison
en retenant le pus &c =
= alors on est obligé
d'ouvrir le trajet comme
aux autres fistules

ouvrir le sinus

= il est des fistules dont
la peau qui recouvre
le trajet est amincie
desorganisée brune = c'est
encore le cas d'ouvrir

peau desorganisée

ouvrir encore

= il est des fistules
à parois lisses d'autres
à parois sanguines &c
conditions sont contraires à l'agglutination
= injections stimulantes dans
ces parois =

etat des parois injections

= il en est dont l'ouverture
est très large point propre
à l'agglutin. souvent un
petit broching mis entre
les lèvres les met en
état de s'agglutiner
leurs bords ne tous longues

etat de l'ouverture

déperdition
trop grande

mesures

ce qu'il reste
à faire

= Vient aussi la difficulté
vient du trop de déperdition
les bords ne peuvent se
rapprocher malgré les [illegible]
[illegible]
= il ne faut s'occuper
que de pourvoir facile
[illegible] et veiller aux
[illegible]
il faut toujours favoriser [illegible]
de [illegible] afin qu'elle
ne s'infiltre pas [illegible] le tissu
cellulaire commun de la
fistule = qu'il n'y ait aucune
fistule ou qu'il [illegible]
[illegible] le traitement
ne diffère nullement.
= qui veut juger des
progrès de la chirurgie [illegible]
la lecture de [illegible] on le
voie s'occuper à ouvrir les
fistules, à débrider les callosités
à [illegible] [illegible]
on [illegible] aujourd'hui de ces
précautions puisqu'on a [illegible]
que ces callosités se dissipent
quand l'urine ne passe plus

du 26 messidor

Corps étrangers

Des corps étrangers des voies urinaires

Les corps étrang. pour venir du dehors par canal naturel ou par les chemins qu'ils se pratiquent ... qu'ils puissent s'y engendrer

= Les corps étrangers venus du dehors varient

Venus du dehors

singulièrement par rapport à leur figure, volume et à la disposition de leur surface qui les rend plus ou moins propres à irriter à agacer les parois de la vessie.

Différentes

on a vu des épingles des aiguilles des morceaux de caille les balles des pièces d'appareil. charpie &c. déterminer de la canal ... ... jeune ...

leurs effets dans la vessie

et leurs signes

la vessie ; ou bien on
a vu les bales penetrer
dans la vessie servir de
noyau a un calcul.
= Les corps étrangers venus
du dehors et qui pénètrent
dans la vessie par l'urètre
ou par une plaie
donnent lieu a des accidents
plus ou moins graves
en raison de leur volume
de leur forme, de l'irritation qu'ils
produisent — leur sejour a la
vessie se propage le long de
l'urethre, envies frequentes
d'uriner, augmentation des
douleurs après, les urines
[illegible], [illegible] les
effets et les signes
qui annoncent
la présence des corps
joints aux signes commé-
moratifs

Quand ils ont été y resteraient

arrêter

dans l'urètre

moyens

= Mais s'ils ne (ssaient) pas de tout au gré (d'entr)ant ils ne s'oient pas extraits, ils s'arrêtent dans le moyen à un (obstac)le au milieu duquel on les trouve =

= quelquefois il s'arrêtent dans le trajet de l'urètre, une épingle un petit morceau de bois et ... s'arrêtent lorsque l'auteur rend les urines difficiles =

ou bien c'est un morceau de sonde (...) qui s'est cassé dans l'urètre par son peu d'adresse qu'il n'ait plus avant exercé une sorte de moyen qui a passé l'urètre où (...) après être retiré le corps

par les pincette soutenir
ou bien en la poussé
de derrière ou devant
== il ne a retiré même
les pinces a quatre
de soutenir qui ne
servent que tenues au
corps — mais si malgré
cela on ne peut retirer
cela devient impossible alors et surtout
si corps étrangers rendus
dans la vessie — alors ou bien
on attend qu'il ait
servi de base a
un calcul ou bien
on fait de suite la
taille
== lorsqu'une personne
personne fait usage
de sonde ou de bougie
il faut donc bien
les attacher

nous retirés
rendus
dans la
vessie

que faire ?

= mais lorsque les urines
Sarcocele — y ont une grande Bougie engagée
de la présence — dans l'urethre il ne faut prendre
du corps — que a la partie des temps certains

= un jeune chirurgien
suivant les cours chez
Observation — citoyen Boyer il y a deux ans
avoit un retrecis pour lequel il
consulta Boyer qui lui conseilla des Bougies dont il
ne se servait que la nuit
il ne les attachait point et il
les reglait sur la sensation
= les Bougies excitaient l'érection = une nuit
il se reveilla sa bougie
[illegible] ne trouva plus sa bougie
la cherche dans son lit et
toucha à sa verge sentit
une dureté (le retrecissement)
il crut avoir cette portion de bougie
dans l'urethre — il s'en alla
avec une autre bougie

et tirait sentir la présence
= il avoit, disoit M. Roger
qui examina l'urètre,
s'introduisit une bougie qui
ôta de la sondeuse et s'arrêta à
l'obstacle = il lui demanda s'il était
constipé (non) il le fait
uriner, l'urine passe bien
= Roger lui dit que
probablement la bougie n'est
pas dans l'urètre. = le
lendemain rien, tous
les symptômes calmés et
il n'avait pas de bougie
engagée dans l'urètre

= si la crainte de comprimer
l'urètre pendant l'érection empêche
d'attacher (ut supra) il faut laisser
au bout de la bougie
un fil très long et libre pour
la retirer si elle s'enfonce
= il est bien plus
ordinaire de trouver des
calculs

précaution
si l'urine
veut pas
venir
l'urel
calcule de
la vessie
&c.

Calculs des voies urinaires — Des calculs des voies urinaires

on ne les considerera que chirurgicalement, laissant de côté leur histoire chimique et leurs causes =

lieux où ils se forment — les calculs se forment tantôt dans les reins, enfin dans la vessie. = d'autrefois entre le prepuce et le gland ou dans les fistules, dans le tissu cellulaire qui environne l'urethre =

graviers des reins — = quelquefois les calculs des reins paraissent comme des graviers que le malade rend avec les urines. on les dit graveleux et les malades attaqués de la gravelle

ils passent librement — = quand ils coulent librement dans les entonnoirs dans le bassinet et passent

de brement pour s'irriter ils sont
bien remarq. par la rétraction
ment inconvenient.
Mais s'ils sont trop abondants
aux
Ils le s'passe les retient

de sont = Douleur de reins dont
retenus le long des uretères
arrêtés douleur qui ne cesse que
par des boissons ou les
bains on a facilité
le passage =

= g fois le passage
inflammation donne lieu à des inflammations
(vile s'opéra)
le calcul
= d'autres fois il s'arrête
dans un conduit des reins
et là s'accroit par
calcul couches superposées il
rénal devient calcul rénal
= ordinairement ses ramifications
qui se tiennent dans plusieurs
entonnoirs forme des racines

ui
pensent aucun de leurs graces
produire apparait ... par
par les ... etc.
— ... autrefois ... dalid
et on ... tout surpris
de trouver ... le ...
d'une personne qui ne
s'est jamais plainte,
un calcul volumineux
— c'est ce qui rend le
diagnostic difficile.

— on a vu des garçons
très maigres porter un
calcul volumineux de
rein qui formait comme
bien des bosselures dans la
region iliaque entre la
crête et les fausses côtes
... garçon ... Trouslin
— on le ... vit
dans les ... par
la ... ...

effets

le

Faut il faire
la nephrotomie
...

on dit qu'elle a été
pratiquée sur le devant
des uns veulent que l'on incise le
par devant les autres par
derrière
— toujours il la faut
faire
— plusieurs raisons très
Solution exemplaires un chirurgien
— la plus forte est
— on exige pour la taille
certitude physique de la présence
du calcul et la sûreté
et imprudent serait regardé
un chirurgien qui sur
de simples signes rationels
sans toucher pratiquerait
la taille
la taille à plus
forte raison faut il de
la certitude parce ~~l'~~ hypothèse
plus dangereuse que la taille
et qui ~~...~~ suivrait
à la ~~...~~ sculation

el

si défaut de succès
ou [illegible] impossible, l'Assureur
jamais à même ne peut atteindre
la [illegible] ne [illegible]
quelque autre [illegible]
n'hésite pas l'assistance [illegible]
faire la pierre où ne [illegible]
la bronchotomie

pratique d'ailleurs [illegible] sollicitude
le danger d'ouvrir de gros
vaisseaux dont l'hémorrhagie
ne pourrait s'arrêter la
crainte d'un épanchement
d'une inflammation [illegible]
[illegible] éloigner

c Contentifs — il ne [illegible]
ou Palliatifs — des bains [illegible]
et [illegible]
— quelquefois des petites
retirés [illegible]
dans les [illegible]

Calculs arrêtés a l'extrémité infre de l'uretère

leur trajet par des couleurs — quelquefois ils sont retenus a l'extrémité inférieure de l'uretère vers la vessie et portent aux reins il peut y avoir fièvre. Contraction ou peut a causer des coups de fièvre.
Et cependant le sujet meurt et a l'ouverture on trouve un calcul a l'extrémité inférieure de l'uretère.

observation

== Cela est arrivé a des forçats qu'il voyait et dont l'enfant en voyant uriner = mort ils auraient trouver quelques vers == mais fournit y avait eu deux leurs vers les reins ils cherchèrent trouvèrent un rein gangrené ouvert et un calcul arrêté

de l'extrémité inférieure de l'urètre =

on ne peut jamais en avoir qu'une certitude incertaine — toute qu'on peut avoir

Traitement — l'examen requis de la vessie — fomentations émollientes boissons diurétiques et mucilagineuses pour faciliter le passage = si le corps étrangers passe outre et de la vessie tous ces accidents disparaissent =

Calculs de la vessie — = Calculs de la vessie

= Il sont plus fréquents qu'il viennent du rein que dans le reste de la vessie ordinaire — ont il y en a qui se forment dans la vessie dans la base d'un

differences | cal cul
— ils different en nombre tantot multiples tantot solitaires — multiples 2 3 4 · 50 · 60 de alors fort petits — s'ils sont seuls ou tres gros ils prennent alors un accroissement

par leur manière d'être | — par leur manière d'être dans la vessie — tantot mobiles pouvant être deplacés être entrainés par les urines portés sur le col dans l'intervalle à paroi fermées rendues au dehors de differentes manieres =

partie dans l'urètere | — quelquefois un calcul est partie dans l'ureter et partie dans la vessie

Partie dans la vessie — la portion de l'urèthre est même une couleur celle qui est de la vessie est plus grosse (voyez le dessin)

Urètres — Forme d'une petite pyramide membrane dans laquelle ils se rendent et aux glottes en entrant. Quelquefois ils s'engagent entre les colonnes et par leur poussant la membrane interne et donnent lieu de cellule =

Observation — = L'homme dont nous avons eu une vessie qui n'était formée que par la membrane interne et par dessous cette membrane entre une tumeur calculeuse

bien plus foncée a
celui que le reste
par son incrustation étant
différente =
= 4° fois les calculs ont
[illegible] de graines, la
adhérens membrane s'est boursouflé
et fondue entre les inéga-
lités et les couches [illegible]
ajoutées la dessus - - c'est
la des calculs adhérens
et non enkistés
= différent par le volume et
la forme = [illegible]
Par leur ronds aplatis, lisses
volume uniformément ou à
et leur facettes = on a aussi
forme - [illegible] multipliées
[illegible] les fait appeler
[illegible] pour [illegible]
assez le fruit du [illegible]

— on ne sait ni,
comment ils se forment
ni la cause qui
determine leur formation

leur effet

Effets

= Lors les calculs
ne donnent lieu a
aucun accident ou su
paraîtraient de si legers
effets qu'on ne soupçonne
pas leur existence

Observation

= un individu de 62
ans était depuis long temps
à la Charité = il [illegible]
a [illegible] j'éprouva quelques
cuissons en urinant elles
furent attribuées a l'échauffement
[illegible] de grande [illegible]
[illegible]

n'était lésé il Paroit
v au mirage vais être
guiron malé =
il est une idée
interne par cause morale
après laquelle symptôme
dépendant du calcul ou
par sensibilité augmentée
ou par augmentation du volume de la vessie
il est une douleur
tant vive au moment
le calcul a été trouvé
très gros et le malade
fut opéré

Mais le plus souvent
dans la région de la
vessie douleur plus ou moins
vives qui sont rapportées
au bout de la verge
plus vives après l'urine
rendue

V. signes

quelque fois ! c'est là tout

= les enfans sont déterminés par cette chaleur du foie et sa verge à la frotter — les enfans qu'ils ont encore chaleur [illegible] leur verge [illegible]

[illegible] calcul [illegible] les autres [illegible] leur [illegible]

Chez les enfans

= [illegible] chaleur [illegible]

après l'éjection de l'urine vient [illegible] augmentée du [illegible] mais [illegible] immédiate du calcul [illegible]

= [illegible] l'urine [illegible] communiquent [illegible]

Suitte les signes

... est sorti donné avec
... la cardie ... en urinant
... ne ... du ...
de la membrane interne
du rectum et ...
Ce qui ... dois
faire croire plutôt une
... du ...
que de la vessie =
Celui qui aurait
un calcul excité
observation ... tout ...
... long ...
les ... une
légère douleur en urinant
... assez ...
... le ...

état des urines
... les urines ... ont
été moins claires ... et
... couleur ... ...
sont chargées dans les urines
de ... cette différence
ne doit pas être oubliée

cependant quelquefois les urines sont ... replaut ...
fait ... urines ...
... ou ... urine
... par l'expectoration
= ... meurent ...
Effet de l'exercice ... sueurs ... cependant ... urine ... ils éprouvent ... couleur ... urine ...
= ... les urines
écoulement des urines ... la suite ... calcul
= ... ignore n'est pas inséparable du calcul mais il ...
il est ...

= mais tous les exemples
che sont pas encore …
ayant été rapportés
… des autres …

Signe le plus certain

… il ont
… en … la …
… contre quelque …
… Car … …
… peuple &c
… Juge …
— Mais … …

… une … à éviter en voulant

= une … entre la
… et le … peut
faire … calcul
… le …
… agent …
… idem …
… de la …
= mais elles …
… …
… cas

attention
Pure
Provence

---

on ne voit les étoiles
qu'avec le sans [illegible]
latéralement on voit
la latérale [illegible] la
convexité la concavité de la
corde

Mais on peut
croire qu'il n'existe
pas quand il existe on
vice verra
[illegible] pas
[illegible]
[illegible] eff
[illegible]
[illegible]
— le choc de la roule
[illegible] la [illegible]
[illegible] de [illegible]
qu'on ne le [illegible] pas
il ne faut pas [illegible]
croire qu'il n'existe
pas

Calcul reconnu

Moyens Palliatifs

Cure radicale

le calcul reconnu ou il dort ou specifié on non — car quelquefois il gêne à un empêchement alors il faut pallier par quelques remèdes ... à la sonde ... mais malgré cela ... le calcul est gros ... croît ... les douleurs devien a trous ... le ... tombe

= mais toutes ... que la sonde est ... rien parlant ... autre ... que l'opération a pratiquer car on ne doit pas compter sur les lithontriptiques

Du 27 messidor
Calcule, expulsés par l'uretre
= Les Calculs de la vessie qui sont peu volumineux peuvent être expulsés par l'urètre — ...

Calculs sortants par l'urètre.

... ... des pois ... ... cela arrive plus souvent à ... ... cette ... plus dilatable n'a pas de prostate

= quelquefois aussi les pierres arrivées à canal ... urine difficile ...

Calculs arrêtés dans l'urètre

d'efforts

= urine trouve ... entre l'urètre et le calcul ... peut s'opposer à cet état et ... ... calcul de l'urètre

L'urine passe encore

= alors le ... de projet de ...

y ant arrêté l'effort latérale e porte
sur les
parois lue tournat les cloues-
de leur axe et prenant un
placée une ouverture ventrale
[illegible] que l'on fait
disparaître en [illegible]
[illegible] l'urine [illegible]
jean [illegible] des [illegible]
[illegible]

qu'y
faire?

Tout ce qu'on peut faire
[illegible] de [illegible]
urines [illegible]
rétablit [illegible]

— [illegible] le calcul arrête

l'urine ne
passe pas

[illegible] les urines au point de
[illegible] une ligne en
le [illegible]
[illegible] le corps étranger avant
d'avoir recours aux instrumens
[illegible] il faut
tenter le moyen que
[illegible]
[illegible] un jeune
homme de 18 ans

1er Moyen
a tenter

—

boissons
diuretiques
retenir
urines

—

il réussit
quelque fois

—

= faire boire abondamment
d'une tisane legere diuretique
infusion de graine
de lin un gros de nitre
par pinte : se retenir
d'uriner pour etre les
urines pour atteindre le col
de la vessie de se
présenter au moyen
mais de pousser le bout
de l'uretre et mêmes
temps qu'on contracte
portant les reins peut
[illegible] avant
tout cela on peut essayer
[illegible]
= ce moyen réussit quelquefois
la pierre est élancée
avec force — si cela ne
réussit pas le [illegible]
[illegible]
[illegible] tant que
[illegible]
moyen

... chez le ... fonctionne
... pour tout
= les 2-vers pour rien

exemple 1

il voulait que ... le 3e jour ... il ...

= aux jeunes de tous les ... employés pour cela voici un moyen ... les jeunes de haute ... employés inutilement

autre moyen

— il consiste dans un fil d'acier bien fin ... formant une bourse que l'on porte dans l'ouverture et l'on fait ... engagée ... le calcul et de l'entraîne

il a employé ce moyen 2 fois les ... tentatives ne réussirent pas mais enfin il parvenait à ébranler le calcul à le faire sortir

Calcul arrêté dans la fosse naviculaire

= quelquefois le calcul arrêté dans la voie ... [illegible] ... ouverture ... [illegible]

Et ne peut être extrait. Dans ce cas au lieu de ces ligamens des tentes pour [illegible]
on doit glisser un bistouri retourné en tranchant vers la partie inférieure de l'uretre et couper

Calcul entre le prépuce et le gland venant de la vessie

= Quelquefois la pierre se trouve entre le prépuce et le gland elle tantôt elle vient de la vessie elle est oblong ou rond mais se trouve chez les [illegible] du prépuce dont l'ouverture est trop étroite pour la laisser sortir cela se voit chez les enfans ayant des phimosis très étroits
on y fait le calcul entre prépuce et la petite ouverture et la bouche au on a présenté un enfant

exemple — dans le cas a Petit-il retenu la pierre

porta un Stilet de l'ouvrir
déplaça la pierre, just ainsi
il voulait inciser, la mère
ne voulait pas elle le fit
venir en repouss. ainsi le calcul
= on dira un peiques
de forme dans le prépuce
Sur le gland — la cause,
les incrustations qui se forment
sur le gland auxquelles
le gland sert de moule
— on ne peut les extraire
qu'en pratiquant l'opéra
tion je traiterai;

Vermée
Sous le
Prépuce
—
Cure

Calculs hors
des voies
urinaires
—
= indépendam. des calculs
des voies urinaires on en
rencontre quelquefois hors de
ces voies. hors de la
vessie Et de l'urètre
= il ne parle pas des
calculs qu'il a trouvé

dans l'ourra
que

dans l'ouvrage un
sujet adulte il y en avait
plusieurs — ils devaient
évidemment devenir bien
gros car les urines se
portant peu de tiers — ils
présentaient un gd volume
il est donc une [illegible]
traction en s'était difficile

— Les calculs hors des voies
urinaires — ont trouvés au voisinage

Calculs autour de l'urètre

présentant [illegible] sur
lesquels les tissus ne font
rien — résultant d'une
ou de plusieurs pierres

— Comment les a t on
des calculs s'y sont
ils formés là ou ont ils
passé? Est il soit en perçant
l'urètre ou s'y sont ils
formés dedans en [illegible]?

Comment se forment ils?

Dans le tissu — La Cause —

— Art. 2 forment
— Cela n'arrive qu'aux gens qui ont subi la taille surtout ceux qui appareillez qui on a beaucoup de tiré l'uretre — on les personnes qui ont eu une contusion ou piqure
Dans les cas ou l'on suppose une fistule urinaire suite une perforture de l'urethre
mais pour que cette Dernier donne lieu a un calcul il faut que l'ouverture soit tres petite pas assez considerable pour produire depot urineux il faut qu'une tres petite quantité d'urine s'attache a une cellule qui sait assez de rayon ou lequel de nouvelles urines appliquent un calcul Dont ...

— lorsqu'on voit de ces
tumeurs dures [illegible] avec
lesquelles les [illegible] sont venues

Signes

[illegible] [illegible] un [illegible] qui
a été taillé on a eu
[illegible] au [illegible] aux
[illegible] un [illegible]
calcul ou plusieurs [illegible]

— Pour extraire on fait
une incision aux téguments

Traitement

de l'abdomen [illegible]
sur le [illegible] avec une
[illegible] que [illegible]

— Le [illegible] se
tailla lui même [illegible]

Observation

[illegible] qui avait été [illegible]
taillé [illegible]
une [illegible] de [illegible]
dans le tissu cellulaire

— Mais lorsqu'on a retiré

Traitée aussi la [illegible]

ainsi une pierre on n'a
pas tout fait — il faut
s'occuper de la fistule
interne la [illegible] du
canal pour laquelle
[illegible] qu'on laisse

[illegible] la contraction
l'aine pleine de [illegible] et
[illegible] au [illegible]

incontinence Durine

De l'incontinence d'urine

[illegible] quelquefois [illegible] l'incontinence — considérons ds les enfans et ds vieillards

dans les enfans

ds les enfans c'est ordinairement la nuit — quoique ce ne soit pas une maladie les parens s'en inquiètent surtout q̃ les enfans ont acquis un certain age —

Causes

Petit en a reconnu plusieurs causes — les uns pissent par paresse [illegible] au besoin [illegible] [illegible] ils s'endorment il ne sont plus excités par le besoin cependant [illegible] q̃ n'éprouve la [illegible] [illegible] [illegible] de cette vessie [illegible] [illegible]

— D'autres révent qu'ils
pissent Lorsqu'il urinent
mais cela est moins
fréquent

— le remede de cette inf
irmité ne doit pas être
Traitement — ds les poudres it écarlate
la r[illegible] brulée
— il faut les faire uriner
avant de se coucher s'ils
sont trop jeunes pour que
les reprimand les Mettre
les corrigent. il faut les
reveiller la nuit — Mais
s'ils parvien a un certai
age avec cette habitude il
faut les punir et les
punir publiquement leur
inspirer de la honte

— un jeune homme de la Saur
observa-tion — le de Lowendal a 14
ans pissait en son au
lit. Brayer consulté
conseille les reprimand et
de reveiller la nuit

– Cela fut voir ... il conseilla de le faire ... publiquement il ent ... le fouet ds le college ... publiquement par le ... public et on le fit le payer généreusement cela lui fit une telle impression qu'il fut corrigé

= Mais ql pare ... cause ... jeudi ... ses ... inegalement

Cela etait frequent lorsque ... du ... paru

Cela est plus rare aujourd'hui chez l'homme

= Mais ds la femme ... toujours tres dilaté ds l'operation au dessus du ...

De la suite de la taille

frequente chez les femmes

— Celle qui vient chez les vieillards cède aux irritans aux vesicatoires sur les lombes. Cependant souvent le ressort du col n'est que momentané.

Chez les vieillards cure —

+ on doit ... incontin. et après la taille employer ... un qui ne peut être remplacé ... la femme ... un urinal = la compression de l'urètre est difficile cependant on peut la pratiquer sur les femmes mais la plupart la supportent mal

Moyens à employer pour l'incontinence incurable

+ Dans l'homme on employera ou un urinal tel que les mouvements et l'agitation ne fass pas ressortir l'urine — ou bien on emploiera le brayer

opé appellé compress de l'eceltore ou de Nucy qui est laissé jusqu'au recevoir d'urinner que se guérit par la meme mais qui remedie aux accidens qui l'accompagnent —

du 28 Messidor

= Les Md de Saum

Maladies de Saum

Maladies de Saum — ce sont les abcès = fistules = hemorrhoïdes tumeurs accomat... ... des ... Guarit ... le ... aux ... qui dégénère en cancer & qui est sont appelé cancer du rectum —

Abcès d'amme — Les abcès d'amme peuvent être distingués en abcès chauds [illegible] et en abcès [illegible] froids.

= Les abcès [illegible]

Abcès [illegible] froids ont des phlegmons pour [illegible] dans lesquels les symptômes inflammatoires ont plus [illegible].
Suivant la cause, le [illegible] [illegible] [illegible] pour [illegible] [illegible] été [illegible].

([illegible])

Cause — tantôt un [illegible] interne un principe [illegible] qui [illegible] [illegible] [illegible] tissu cellulaire qui environne la [illegible] [illegible] détermine les [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

ces personnes imaginés ... ...
... hemorroïdes, ...
l'inflammation = ... bien produits ...
par une ... ...
... ... une ...
... ... = ...
... ...
... ... en passant ... ...
... ... avec une ...
... ... avoit ... ...

... signes

... par la chaleur, ...
... douleur ... comme
... toutes les ... qui
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... tout en abondance

Signes

... ordinaire

Traitement, — Traitement =

du Phlegmon par tous les remedes particuliers et generaux indiqués a l'article du phlegmon = Saignée, veillées, ... cataplasmes emollients de graine de lin et decoctions ... emollients, ... et tout ce qui peut ... relâcher ... la douleur ... accélérer formation du pus ... ouvrir les portes d'abcès

abcès qui en résulte = lorsque l'... ... ... et que la peau est rouge il faut ...

prompt ... a la ... 8 jours

court = ... il est ...

... le fond est ... remonté ... entièrement par les couleurs elle peut ... à ... pl. viennent ... mois sans autre signe que des couleurs. Ay ... le ...

= il on a vu une peinture onze mois en grand ... ses couleurs ... paraissent plus vives ... la fin ... et en 15 jours ... se manifesta un abcès qui fut ouvert ... beaucoup de pus ...

- Voici la marche des abcès non stercoraux

= La destruction du tissu cellulaire par la suppuration fait que le côté ... correspondant à la ...

Exemple

Marche des abcès non stercoraux

La bourse reste gêté
ce qu'on appelle la
dénudation — Cette dénuda
est proportionnée au volum
de l'humeur, mais
aussitôt l'abcès ouvert
les parties reviennent sur
elles-mêmes, se rapp
autant que la dénuda
On donne peu le
permettre et d'autr
il ne reste qu'un pet
espace
non réuni qui donne
lieu à une fistule

Traitement — Il est de règle
d'ouvrir de très bonne

Ouvrir de bonne heure — heure les abcès de la marge pour empê
cher la dénudation ou le décolle

considérée [illegible] ainsi
donc s'il y a [illegible]
[illegible] en dedans [illegible] de traité
rité [illegible] une [illegible]
[illegible] =

= on demande s'il
faut se contenter de [illegible]
l'ouverture se rapproche à la tumeur
au [illegible] au rectum,
ou s'il faut la fendre
de [illegible]
[illegible]
la fistule [illegible]
[illegible] =
— les sentiments ont été
partagés
= il a été un temps
la [illegible]
toujours [illegible] le rectum
était [illegible]

Faut il fendre le rectum ?

[illegible] partagé [illegible]

— qu'en suitte elle a … instic
… … … au pris
de laisser … …
… … … de-
… … …
… … … …

— Voici … quel
Conseille —

Conduite à Suivre

═ … … beaucoup étant
Considerable, occupe non
seulement un côté mais
presque toute la circonf. du
rectum que le pus peut
… … … …
beaucoup … , il faut …
… … … incision
… … … incis
le rectum … …
… aurait … … …

Si l'abcès est avec g^de de nudation ne pas ceindre le rectum

—

le temps d'un ... [illegible]

en ... e ... cependant [illegible]

... par les pansements ... il

... une fistule ...

aura moins à ...

— il reste bien une fistule

qui ... [illegible]

... aura toujours moins

de delabrement à faire ... il ne reste pas de fistule

— un Nom ... [illegible]

... quand

Observation habitue à ... [illegible]

... [illegible]

... une ...

elle ... [illegible]

... cheval ...

... il ... [illegible]

... plusieurs ... [illegible]

Vincent ... [illegible]

il se trouveroit
pas de [illegible] a la
[illegible], pas de [illegible]
le [illegible] [illegible] [illegible]
pas de [illegible] = [illegible]
[illegible] 10 [illegible] après
il ne remarque aucun
engorgement = mais [illegible]
[illegible] [illegible]
fut appliqué [illegible]
[illegible] [illegible] soulagement
les douleurs augmentent
un [illegible] qui paroit [illegible]
de [illegible] cela [illegible]
[illegible] en 15 jours
il [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] comme
[illegible] les [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] douloureux

71

faisait des efforts douloureux
pour aller a la garde de la
ville p[...] lui = ce faux effort penible
la hauteur de l'arbre = les [...]
retenues, furent au [...] a [...]
[...] [...] [...]
= [...] [...]
plus [...] autour de
la [...] = 2 incisions
furent faites une a droite
l'autre en gauche il sortit
beaucoup [...] plus [...]
grand, [...]
rectum etait devenu,
[...] [...] partant de
droit dans [...] un [...] enorme
[...] grandeur autour du rectum =
— [...] [...]
la [...], indiquaient
[...] [...] adhesion

des téguments d'un [illegible]
Cette étendue un [illegible] du rectum
[illegible] qu'il et [illegible] dans [illegible]
= fin [illegible] fin [illegible]
[illegible]
ont revenant, les bords des fistules
a [illegible] la [illegible] de
[illegible] et en 2 mois
2 mois 1/2 les fistules
ont été en bonne forme
et [illegible] opérée
aucun accident ni rechute
= Mais dans les cas
il faut fendre en avant
[illegible] la partie
inférieure [illegible]
[illegible] rectum = [illegible] cela
fistule [illegible] même
[illegible] ne [illegible]
pas [illegible] immédiate-
ment [illegible] =

Savoir il faut fendre le rectum —

Abcès — Des abcès stercoraux =

stercoraux — sont entretenus par une crevasse
d'où suintent des humidités stercorales
par cette ouvert et souvent
séparant le tissu cellulaire =

— ils sont distingués
1° petits = tuberculeux
différence 2° les moyens = phlegmoneux
3 = les plus considérables sont les
abcès stercoraux gangreneux
dans lesquels il est si dangereux
que souvent terminé par
la gangrène

abcès tuberculeux = ——— personnes disposées
hémorroïdes internes sont exposées
aux tuberculeux et aux phlegmo

Ab phlegmoneux — il se forme un dépôt ment à l'extérieur et à l'intérieur ~~[illegible]~~ une tumeur qui pousse l'intestin en dehors perce par l'engorgement de ses parois quelque fois la guérison — les matières

Progrès — stercorales sortent et forment une tumeur les matières entretiennent une inflammation = il paraît une tumeur peu [illegible] que le [illegible] prend par un [illegible] est qu'il excité par l'engorgement de la [illegible] = cependant elle [illegible] s'ouvre il reste une [illegible] se ferme fistule

ils se terminent par fistule — petit trou et fistule une petite ouverture qui quelquefois se ferme pour quelque temps et bientôt se rouvre mais ne guérit point

interne la chev ...

= ... l'ouverture est plus

produisant de que le passage les ... soit abondant ...
quelquefois ... urinaires plus ... plus ...
... tention il viendra une tumeur
de phlegmons ... flegmoneuse avec les ... caract
assez graves ... ...

... ... bientôt
... ...

... ...
qui laissent ... ... de lui
encore une ... une fistule avec
fistule ... ... =

= ... ...
ou ... ...
encore fistule même temps ... ...
... ... fistule
... peut a plus

nécessaire d'ôter car il
est utile aux
humidités urinales

Abcès gangreneux

Abcès gangreneux — Abcès gangreneux
il se produit d'une
crevasse c'est ...
l'épanchement retenu qu'elle fait en avant
et même vers la verge

Par une crevasse — il
vient inflam violente qui se
termine par gangrène =

= Mais 1 fois un
corps étranger avalé

Par un corps étranger — a parcouru tout
le canal jusqu'au
rectum où il s'est
trouvé arrêté par présence
de son extrémité qui fait
une bourse ... le ...
des ... ces ...
dans le moment les parties

l'irritation ... fe la page ...
paraît une
... ... étrange
leur termi- ... menaçant
naison de la ... qui ...
... = (voyez
Duvin. Memoir sur les corps
étrang.)
... tout ... est
Traitement accéléré par des ... plus ... cinq
Et ... ...
... suppuration et ... même.
avant ... ...
... ... il y a aussi ...
... = ... dans ces cas ... toujours
pour ... ... le ... jusqu'à
... la ... ... du rectum ... cela ...
... dans ... = ... même
... ... il
... ... peau
laquelle ... ... qui

Fistules à l'anus

Des Fistules à l'anus =

sont de 2 sortes des a bien non stercorales & sterco-raux

Ces fistules diffèrent en ce que

Causes et différence

Les unes sont entretenues par la perforation du rectum et la sortie des humeurs stercorales — et les autres sont entretenues par la perforation du rectum sans 2 espèces

Les fistules non stercor. et les fistules stercorales

Les premières que plusieurs praticiens révoquent en doute

Fistules non stercorales

Leur cause et leur formation

Mais dont il s'est
assuré par la direction
d'un corps tout assez fréq[illegible]
— il se forme ces
fistules ou sont toutes les
parties du corps par
d'autres causes, ou par
l'ouverture d'un [illegible] ulcéré
ou surtout par un
[illegible] car [illegible] le tissu
cellulaire a été détruit, ces
[illegible] du [illegible] en [illegible]
les [illegible] parois
du foyer et leur [illegible]
[illegible] de [illegible]
peut se faire ces.
fistules [illegible]
bon

ales les fistules non sterc-
resultent encore ceci ... ici

autre cause — ... les glaireux non ...
toutot ... vers
devant vers ... estimée de
manière que ... du
rectum reste ... intra... ...
fistule et ... intérieur et
intestins = ...
il ... jusqu'à pouce
d'épaisseur ...

traitement — ... il faut ...
pour ... les ...
haut du ... jusqu'au bas
du rectum ...

observation — = un ... portait a
... de 2 ans une fistule
qui faisait un pouce
d'épaisseur au rectum par le
moyen ...

il fuxat le sa raconta
u la i sula incision
externe i uwant le conseil
de petit — il loudit a
plone de mamiere a
en faire un triangle dont
un côté étant l'anus l'autre
la paroi externe de la fistule
de 3e l'incision externe
— le cent Cond étant bien a le cou
il . tacrifia les parois fistuleuses
tamponna bien avec de charpie
pour eviter ceux ci entre eux
tint toujours l'ouverture de
pour que le fond se
remplit premiere –
la fistule ne sent jamais
guerir enfin il finit
le rectum se ronge
besieur depuis on peut

jusqu'au bord de
l'anus et lors [illegible] la même
a guérir [illegible] résultats
non stercorales ainsi, les fistules
dites aussi [illegible] borgnes
externes ou ne peut guérir
sans fendre le rectum =

Fistules stercorales

= A l'égard des fistules stercorales elles sont distinguées en incomplettes et en complettes =

incomplettes et complettes

— Les incomplettes sont celles qui n'ont qu'une ouverture interne par où passent les matières. On les appelle aussi borgnes internes =

— Les complettes

sont celles qui sont avec ouverture et ouverture exterieure.

— les Borgnes internes sont rares car un abcès sort se porte en dehors on a ouvert et aussitot le bec ouvert il y a la fistule complette et à ... l'orifice ... bientot ... encore

— Parmi un très grand nombre de fistules, il n'a trouvé qu'un seul sur ... ayant une fistule non complette

— il avait deux ... desorganisée qui ... au levant ... il allait ...

Exemple d'une fistule non complette

Boyer la re commet l'opera
après avoir rendu sa
fistule son petite
le côté a bien bien
guérir =

1 tantot de plusieurs ouvertures
tantot une seule - tantot trajet
droit = tantot trajet
tortueux - tantot peau
... = tantot peau
desorganisée l'ouverture a été
abandonnée a la nature

Etat des fistules stercorales en général

= Signes

= une sonde dans fistule - le
doigt dans le rectum
... au bout le ... ira
... ou a travers les parois ...
on est assuré
= ... mais a une sonde un
pouce ... de profondeur

Signes

Pronostic

Pronostic — Ces tumeurs sont plus fâcheuses que ces tumeurs [illegible]
car le traitement
des matières augmente
irrite et produit [illegible]
— Mais que l'ouverture
est [illegible] est [illegible]
petites il peut [illegible]
un temps indéfini
sans en être incommodé
[illegible] en grande [illegible]
[illegible] qui
exige les soins de propreté

Traitement

Traitement — On ne peut guérir
les fistules à l'anus qu'elles
qu'elles soient sans fendre
l'intestin rectum

voit qu'on a
trouvé que la ligature
accomplit de point
en l'extension qui
lui serait nuisible
= Il ne faut pas
se mettre fort en
peine quand on ne
trouve pas le trous
cou qu'on fait trouver
ou trou la guérison
n'en sera pas moins
assurée pourvu qu'on
fasse le retour mais
la ligature laisse sou-
vent la possibilité
d'une récidive =

Du 29 messidor

Traitement — traitement des fistules a l'anus =

on propose injections = emplâtres

moyens — la compression = cautères caustiques ligature et l'incision

= Les injections

injections — sont incapables de guérir ces fistules ne détruisent pas les dispositions vicieuses de la maladie

emplâtres — = Les emplâtres tirés de l'abbé Doyen a été reconnu impossible que pendant l'usage

Dun emplâtre la
Matière vient guérir
une fistule — mais
on sçavoit que une
crevasse ou canal
cervaux, si la demeure
est considerable les emp
[illegible]

= La Compression
a pour but de
Compression rapprocher les parois
d'une [illegible]
[illegible] pour rapproch. les
parois et les recoll.
— mais l'ampl.
cule du volume [illegible]
celui qu'on ne peut[illegible]

Compression ... quand
du Compression tout ... pression
dites
(accroissent ... par la
crevasse) =
= La Cautérisation
Cautérisation consiste a comprimer
par un caustique le
vrai et ... désorganiser
fondre le rectum depuis
l'orifice interne jusqu'a
l'externe y compris la
portion de l'anus qui
regarde le ...= ou
a ... par le moyen
...
porte le substance
que les ... ne
prennent ...

relever les matières fé-
cales ou ne retient
que la portion brisée

L'excision qui
consiste à tout

Excision

emporter [illegible] auspa-
rant [illegible] ... incisions
semi-elliptiques
toutes les [illegible]
pour les enlever outre
[illegible] Hemorragie [illegible]
s'expose à une
resserrem de [illegible]
qui [illegible] la [illegible]
rend [illegible] les
matières [illegible]
qui en est quelquefois [illegible]

d'usage continuellement des
mèches =

= il est vraisemblable que
l'idée de l'excision a
été suggérée aux auteurs
par cette remarque
que les callosités étaient
la cause des fistules
mais aujourd'hui revenu de cette
erreur sachant qu'elles ne
sont qu'un effet on se
contente d'inciser =

Ligature = La ligature se fait
en haut le trajet fistuleux
par un fil de plomb
qu'on introduit par l'orifice
fistuleux le plus au dessous
par Le Cit. Desault
graduellement afin qu'il coupe
peu à peu les parties
[illegible]

— Mesure qu'il a
touché la produire rement
le pond

— la ligature paraît
préférable aussi elle est qui
la trouvent moins bonne que la
Moins sa durée de
sa doulour fait qu'elle
en procure plus
que l'incision mais
la ligature ne convient
que des les simples
simples

Incision — L'incision consiste à fendre le trajet
fistuleux de toute
son étendue elle
s'exécute aisém ou
moyen du bistouri
— quand — [illegible] — celle

une Précaution

Le pourtour de ... miroir ... la scan... en tournant de pourvu d'une ... cette ... d'un ... claire à ... ... détruit par le séjour ... il faut ... les bords de ...

Puissante Pissante

Ainsi ... cette ... le ... qui est introduit pour exciter ... le ... et produire une ... de révolution

= Mais ... une préparation est élaborée ... la ... ... il faut ... de ...

— il est rare
qu'on a [illegible]
que la [illegible]
la Cure [illegible] au 12 jour
est assurée et qu'on a pansé
ensuite à plat, que
la [illegible] ne guérisse
pas à [illegible]
Orei[illegible] =

Des hémorrh
hémorrhoïdes considérées
par rapport
chirurgical

= de petites tumeurs
Signes inflam. sanguines plus
ou moins doulour

qui s'inscrivent sur les confins de l'ennui au qui ont commencé à tinter dans la mélancolie ... ou deux surgissent d'un intervalle sont les chimères.

— On a bien longtemps que c'était le semble Barrière des vices. Pourrait-on, mais les vices ne sont pas assez violents et d'ailleurs les contrôles ne sont pas douloureux ici clairement, limitation ... où l'on ouvre une barrière au

Sont-ce des barrières?

on trouve [illegible] les [illegible]
et les tumeurs hémorroïdales
[illegible] [illegible] [illegible]
une [illegible] [illegible]
ou [illegible] [illegible]
les [illegible] [illegible]
[illegible] dilatées, [illegible]
non [illegible]
la [illegible] = .

Traitement = on le [illegible]
par les [illegible]
, on le [illegible]

Contre le flux — [illegible] [illegible] [illegible] il est très [illegible] [illegible]

Considerer = Mais les [illegible]
[illegible] qu'elles ont été [illegible]
[illegible]

ouverture, ont des humeurs inflam

tumeur qui doivent être traitées

Phlegmon comme telles =

i .. i serre douleur,

pouls tendu, fort,

tempérament sanguin.

Saigner par &c. = bon à cas

qui ont rouge 10

ou 12 sangsues

suivant l'intensité

de reste ensuite

intérieurement des boissons tendres

= [illegible] ...

= intérieure de les ...

les rafraichissans petit lait

eau de veau ...

pour l'inflam ...

terme le ... mettre
... = les mollets
Exterieurement de la douleur est ...
vive = les ouvrages
qu' ... plus
d'inflam... les
... a ...

= ... attaque ...
un peu de temps
Elles se ... les ...
resolvent ... deviennent
... molles
... car la ...
ne se ... d'un
... =

= Les person...
Garder ... attachés laissant
et ... attendre a la ...

et
Réciter les Ecrouelles
vertus les liqueurs spi-
ritueuses =

= Je fais une plaie
le se resoudre est supres

elles — les tumeurs peuvent suppurer

suppurent — il se forme la peau

= — qui a s'ouvre; mais
il reste une ouverture
fistuleuse à un os
le remet il faut
ouvrir le foyer pour guérir.

elles restent = Quelquefois les tumeurs
restent tantôt indolentes,

elles — tantôt très douloureuses

sont — ce qui détermine ce

douloureuses — ... à mettre a
la séparation

= Cette extirpat{ou} {ou} de la tu{meur}

La Dexter- est externe est très
pation facile et assimil

les bords n'y en
mettent com .. vut

du .. aff ..

= on doit la faire

qd tous les topiques

les ung-suedio

ne ont pas .. villag

Externe = quil ..-este ne tumeur
facile
volon{taire} on en fait
l'excision avec Cautè

= Mais qd .. ont

internes et .. Kireaux .. est inter
Kireaux a l'inceh plus espace
difficile .. fort grave de ..

a la p. elle étoit doulou-
le bourlet, hemorroïdal
Signes des — sort et reste dehors
internes — 2 - 3 - heures avec des
souffrances cela les
engage a retenir leur
excrement ce qui en
rend l'excretion plus
difficile et la sortie des hemor-
rhoides plus douloureuse
= On ne peut les guerir
qu'en excisant le
bourrelet =

= Une Dame portoit
depuis très long tems
Observation — des hemorrh. internes
qui sortoient sans corps pied
aux selles et grosseurs

Pour une grossesse[me] heureuse
en [illegible] grosse et tortue
ainsi après la [illegible]
il a [illegible] souvent un
bourrelet, la [illegible]
très douloureux [illegible]
[illegible] que dans les
[illegible] mais au [illegible]
[illegible] [illegible]
Douleurs [illegible] [illegible]
lui dit que la [illegible]
raison de ces humeurs
pouvait la guérir
[illegible] il
qu'il opéra [illegible]
la [illegible] par les
[illegible] [illegible]
un paquet en
[illegible] beaucoup

cuirult la Ind Convena-
blement étirée il accrocha
le paquet avec une
boucle ; Lanq de la main
interne à une tête
accrocha là il len pa
de Maujea peur
cerclée d'une ma...
tout le paquet
Rexcaison, faite la mul
tame ; se retira = pointe
d'hemarh intérieur il
enfuncea un bourdonnet
de la charpie retira
le bourdonnet par le
bâl qui y était.
Il retira ainsi
a o ... pie = il
salut ... en

car la pression retenant l'urine
a plein ... pendant
...pied ...
...
glan a ... l'urethre
de ... la cicatrice
...
... la ...
et a ... ...
... ...

On ... peut
guerir ... tumeur ...

Résumé des ... et ... Cet
Preuves ... ...
... ... pour
cette operation qui ...
plus ... ...
... hemorrhagie
qu'on arrete ...
par la compression
comme elle a été faite
pour cette ...

Tumeurs polypeuses du rectum = ou polypes

Des tumeurs du rectum

— elles sont semblables à celles des organes [illegible] et surtout semblables à celles de la matrice — il ne faut pas les confondre avec les excroissances vénériennes et les [illegible] du rectum qui [illegible] le sort de vrais cancers

[illegible] une méprise

= Les polypes sont en partie produits par accidents cependant la nature de la membrane [illegible] donne du [illegible] qui sort [illegible] en [illegible] [illegible] =

leur effet

Progrès

en ajère la bouteille
à nez ou prennent les
Effronte sont quelquefois
sortir de l'abdomen qui
n'a élire reconnu =

= il on s'en pourra
introduire le biais t ...
l'on s'est une tumeur

Signe

bulle tenant par un
pedicule, on juge à ...
mais on a plus
de certitude s'il
s'est en arrêtant à
la gorde robe

Cure

= La ligature est
le moyen employé =

Ligature

mais on ne peut
lier que ceux qui

s'oteint si la tumeur
c'est fort haut
rien de si difficile
que de la faire car
elle ne peut s'en tirer
et manifester l'espérance
il faut se servir
des instrumens le résultat
et par un seul
moyen — mais qd
elle sort, facilement
on la lie avec sû
reté, mais on retient le
fil

Observa-tion

Un notaire avait
pesanteur envie d'aller
sans avoir des excremens
termes une à la vessie
femme à la suite qui
faisait boire la pierre

tout cela augmenta
en allant à la selle il
s'en fit un jour qu'il avoit quelq
chose de sorti il
toucha une tumeur molle
anglaise qui un chiru
fut avarti, ce connut
un polype Roy
ayt e gillé ils laisse
ment que elle sortirait
du lit se pelleroit l
qu'ils en seroient la ligature
elle sortit de lui quinze
— un vint les avertir
ils la virent grosse com
le poingt comme
étrangée par l'anus
Roger la saisit
la tira d'autre
chirurgien avec un

qit lié a double
noeud — on coupa
au dessous = reduction
— 2 heures après des
selles sanglantes qui
se repeterent, 2 injections
d'oxicrat arreter cette
hemorrhagie. 2 jours
après chute de ligature
guerison —
il fut ensuite operé
de la taille il en
mourut — ils visiterent
[ils trouverent]
aussi le rectum
et trouverent une autre petite
tumeur ... mais
le rectum était cauteri-
sée = pour les hemor. elle
n'est que ...
et ... difficile
a arreter —

retrécissement du rectum — Du rétrécissement du Rectum

— il dépend de 2 causes

1ère cause — 1° vois des excroissances vénériennes à leur pourtour, conditionnées celles qui siègent tout à l'intérieur pr. leur nombre et volume y causent rendant l'excrétion des matières diffi-cile les excroissances

excroissances vénériennes — sans cumulées sa... et elles ne cèdent pas au traitement anti-vénérien aux mèches avec augment. vagis. elles font des progrès. Mais les uns peuvent vivre long-temps avec pourvu qu'ils portent les mèches =

2e Cause = l'engorg. (?) d'irreux des parois plus ou moins ... Epaissit ces parois les entrailles ... qu'il y avoit un pessaire avec une ouverture étroite =

Engorgement

d'irreux

= devient morte toujours tumeurs d'irreuse qui ne ... que peu à peu pour le séjour des matières dont la quantité diminue chaque jours = Mais le plus ... devient ... il sort des matières ... de tubes mais ... qui ... les ... C'est la rétention des matières fécales =

Etat tel

Ulcere

ils font que la voie
Progrès de les être proviso qu'il
Cancer exerçant le rectum la
dorvie le vagin
=
=
pour retirer les matières
par le vagin et fort
peine

traitement
traitement

= il est urgent pour
Du commencement
mença au sent en donne
les laxatifs
les graisses et en
surtout des mèches
= mais quand il a passé
tout cela est passé et alors
De l'état avancé
il est de mettre

des mèches qui dilatent
et favoriseroient la sortie
des matieres mais
cela n'est que pallia-
tif il est impossible
de guérir cette fistule
qui demanderoit l'abla-
tion laquelle ne peut
se faire — en
comme le poumon
fait des injections
on a soin de ne pas
abandonner le malade
pour ne pas le plonger
dans le desespoir =

Des hernies — Des tumeurs formées par le deplacement des parties molles

Les parties molles du corps notam les diverses cavités se deplacant et forment des tumeurs appellés hernies

définition — On les definit une tumeur formée par la sortie d'un viscère renfermés dans la cavité qui soulevant la peau et y ont une saillie

elles arrivent — on voit que cette maladie peut arriver aux trois cavités

à la tête — à la tête Les cerveaux

sortie et deposera le milieu de l'os du crane c'est la hernie du cerveau renvoyée à l'ordre anatomique

au thorax — les visceres renfermés dans la poitrine ne sortent pas de conformation ne forment pas des hernies car on ne peut donner le nom à la sortie accidentelle pour faire une plaie = renvoyé à l'ordre anatomique

à l'abdomen — les hernies arrivent particulierement à l'abdomen, on va examiner ces hernies generalement puis particulierement

aux muscles — mais avant il faut dire un mot d'une hernie qui peut arriver par la division des aponevroses aux muscles qu'elles servent à contenir

hernies des muscles — De la hernie des muscles
= les organes musculaires

Comment elles arrivent

sont enveloppées des gaines d'ex aponevroses de divers formes qui les retiennent en position et rapport — si les aponévroses se déchirent les muscles franchissent leur bornes se portent à travers, soulevent les tegumens et forment une tumeur ordinairement qu'on peut appeller hernie des muscles

— il a observé cette hernie sur un jeune étudiant en Medecine

Observation

qui recevant des coups de culbute avait une déchirure à la partie externe de la cuisse et entre le fascia lata ou il est plus épais à la partie antérieure externe superficielle de cuisse —

ouvert par un coup de + être
= il guérit aisément Mais comme
les aponév. ne se réunissent pas
il resta un intervalle
travers lequel passait le Muscle
vaste externe qui faisait
saillie dans l'extension de
la jambe = sitôt
que la jambe revenait en
flexion la tumeur disparaît
et a sa place on sentait
le déficit resultant de la
division du fascia lata
= elle était analogue
peut se remarquer aux
autres endroits –
= Du reste le jeune homme
n'éprouvait aucune gêne
aucune
douleur – seulement un
peu de difformité

= Mais on prétend que les muscles se déplacent autrement ... pouteau a gardé de la hernie des muscles, appuié sur des faits qui ne la prouvent pas
— il prétend que dans un mouvement un muscle peut sortir de sa lieu en rompant le tissu cellulaire environnant
il prétend que le s[?] plusieurs fois que quelques muscles de la partie antér de la jambe sont dans ce cas

— Mais quelque soit le mouv du muscle distinctement on conçoit son déplacement — ou il est relâché ou il est tendu qd l'effort a lieu
= il est dans le relachem ses fibres éprouvent un tiraillement

Et il des hernies de muscle par un effort

qui ne la ramènent [illegible]
leur lieu naturel
... il est [illegible] la
contraction il se relâchent [illegible]
ment Mais ne se déplace
pas.
— ce [illegible] ne paraît
pas possible à Frazer il
croit que pourtant a pris
pour les plaines l'effet du
tiraillement de quelques fibres
[illegible] qui rend l'action
des muscles impossible par la
douleur Pour la forme accidentelle
il [illegible] possible les [illegible] évolutions
[illegible] relâchement [illegible] viellas
et si [illegible] déplacement ils ne produiraient
ment aucun effet

Hernie — Des hernies de l'abdomen ou ventre

— tumeurs en un point quelconque de la surface abdominale formée par un viscère sorti de la cavité de l'abdomen.

Définition

= les hernies diffèrent entre elles à raison de l'endroit où elles arrivent et du lieu par où elles passent = du volume ou forme de la hernie = et enfin à raison des circonstances qui les font simples ou compliquées

Différences

1re différence du lieu

1° à raison des endroits de l'ouverture = = dans presque toutes les parties de la surface

les hernies peuvent arriver mais pas à la région pas hernie aux régions latéral inférieurement supérieurement mais aux partie latéral moyen — à la partie antérieur inférieure et = supérieure moyenne — les lieux sont les plus souvent affectés de hernie sont = la région inguinale = celle de l'anneau de l'ombilic = la ligne blanche = la partie supérieure de l'abdomen = les parties latéral moyen = région inférieure est de même la supérieure = à la région de deux aines, situé à travers les 2 piliers de l'anneau

Endroit où viennent les hernies

Lieux par où elles passent

a la région inguinale

cependant cette hernie ne se
fait pas toujours par l'anneau mais par
l'écartement des fibres du
pilier interne comme il sera
dit

celle du pli de
l'aine se fait derrière
au pli de l'aine.
l'arcade crurale c'est
à dire derrière les fibres
aponévrotiques du grand oblique
qui se portent de la crête de l'os
des iles à l'épine du pubis

les hernies à la région de
à l'ombilic l'ombilic ont lieu sortant
par l'anneau ombilical chez les
enfants

Mais chez les vieillards
viennent à région de l'ombilic
elles passent
non par l'anneau mais
par l'écartement des
fibres qui le forment

à la partie moyenne anter — celles à la partie moy. antérieure en traînant la ligne blanche
— celles qui viennent sur les côtés à travers les fibres uniment en une plicé à divise en laissé une le calame plus faible que le reste

sur les côtés

— Ces hernies à la partie inférieure passent tantôt par le trou ovalaire
— tantôt par l'échancrure ischiatique — & quelquefois par l'écartem. des fibres du releveur de l'anus

à la partie inférieure

dénominations

— aux parties des hernies à travers le vagin chez la femme (+ ...)
— chez l'homme à travers l'écartement des fibres du releveur
— Les hernies de la région

vrié du lieu
ombonocle &c.

de Pubis s'appellent bubonocèle quand ne contient pas une inguinale modérée — quand elles contient dans le v... et qu'elles y sont plus ou moins volumineuses on les appelle ... ou

Crurales
— Les hernies ... crurales

exomphales
— a l'ombilic ombilical exomphale

nom du viscère
— les autres hernies ... la ligne blanche ventrales ... du reste de l'étendue ... abdominale hernies ... celles de parties

ovalaires &c.
inférieures ovalaires ischiatiques périnéales

thoraciques
— les hernies passant par la partie supérieure ne ... pas au dehors mais ... la poitrine on les dit hernies thoraciques

2e différence
des Parties sorties
— Les hernies diffèrent relativement aux parties sorties
— presque tous les viscères de l'abdomen

Presque tous les viscères	peuvent quitter leur place et sortir = on a vu presque. Car on rien a pas vu par les reins par le pancréas, mais tous les autres vraient été vu sortant par des
exceptant	hernies naturel ou par des plaies, ou par une conformation monstrueuse
viscera forment le plus souvent hernie	= les plus communes sont formées par = l'intestin jejunum et ileum le piploon = la partie transverse du colon = a portion iliaque le cœcum = mais rarement le duodenum
intestin	a moins que l'estom. ne l'entraine = l'estomac
estomac	s'est trouvé hernies ombilicales

Mais la hernie scrotale est rare — la vessie a été vue par petit et une hernie ombilicale était très petite — le Foie se déplace rarement à cause par vice de conformation

Foie

Vessie

Matrice

Dénominations tirées du viscère

Sorte

la vessie urinaire peut former des hernies — la Matrice peut sortir par le vagin et par les hernies inguinales

— La hernie d'intestin entérocèle — celle d'épiploon épiplocèle — par l'intestin et l'épiploon entéro-épiplocèle — par les autres viscères le nom de la partie sortie — en parlant des espèces de hernie tirées du viscère

il est bon de dire
quel chose de l'epiploon est ce
Del'epiploon qui arrive au perti
dans les hernies toine
l'epiploon sort en
quantité quelquefois énorme
mais il faut distinguer
le volume de cette
quantité de celui sur-
venu par l'engorg. d'une
petite quantité d'epiploon
l'epiploon se dep-
sorti en gran lace tellement que toute
de quantité la masse est du bas ventre
dans la hernie il y a toujours
tiraillement de l'estomac des viscères
d'où resulte douleur
il a d'ét déjà la situation trouble des digestions
dit et le malade peut
périr faute de
digestion et succombe

fréquemment et de l'incomp-
tion — d'un autre côté
au obtenu des hernies épiploïques grosses comme

peu sortir mais très gonflé — | les deux n'atteignant qu'une petite portion d'épiploon passée s'est gonflée a acquis de l'embonpoint
peu de danger — | quoiqu'il en reste beaucoup dans l'abdomen
— l'intestin fait saillie
par l'ouverture qui lui livre
intestin dans la hernie | passage — il est pincé d'abord bientôt il s'engage davantage il y forme une anse il entraîne des
danger — | portions de mésentère qui y forment plusieurs circonvolutions;
— Mais les appendices
une seule appendice | intestinales naturel ou accidentelles forment des

hernies ils y a
peu de danger peu de danger de
leur étranglement
à l'égard des autres
viscères ils peuvent se
déplacer plus ou moins
parties vers ou dehors
parties au dedans

Péritoine et les hernies
Mais quelque soit le
degré et le mode de déplacement
les viscères en sortant poussent
au devant d'eux le
péritoine qui tapisse
en dedans l'ouverture
par laquelle ils sortent
le péritoine est donc
forme le sac herniaire
et forme ce qu'on appelle
sac herniaire
il a lieu presque
partout mais quand

presque dans toutes

les viscer sortent par une voie non reconnue, les genitaux sont de sac ainsi pas dans les hernies de vessie presque elles du caecum

le sac est proportionné à la hernie il rentre avec elle quand on est couché — à mesure que la hernie s'étend il s'étend aussi et quand la hernie est devenue très proéminente il s'éteint à sa pédicule

le sac est en proportion de la hernie

le sac forme une poche dont l'ouverture étroite repose au passage

a 2 faces.

Le sac présente 2 faces une externe l'autre interne

face interne libre

Cette dernière est lisse polie mouillée d'une sérosité qui entretient le glissement des intestins

adhérente

vaca a collets

Comment ils se forment

= tel est son état
ds les hernies récentes
mais q'd il y a eu
inflam. ou longue pression
le sac n'est plus lisse
et libre ; il est raboteux
épais ou adhérent
= quelquefois la hernie
est divisée en plusieurs
lobes ou retrecissements que
séparent des cloisons
on appelle cela des
sacs à collets
= Comment se forment
ils ces retrecissements ?
= d'abord le péritoine est
pincé par l'anneau
le lieu qu'il lui
présente est enflammé
épaissit et devient incapable

le sac dilaté en un autre sur le côté prolonge la hernie un nouveau rétrécissement se forme par la pression (ut supra) et ainsi de suite ils peuvent se multiplier — ordinairement il n'y en a qu'un et pour obtenir la réduction il faut fendre le sac qui a la forme d'une callebasse

Face externe du sac — lui permet réduction —

== La face exter du sac est unie aux parois par du tissu cellulaire En faisant la réduction le sac se réduit avec qd la hernie est récente

== Mais si la hernie est ancienne il a contracté des adhérences

Et ordinairem il ne peut plus rentrer — on avait cru jusqu'ici à la réductibilité du sac — Petit croit que réduit il peut encore de nouveau s'opposer à une nouvelle sortie

Le sac est-il toujours réductible?

Mais souvent le sac adhérent est irréductible — Louis a ensuite élevé un doute la réductibilité du sac il nie la vérité de l'observation de Le Dran — le Dran avait, après bien des moyens, réduit une hernie étranglée. Continuation des accidents — Mort. L'ouverture montra le collet du sac persistant

Le Dran la réduit

~~[illegible]~~ il continuant l'étranglement de l'intestin = Louis ne veut pas croire ce fait

il est donc réductible =

= mais plusieurs pièces présentées à l'académie de chirurgie ont prouvé que le sac herniaire est réductible mais cela est rare

mais rarement =

= le sac herniaire production du péritoine est d'abord mince mais il s'approprie les lames du tissu cellulaire etc

le sac ancien est souvent fort épais =

qd on opère une hernie étranglée anciennement on le trouve quelquefois épais qu'on désespérerait d'arriver à l'intestin, il est bon d'en être prévenu pour ne pas être découragé par cette multitude de lames =

Du 10 vendemiaire =

3e différences

= Les hernies diffèrent relativem[ent] a leur volume = à leur ancienneté = et a la figure de la tumeur

du volume

= par rapport au volume on conçoit qu'elles différ. depuis le plus petit degré de hernie naissante jusqu'au volume énorme des hernies ou descentes complettes qui arrivent aux hommes et surtout aux femmes par les parois du bas ventre dans la ligne blanche &c.

Di[fférences] de l'ancienneté

= on ne doit pas omettre les différ. resultant de l'ancienneté

plus anciennes plus grosses

= les recentes sont volumineuses mais la tumeur s'accroit et si non contenue elle acquiert un volume extraordinaire ainsi une hernie peu volumineuse est rarement ancienne = pas davantage la suite une = est une hernie volumineuse est rarement récente =

de l'ancienneté et de l'age — différences relatives à l'ancienneté de la maladie et l'age

de naissance — il en est qui arrive dès la naissance elles sont dites naturel et propres au sexe masculin —

accidentelles — il est des hernies qui arrivent dans un age plus ou moins avancé ordinairement elles sont incurables il faut s'assujetir à l'usage d'un brayer pour se mettre à couvert des accidents

Les différences — les hernies diffèr relativement a leur figure

de la figure — celles qui sortent par l'anneau suivant le cordon présentent une forme oblongue moins

inguinales oblongues et rondes — étendues dans le fond des bourses, elles augmentent, elles deviennent rondes inférieurement pendant que le haut est relevé

crurales obliques transversalement — les hernies crurales ont une forme oblique transversalement parce que c'est un triangle

que les fibres aponevrotiques resistent le moins

ombilicales rondes — Les hernies ombilicales présentent en general une forme ronde ou globuleuse et sont plus ou moins resserrées ou étranglées par une [illegible] qui les environne à leur base

égales raboteuses — toutes les hernies ont la surface égale qd elles ont précédemment intestin, et quelquefois inégales raboteuses qd elles sont = p. ex = épiploïques et volumineuses

6e différences tirées des circonstances — Les hernies diffèrent surtout par les circonstances d'être simples et compliquées

simples — Simples celles qui facilement rentrent et sont assez contenues par un bandage, n'occasionnent aucune incommodité qu'une gêne legere qd elles sont sorties

= Mais si la hernie rentre difficilement & donne plus de sensibilité (qu'il est supposé) & des corps étrangers y occasionnent

Compliquées — ou empêchent la réduction & inflamment les hernies compliquées

= D'où compliquées de douleur
= D'adhérence de volume extraord.
= De corps étrangers = d'étranglement de gangrène = & même compliquées d'autres maladies

Causes — Causes des hernies

= Elles sont distinguées en causes prédisposantes & causes efficientes
= Ces causes s'appellent encore les causes éloignées car elles existent long-temps avant = et les deux causes prochaines parce qu'elles précèdent l'apparition immédiatement et la déterminent —

Prédisposantes — les premières ont relatives à la disposition particulière

Prédisp. dépendant de Paroi

Des parois et des viscères — on ajoutent ... accident
= des dispositions naturelles ... parois disposant à la hernie sont les suivantes
= 1° les parois résistant partout également et uniformément ... ce qui ... contraction pousse en bas les viscères il ne se ferait jamais de hernie — le ventre pourrait être ... en dehors mais aucun point ne cédant, pas de sortie des viscères = il faut qu'il y ait un point moins résistant que le reste = or le défaut de résistance se trouve aux endroits où sont les ouvertures naturelles l'anneau inguinal, l'arcade crurale, l'ombilic, l'échancrure ischiatique, le trou ovalaire — en un mot tous les endroits par où passent les vaisseaux

Predisp. dependant des viscères

= de la part des viscères abdomin. c'est la r... peu large glissant en oblique ... ces viscères qui ... ...ement ou ... qui ... ...pres a s'eng... dans les ouvertures =

= d'autrefois c'est une dispositio à la hernie particulière

une particulière

= ainsi si la vessie restait toujours à sa place jamais elle ne sortirait par l'anneau inguinal ou l'arcade crurale — Mais quand dans un vieillard la vessie souvent distendue se dilate et reste flasque habituellement au dessus du pubis s'il vient une cause effi... ciente elle pourra s'eng... ager dans les Hernies de l'anneau

accidents ajoutant à la predisp.

= Les disposition naturelles parois peuvent être ... par un accident qui devient cause

du Paris

Perte d'eau
à ce point

[illegible] une [illegible].
graisse [illegible] ou entrement
[illegible] et la voila
[illegible] à la [illegible]
quelquefois de l'etat [illegible]
l'anneau inguinal, l'arcade crurale
[illegible] entouré de
graisse qui tamponne les
ouvertures
= la grandissime le corde ou
perd de son volume, il ne
[illegible] petit plus l'anneau
celui ci [illegible] plus
[illegible] arrière comme
en [illegible] cet
état un effort a lieu
facilement l'anneau livrera
passage aux viscères
= si donc un [illegible]
très gras vient a maigrir et
que l'anneau [illegible] du
vide de l'anneau
inguinal [illegible]

se présente à la toux, on juge prédisposition a hernie et il est prudent d'exercer une compression prophylactique qui tend a fermer l'anneau.

Contusion — Les contusions plus ou moins fortes aux parois, surtout aux lieux prédits, peuvent en affaiblissant les parties disposer à la hernie —

Exemple — Ainsi une femme venait a son mari a tomber un cercle, elle en reçut une contusion par la quelle sortirent par la dite lésion les viscères et même la matrice

Cicatrices — Les cicatrices resultant des plaies pénétrantes ou non pénétrantes mais divisant tous les muscles épais (les cicatrices restant minces) constituent encore une prédisposition aux hernies —

= Existe-t-il d'autres causes prédispos. des hernies

existe-t-il des causes prédisp. internes ?

1° Certains alimens affoiblissent-ils les ressort et disposent-ils aux hernies ? on l'a cru. Mais en examinant sans prévention on peut se convaincre du contraire =

chez les moines ?

= on a cru que les hernies étaient plus fréquentes aux moines qui se servirent d'huile au lieu de beurre. cela peut être vrai, mais n'y a-t-il pas d'autres (causes ?)

= leur embonpoint presque général, l'habitude d'être long tems à genoux, sont des causes suffisantes sans avoir recours aux alimens

chez les habitans des ports ?

= on a remarqué la même chose dans les ports de mer où le peuple mange beaucoup de poisson. mais ici il

attribue cette frequemment
hernies aux travaux de ces
person qui s'vivent s'occupe
à [illegible] fardeaux &c

Causes efficientes — Les causes efficientes sont toutes celles qui poussent avec violence les viscères abdominaux contre les parois qui les renferment en leur imprimant une sorte de secousse.

Les secousses — or la secousse a lieu quand on tombe de haut sur les talons la commotion se fait sentir violemment s'abdomen et pousse les viscères en avant

Exemple : un jeune homme ayant passé aux grandes remèdes chez Boyer il était couché un jour se leva violemment et subitement de dessus son lit et sortit une

hernie ancienne qui s'étrangla aussitot

— Mais la cause efficiente la plus commune des hernies c'est l'effort resultant de la contraction simultanée des muscles qui entourent les viscères abdominaux cet effort a lieu quand on leve un fardeau quand on va à la garde robe avec effort et dans les accouchemens [...] le vomissement et en fin toutes les fois que le diaphragme et les muscles abdominaux se contractent simultanément — les viscères pressés de toute part s'ils trouvent un point plus faible s'y portent à resistance et s'echappent au dehors

De l'effort

la hernie raement subite

Mais quelque soit la cause rarement la hernie vient subitement mais que on ne voit une ancienne hernie reduite dont le sac est rotté dans l'anneau et alors elle peut sortir à l'instant et même s'étrang[ler] sur le champ

— le plus souvent les hernies sortent lentement et quand le sujet s'en apperçoit souvent il y en a beaucoup de hors

traité le plus souvent

— quand donc une personne se plaint de gêne de douleurs vers l'anneau inguinal, une petite tumeur reductible qui augmenté par l'expiration quand on tousse, vent, commotion à la toux on reconnoit hernie

attention aux hernies commençantes

commencante alors il est bon d'user d'un traitem[ent] prophylactiq c'est le bandag[e]

Signes — Signes des hernies en général

— tumeur ds un point du bas ventre ou l'abdomen

tumeur a une ouverture — a ?prend qu'il existe des ouvertures naturel ainsi c one voit tumeur ds l'anneau ingui[nal], arcade crurale, l'ombilic on peut deja présumer

— la tumeur herniaire est molle, sans fluctuation et on voit qu'elle est

son état — faite de parties élevées indolente la couleur peau non changée par elle chaleur, la tumeur dispa[rait] à la pression et replacée disparait ds le lit

le malade sur le dos, et reparait en se levant si l'on fait tousser la tumeur étant sortie elle peut être réduite au la s'efforce faire jusqu'à son pouvoir

Tels sont les signes ils peuvent être équivoques dans les hernies inguinales et crurales mais rationnellement ils sont exacts en parlant de ces deux hernies on éclaircira cette obscurité ainsi les signes en général sont

tumeur à une ouverture sans changement à la peau sans douleur sans malaise tumeur molle cédant à la pression par le séjour au lit reparaissant levé se tendant

Ces signes sont quelquefois équivoques

résumé des signes

qd on fait un et sort quand elle est sortie toussé en faisant effort pour sortir, elle est rentrée qd on fait cette dernière expérience =

Pronostic — = Pronostic des hernies en général

= Une désagréable incommodité assujettissante à un usage continuel du bandage qui gêne toujours jusqu'à ce qu'on en ait contracté l'habitude mais rendu à ce point et dans l'usage d'un bon bandage on peut ainsi poursuivre sa carrière à l'abri des accidents &c.

Dans les adultes

= Mais dans les sujets vieux elle est inquiétante car souvent le bandage la ... Cependant on en

Dans les vieillards

a vu guerir qui étaient plus adultes
Dans les enfans ― Dans les enfans elle est

Dans les enfans ― souvent susceptible de guérison par un bandage bien fait et d'ailleurs rarement elle s'étrangle et si elle s'étrangle les accidens qui paroissent ordinairement sont tels qu'il ont besoin d'opération =

Des hernies compliquées ― Les hernies qui se compliquent deviennent plus ou moins dangereuses = on le verra plus bas

Cure générale des hernies =

Indications ― Les réduire et maintenir la réduction au moyen d'un bandage bien fait = on

Cure palliative ― appelle cette cure palliative parce que la hernie revient = moins de cette fin des moyens curatifs

radicaux —

Du 17 vendemiaire

= si Bridge ne peut empêcher la sortie ou être intermittent et radicale la pourroit s'il peut la contenir, est être palliatif, qui quelquefois est devenue radicale

Cure Palliative des hernies

De la Cure Palliative

= reduction — pour reduire donnez une position en general qui relache les muscles de l'abdomen

reduction

— on dit, en general, pour ce qu'il y a des sujets qui reduisent leur hernie en toute posture = or la position ou les muscles reçoivent est la suivante

= couche sur le dos la tête élevée sur la poitrine, ou levée par un oreiller = on élève le bassin par un autre coussin

situation

le côté de la hernie un peu plus élevé, les cuisses un peu fléchies et les jambes fléchies = jambes à angle

droit jusqu'a ouage bouy
= ala homme le plus grand maisfaut
recâ ben. pombet — pour qu'il
persiste il faut éviter que le
Duide le soulève la tête pour
voir ce qui se fait à sa
tumeur car alors il
= Le lieu ainsi placé — c'est
l'opérateur qui doit pratiquer
le taxis il opérait de la manière
suivante il place le bord
cubital de la main correspondante
à la tête immédiatement au dessus
de la tumeur et en haut
cette main sur la partie supérieure
de la tumeur il forme une
gouttière qui bien brasse — de la
main du pied, les doigts
rapprochés, il s'agit à
présume en les rotiant les doigts
de serre qu'une portion
tel le tumeur ne s'glisse
dans leurs intervalles =
= aiguille bien de bas
en haut et pénétrer une

Procédé

Direction en
poussant =

Selon direction de l'ouverture

échancrure à réduire
— — inguinale direction
pour l'anneau oblig. de bas en haut et
de dedans en dehors ou ouvre
à la direct. de l'anneau
inguinal, et du cordon
— — hernie crurale
Pour l'arcade direction de dehors en dedans
— verticale perpendiculaire à sa face
pour l'ombilic de l'ouverture
— — la hernie est intestinale
il commence à rentrer
avec un gargouillement et suit
ensuite les doigts de l'ouverture p. [illegible]
ou toute le doigt — mais quand
elle est épiploïque il faut toujours
[illegible] la pression car
c'est le seul moyen de
réduire
— — [illegible] cependant par le [illegible]
Si pas réduction cas où ne pouvait réussir
— un conseil du procédé
procédé du auquel le [illegible] est [illegible]
malade souvent le malade réduit lui
même des hernies que le chirurgien
n'a pu faire rentrer
— La hernie réduite, on emploie
une compression [illegible]

maintenue la hernie reduite =

pica

inconvenient

oir au lit

pour résister a l'effort qui tend a la faire ressortir. les moyens qu'on a employés = anciennement on se servait du pica de Haine pour contenir la hernie inguinale aujourd'hui on n'use que des bayer = le pica les inconvénients suivants = le bassin étant exposé d'avant en arrière ayant plus de largeur d'un côté à l'autre le pica comprime davantage sur le point où il devrait comprimer le moins — en vain placerait on des corps presseurs au lieu de la compression se ferait toujours trop en dehors = ainsi préférence le bandage élastique mais si on ne peut avoir le pica et faire rester au lit il y a fait pour les effets de la hernie

pour s'élever | mais qu'il faut relever
insultant =

le Brayer — == 1° le Brayer a deux
parties bien distinctes qui méritent
l'attention des fabricateurs la plote et la
ceinture =

== la plotte est une plaque
de cor [illegible] oblongue [illegible]
[illegible] = oblongue [illegible]

la Plote — l'arcade crurale = proportionnée à
la grandeur et à l'ancienneté des hernies
== on garnit cette plaque
de linge, de crin, ou
[illegible] et l'on fait une
plotte plus ou moins [illegible]
[illegible] contenir la
hernie =

== la ceinture est un [illegible]
qui retient depuis l'anneau jusqu'à l'[illegible]
du côté postérieurement =
la Ceinture — large d'un bon travers
de doigt, a force relative
à la pression à exercer ainsi
plus forte dans ceux qui
font des exercices violents
le ressort sera tellement
contourné qu'il s'applique

Sur tous les points de la cir
conférence = l'essentiel est,
que la partie du ressort
voisine de la pelotte ait
une direction qui la porte,
l'applique immédiatement
sans quoi [illegible] le bandage
il glisse en bas comprime
le cordon et cause douleur — [illegible]
[illegible] supérieurement [illegible]
[illegible] peut passer [illegible] — le ressort
est couvert d'abord toile puis
de peau de chamois, peut être
couvert de laine
ensuite [illegible] sert attaché une
lisière qui le termine et va
s'engager dans une boucle
attachée à la pelotte — une lanière
part de l'autre côté de la pelotte passe entre
les cuisses et va s'[illegible] en avant ++
= pour les faire tenir =

++ à un crochet
qui est sur la pelotte

= prendre la grosseur du corps au
lieu [illegible] = lorsque la hernie
inguinale ou crurale tirée
volumineuse ou petite ? i
difficile à contenir ou aisée
— si l'ouverture est très dilatée
ou peu [illegible] ou [illegible]

Pour le faire
faire

Si l'individu est gras, on designe l'obliquité de la partie inferieure de l'abdomen si c'est la quantième ... après cela les ouvriers Construisent

Mais le bandage ne doit pas le changer, et que s'il vient à s'è ... passer ... il faut ... un autre

Manière de l'appliquer.

Situation comme pour le taxis

Application du Brayer.

la hernie réduite le doigt d'un aide sur l'ouverture, — on passe en arrière la ceinture on deploie le ressort on applique la pelotte en tant que la peau ne ... les plis. on maintient la pelotte de peur qu'elle ne ... tout qu'on serre, le ... serré on fait lever le ... on lui fait executer les differens mouvements ... tousser s'accroupir se courber ... on voit

[illegible] rien [illegible] étrange et
[illegible] la hernie [illegible] ne glisse pas et
— [illegible] la person [illegible]
Reussite du bandage — Cuisse. | Quoyque et les os y glisse facilement il [illegible] autrement [illegible] aux cuisse
— il est des personnes a peau delicate qui [illegible] ailleurs il faut un [illegible] fort bon — [illegible] garnit a [illegible] du [illegible] recouvre d'une peau de lievre ou de lapin
Bandage Oeuillet | — le [illegible] appliqué [illegible] ne doit sous aucun pretexte le quitter a moins que le [illegible] ne soit gâté ou cassé [illegible]
Le Bandage ne doit pas se lever | [illegible] ôté la nuit [illegible] remuant, faisant un effort [illegible] la [illegible] la hernie [illegible] et [illegible] étrangler et [illegible] troublée — comme la vu Brogie
Il guérit les jeunes sujets | — le Bandage guérit radicalement les enfans et les jeunes sujets — il seroit difficile de dire jusqu'a quel age

on a vu par l'usage du brayer porté un an 15 mois, la guérison des jeunes gens de 14-15 ans et même davantage — Mais on ne peut assujettir les enfans à un usage continuel du brayer à moins qu'ils n'aient au moins passé deux ans &c. Car ils les salissent trop, mais à 3 ans on leur fait faire de petits bandages élastiques, qu'ils portent un, deux trois ans, et ils guérissent radicalement — dans les adultes rarement le bandage guérit radicalement — cependant Paré en cite un exemple — un curé de St Maur des [illegible] avait une hernie qui le gênait beaucoup au chœur à chanter — Paré conseilla brayer il fut porté plusieurs années, guérison, mort de la [illegible], Paré l'ayant ouvert trouva [illegible]

a guéri à 15 ans

il ne s'applique aux enfans que &c.

il a guéri des adultes

exemple

[illegible] distance de la grosseur d'un
œuf qui bouchait l'anneau
[illegible] dont [illegible] était
[illegible] ou une portion d'[illegible]
[illegible] qui avait [illegible] à ce
lieu

— que le bandage guérisse
soit en appliquant les [illegible] [illegible]
faisant [illegible] [illegible] en [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] l'anneau
— il est toujours certain que
[illegible] les enfans les adolescens
et même dans des hommes de
[illegible] ans on [illegible] quelques
[illegible] guérir radicalement

— Mais si le bandage ne
avantages du bandage — guérit pas radicalement du moins
[illegible] il a [illegible] [illegible]
[illegible] un bandage [illegible]
[illegible] bien appliqué permet
de [illegible] toutes les
occupations ordinaires
de la vie

Précaution pour ceux qui font un effort

Cure radicale des hernies

Moyens proposés

— Mais qd on est obligé de faire un effort violent comme pour rendre les excremens avec l'effort, il faut prudent de mettre la main sur la plaie

Cure radicale,

— comme le bandage est gênant on a cherché des moyens de guérir radicalement

— tantot, ce donne soi, des chirurg ont vanté des remedes qu'ils croyaient efficaces

— Mais le plus souvent des charlatans ont vanté des remedes qu'ils n'avaient bien eu pas devoir guérir radicalement aujourd'hui !!

— or on a proposé les remedes internes et externes l'application des caustiques sur la tumeur et d'autres moyens, tantot sévères tantot peu bénins - enfin des opérations

Emplâtre contra Rupturam

Remède du Prieur de Cabrières

Peau d'anguille

Folle fleur de tan

= Parmi les moyens préconisés anciennement et connus au remarque
1° un platre contre les ruptures
On l'envoyait à celle du Roi
= il est composé de [illegible] ... il ne peut avoir aucun effet sur l'anneau
= Un certain Prieur de Cabrières vendit un secret au gouvernement il consistait à [illegible] le [illegible] de l'eau et appliquer un emplâtre au Prieur mais on [illegible] par le moyen que les hernies [illegible] guéris aussi par le bandage
= On a aussi employé la peau d'anguille imprégnée d'alun et par [illegible] on applique le bandage = Ce moyen [illegible] [illegible] ont [illegible] efficace [illegible] extérieur s'il y a de l'effet il est dû au Bandage
= Un moyen [illegible] vanté mais apprécié aujourd'hui c'est la folle

Manière de s'en servir

Comment agit-elle ?

bleue de tou — on en a
long tems fait un secret
le gouvernement en a récompensé
l'inventeur — on se servait
d'un achet de toile rempli
de colle bleue de tou trempé
ds du gros vin & s'appliquait
sur la tumeur par l'effort
mettre le bandage —
= on assure que le topique
est efficace — mais on sait
que l'effet de la colle
bleue de tou est d'enfurcir
un peu la peau
de la partie même parfois
où la peau n'entre point
ds la hernie il convient
qu'elle peut repousser l'intestin
& rétrécir l'anneau —
on y a renoncé en considérant
qu'elle n'agit que par
la pression du bandage
laquelle on s'en borne —
aujourd'hui
= Les moyens n'ont pas
bien assez malades, in

Moyens cura-
tif. des hernies
plus Dangereux

ont seulement servi a leur escroquer
le l'argent
Mais on a proposé
des moyens Dangereux des
operations qui peuvent causer
des accidents plus ou moins facheux
= Ces moyens sont le
Cautère potentiel et actuel = la
ligature du sac = la castration à
suture royale et le point
doré proposés pour la guérison
soit des hernies inguin-
ales soit des hernies
crurales = du 18 vendemiaire =

Moyen
de Broquard

= il est un Moyen actuellement
en usage pour la cure radicale des
hernies - il est un proposé par un chirur-
gien nommé Broquard le voici
= il applique sur les tumeurs
un topiq (c'est son secret)
ce topique est irritant il place
ensuitte un bandage bien serré et
envoie le malade promener au bois
de Boulogne jusqu'à ce que douleur
le force de revenir = il
survient ainsi une inflammation

peut-être borné à la propag
bien se communiquant au
sac et a l'intestin de la cause salue
Cela
fait, il fait porter un
bandage ordinaire pendant un mois
puis dit la guérison radicale
exceptée
au bout d'un mais la hernie
ne parait pas la guérison
même se soutient un mois
il ne guérit pas — 2 mois et presque toujours
ds les adultes la hernie reste
dites et il n'a trouvé qu'une
guérison le 3 a 4 mois qui
cependant le sac besoin d'une
plaie à l'anneau mais bientôt
cela se relâche et la hernie
revient comme si l'on n'eut rien
fait

= Du Caustique Et de la
Cauterisation pour hernie inguinale
et crurale =

Du caustique — Le caustique a été appliqué
ou par un morceau de pierre
à cautère sur la peau

ou après avoir découvert le
sac de les Cautérise avec un
caustique liquide d'où inflam
cicatrice qui rétrécit momentanément
l'anneau mais enfin la dilatation
se reproduit = cet ancien moyen
était tombé en désuétude mais depuis
peu on l'a fait revivre un
chirurgien se servit de l'acide
sulfurique sur le sac à découvert
ce caustiq a produit des accidens
inflam violens d'autrefois pas
d'accidents mais toujours la récid a réussi
= il est bien reconnu à

Dangereux
insuffisant

présent qu'ils sont non seulem
dangereux ds leur usage mais
encore qu'ils ne peuvent jamais
guérir sans retour =

Du Cautère
actuel

Cautère actuel les anciens
brûlaient par ce moyen et la
peau et le sac herniaire
pour produire en ce lieu
une cicatrice ferme et solide
propre à s'opposer ce distance
aux viscères


mais la contr[ation] insuffisante pour
[au]guérir [ou] les hernies a encore
dangereux & bien des cas l'inconvenient
insuffisant de [illegible] cordon spermatique
et rendre inutile le testicule
de le côté qui s'avait tombé
en atrophie

Operation pour la cure radicale Des Operations usitées
pour la guerison radicale
= des hernies =
= sont la castration, point
doré = Et la suture royale

= La castration

Castration Consiste à emporter le sac herniaire et avec lui le testicule puis
on obtient une cicatrice à l'an[neau]
= Cette operation a été jadis prati[quée]
pour guérir les hernies congéniales
des enfans = la rendre inconv[enient]
de ce moyen est son insuff[isance]

insuffisant l'experience a appris que la hernie
récidive au bout d'un terme
plus ou moins long — on a
vu des adultes porter des
hernies pour la guérison desquelles



75

ils avaient qu'à leur enfoncer
poidu leur testicule = ainsi
cette opération qui prive d'un
organe un certain est essentiellement
a rejetter et les charlatans ont
été contre plusieurs imposteurs
qui parcourent les provinces en la pratiquant

Point doré

= Le Point doré

passer un fil d'argent, ou d'or
le chambon lin au moyen
d'une aiguille autours du sac her-
niaire en serrant assez pour
couper le sac par le fil
et procurer une cicatrice qui
bouche l'anneau = ce point doré coupe
aussi le cordon car il
est colé au sac.

Suture Royale

= la Suture Royale

= Fendre le sac herniaire et le
coudre par une suture à
Pelletier = cette suture produit
inflammation adhérence des parois
du sac et l'on regarde
cette guerison comme radicale

tous ces moyens sont infructueux

= Mais la guérison de tous ces moyens n'est que précaire pour 2 ou 3 mois, et après ce tems si l'anneau est toujours faible on voit le péritoine céder de nouveau et la hernie se rétablir etc

---

réflexion qui le prouve

= Cette réflexion prouve qu'aucun d'eux ne peut réussir =

= pourquoi une hernie se forme t'elle? c'est que l'anneau ou l'arcade plus larges ou ayant ses piliers plus faibles qu'à l'ordinaire les viscères peuvent y passer lorsqu'ils sont poussés, le péritoine ne pouvant seul soutenir les efforts

– or tout ce qui ne rétrécit pas l'anneau ou ne fortifie pas ses piliers ne peut empêcher que son ouverture bouchée par le seul péritoine ne cède plutot ou plus tard c'est ce que prouve la récidive =

un Procédé de Desault — On a recommandé dans le temps de Desault un procédé opératoire que le célèbre praticien adopta pour la hernie ombilicale

= L'ombilic résiste mal

Pour la hernie ombilicale — l'anneau étant recouvert d'une peau mince = en cong^e souvent hernie s'y fait — voici comment Desault y remédiait = L'intestin réduit Desault passait ligature à poche a[illegible] à la base cette ligature causait la perte et une cicatrice solide s'opposait à la sortie ultérieure

= Mais Boyer a long temps montré à l'hopital de la

il ne guérit pas — charité une hernie ombilicale guérie par ce moyen qui devait récidiver quoiqu'elle fût un peu moindre —

= il en est de ceci (ut supra) ce moyen ne rétrécit pas essentiellement l'anneau ombilical

= il resulte de ce qu'on a dit=
que [illegible] les bandages et [illegible] extra-
ne peuvent procurer la guérison radicale
d'une hernie on peut la
reputer incurable et alors
la cauterisation et les autres
moyens douloureux ne procurent
que des guérisons de 2-3-5-
mois il ne faut pas y
soumettre les malades qui
n'en retirent que très peu
de fruit !

resumé sur les cures radicales

= il a vu bien un
jeune homme du Midi qui
portait une hernie et un bandage
il demandait avec instance
une operation qui le guerit
aimant mieux mourir dit
il que d'être gené con-
tinuellement par le bandage.
= Boyer, fit tout en
lui exposant les avantages

observation

du Bdge qu'il a consenti
a ... [illegible] ... mettre il l'a
porté deux mois, mais voulant voir s'il
était guéri il l'a quitté et sa hernie
après quelques jours a reparu = [illegible]
il a renouvellé ses instances pour être
opéré. Bazan lui a fait une peinture bien
vive des dangers des operations et l'a
engagé a reprendre le Bdge l'assurant
que s'il a la patience de le porter une
ou deux années il guerira radicalement
il ne s'e... qu'avec peine

Hernies compliquées

Des hernies compliquées
= en général =

Les hernies peuvent être compli
de douleurs - de volume extra
ordinaire qui empeche la rentrée - d'adherence
des parties qui forment la tumeur -

Complications = de corps etrangers retenus
... la hernie — d'etranglem
et enfin de gangrene
elle peut en outre être
compliquée d'autres indices
que l'on ne traitera point ici
renvoyant aux articles qui
leur appartiennent =

Complication de douleurs

Douleur de cause externe

= la douleur —
peut être produite de diverses
causes — être plus ou
moins vive selon sa
cause et exiger des moyens
analogues à cette cause =
— parfois elle est exter-
ieure à [illegible] ou [illegible]
la peau qui s'excorie
par les frictions d'une
tumeur volumineuse qui l'échauffe
l'irrite et l'exfolie — il
— examiner dans ce cas et son
la rougeur a se garantir
recourt aux moyens de la chaleur
et de prevenir l'excoriation = le
moyen le plus efficace
est la poudre de bois
pourri vermoulu que
l'on emploie pour les
excoriations des aines des
enfants = on met une

suspensoir et si i vue... tion
Cerat de i a turne pour garnir

de Cause interne — Mais le plus souvent Douleur vient de l'inferme de la tumeur — Et si la hernie est intestinale

pour l'intestin — le sont des Coliques habituelles a ceux qui portent d'ancie hernies volumineuses. Leur Redoublées

Coliques — Ces douleurs les rendent tristes moroses. on leur a donné le nom de hargneux a ceux qui ont un semblable caractere par ce que les anciens appellaient les hernies hergues — on y remedie en contenant

Leur remede — Cette hernie-la du dite (cit. supra) et si irréductible en contenant par un suspensoir bien fait et par un regime qui donne peu de matiere fecales et tient libre le ventre

Pour l'epiploon — Dans les hernies Epiploiques les douleurs Dependent du tiraillement de l'Epiploon

tiraillement d'Estomac

remèdes

réduction

cas incurable

o bondamment cela la
les malades se portent les
douleurs à l'Estomac et des
les hernies intestinales les
rapportent à cause
différence très digne
d'attention ailleurs
ont moins de coliques
qu'un sentiment de mal
aise de tiraille fatigue
vers la region epigastrique
= on fait cesser cela
en reduisant mais si
le piplon abondant, volumineux
adhérent est irreductible et
l'Estomac forcé tiraillé
et deplacé, on ne
peut plus rien et le
peut par les
douleurs les mauvaises
digestions ne
vient être bien
au ...

= on en a trouvé plusieurs exemples

Complication de volume = les hernies peuvent être compliquées de volume extraordinaire = peu à peu l'intestin se déplace peuvent se porter en quantité énorme dans la hernie qui acquiert un volume très considérable on en voit qui descendent jusqu'à moitié des cuisses et plus = il a vu depuis peu un ancien chirurgien qui porte une depuis 30 ans extrêmement volumineuse qui descend presque au bas de la cuisse

observation il fut demandé avec hâte pour remédier à un engorgement qui s'y était fait ils le dissipèrent par des Sep... dans l'eau pris dessous en dessous par vessies =

Quand ces hernies ont portées à point tant que la réduction n'a pas été

Les rhumatismes et anciennes irréductibles

faite depuis 8 à 10 ans
elle est impossible.
non que l'anneau ne
permette pas la réduction, il la
permettrait car il est très
large mais les parois
abdominales sont revenues sur
elles mêmes, les autres
intestins sont prolongés de
manière à remplir le
vide = les tissus y en
de sorte que l'on
ne pourrait faire rejourner
les viscères de cette cavité
ils y ont été poussés. ils
y ont [illegible]. cela
est impraticable mais
si cela ne se peut
[illegible]ment, on a
des exemples de la
rentrée de hernies sorties
depuis 10 et 15 ans
obtenue avec le tems =
= par les moyens suivants

moyens qui les ont cependant reduites

= 1° le sujet toujours au lit dans une situation favorable 2° = astreint à un regime propre à l'amaigrir & diminuer le volume surtout de l'epiploon et du mesentère et pendant que cela se fait on presse tous les jours la tumeur vers l'ouverture par un bandage convenable et en 2 ou 3 mois on a vu réussir ce moyen = on s'est bien trouvé des purgatifs fondans = des emplâtres de Vigo cum Mercurio pour résoudre l'épiploon trop volumineux

= Mais si toutes les tentatives ne peuvent réussir il faut que le sujet s'assujettisse à un bandage bien fait ou suspensoire ...

ou plutôt une pelotte concave

Complication d'adhérences = Les adhérences peuvent aussi compliquer les hernies = C'est à dire adhésion des parties de la hernie soit entre elles soit avec le sac soit celui-ci avec l'anneau

Leur cause = elles résultent des inflam. de divers degrés qui ont eu lieu en raison de la pression

Leurs différences = elles diffèrent par leur étendue, leur degré = tantot l'intestin adhère au fond du sac tantôt l'intestin et l'épiploon adhèrent à la circonférence du sac au lieu où il est brassé par l'anneau ce qui rend la réduction

de lieu = im possible = quelquefois les circonvolut. d'intestin adhèrent entre-elles.

(contrefois (des ici congé-
nitale) elles adher avec le
testicule

Les hernies peuvent
être légères et sublimatibles
en passant le doigt entre
les parties herniaires
comme les hernies récentes.

D'autrefois, et à volonté, les
hernies anciennes, il y a de
ces hernies intimes
que pour les coler il devrait
(?) causer l'une ou l'autre
des parties viennes =

de degré

Mais on ne peut juger
des hernies qu'après
l'ouverture du sac
on ne peut que les pré-
sumer, par la cavité
en son lieu et avec bruit de la
hernie et

Les hernies peuvent
être compliquées
de corps étrangers

quand les connait-on?

—

Complication de corps étrangers

= Cette [illegible] dans les hernies intestinales ou à l'anneau, ou l'intestin forme une anse que les matières fécales peuvent s'arrêter = cet effet de l'arrêt suivant la forme et la nature

différences des corps | des corps arrêtés = quand par leur forme et leur nature ils n'irritent pas l'intestin

non irritans ils engorgent | ils ne font que le remplir et l'engorger ils s'étranglent par engorgement (comme des noyaux de cerise etc = Mais quand les corps sont de nature à irriter, une arrête de poisson, une épingle etc bientôt

irritans ils enflamment | ils irritent les intestins et produisent une inflammation gangreneuse qui tue

= les circonstances comme

Signes: | [illegible], la [illegible]

remède — les accidents qui [illegible] font présumer &c. — [illegible] accidents exigent [illegible] ou [illegible] faite [illegible] [illegible] des [illegible] étrangers

Complication d'étranglement — du 19 vendémiaire

Complication d'étranglement des hernies —

— c'est la plus fréquente de toutes [illegible] [illegible] [illegible]

définition — [illegible] [illegible] des parties formant hernie avec impossibilité de réduction et accidents résultant et de la constriction et de l'impossibilité de réduction

quelles sont les hernies étranglées? — la seule impossibilité de réduire ne constitue pas l'étranglement ainsi des anciennes hernies irréductibles ne sont pas étranglées [illegible] il [illegible] des accidents il y a étranglement

Deux étrangle-
ments

= on distingue 2 espèces
d'étranglement relatives à la forme
et aux symptômes
— le 1er dit par inflammation
[illegible] dessous [illegible] nom
d'étranglement avec inflammation
— Le 2e étrangl. par engouement

1° étranglement
avec inflamma-
tion

= De l'étranglement avec
inflammation =
= il est ordinaire aux hernies
récentes peu volumineuses contenant
pendant quelque temps
l'intestin se renversant tout d'un

a quelles hernies

coup par le défaut
de l'organe à l'occasion d'un effort
= ainsi qu'une
hernie récente réduite, s'est
renouvelée tout d'un coup
on a déjà présomption
d'étranglement
= mais ces malades
d'ont été quand hernie

Comment se fait-il?

qui sert pas être lu qui est sous douleur ... a pres ... artie ... étreinte et ... avec inflammation ou plutôt ... quelle est la cause ... étranglement avec inflammation

= bien des personnes ... que l'anneau ...

Mauvaise explication

... qui étrangle ... et ... inflammation mais les anneaux et l'arcade crurale étant ... et les aponévroses ... contractile ... ce ... on ne peut concevoir cette contraction

= voila véritable cause de l'étranglement

Bonne explication

= il est toujours précédé ... par un effort violent ... matières ... la ... par un ... qui produit ... général

= dans tous les cas ?

L'intestin y est tout à coup

Sortie de l'intestin — ou il y engage de l'...
il en sort d'avantage
cette sortie lorsque l'anneau
est forcé de se dilater
pour livrer passage, ensuite
il revient sur lui même
et lorsqu'une douleur s'est
intestine d'où il resulte
bientot une inflammation
= Voici comment
== La pression sur l'intestin

Constriction et irritation — produit l'irritation qui attire
les humeurs = celle de la
circulation veineuse plus facile
a interrompu que l'arterielle
= interruption du cours des matières coulant
dans le canal il y a tout
inflammation et bientot lorsque

interruption des matières — les ... prolongés de circulation
et de la continuité du

inflammation — canal et de la retention
des matières se manifestent

Signes — = les signes d'étranglement
avec inflammation =
= la tumeur est ordinairement

Symptomes Croissans

Douleur plus [illegible] moins vive en raison
l'intensité de la pression & l'douleur
augmentant au toucher = la douleur
se propage dans le canal, [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] = [illegible]
[illegible] bientot [illegible] le vomisse-
ment de matières [illegible] qui
[illegible] prennent un caractère
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
non que [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ce qui [illegible]
[illegible] les [illegible] ou [illegible]
[illegible] l'irritation & [illegible] du
canal [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

= Les [illegible] [illegible] [illegible] aussi
et [illegible] violentes [illegible] qui
[illegible] l'irritation [illegible] bientot [illegible]

Leur Durée

tous ces symptomes [illegible]
[illegible] par [illegible] = [illegible]
durent 3, 6 = ou 24 heures [illegible]
violence des [illegible] qui [illegible]
[illegible] [illegible] de la quantité des matières
[illegible] de la quantité d'intestin
étranglé [illegible] [illegible] [illegible]

leur cessation | des douleurs et des accidents
calme trompeur qui inspire
une fausse sécurité et une juste
espérance pour gens sans expérience
Les symptômes de la gangrène
suivent bientôt ce faux calme
visage décomposé jaune
vomissements de matières fraîches
hoquet, syncopes et
mort =

gangrene

= Progrès d'un étranglement avec inflammation
= une hernie récente qui est volumineuse
réduite ou renouvellée
= douleur vive à la sortie
qui est prolongée

Progrès de ces symptômes réunies

Ventre tendu, chaleur et vomissements
répétés = vomiss fréquent
et au grands efforts pendant
peu de matières bilieuses
alimentaires ensuite de caract fécal
= le hoquet s'y ajoute = progrès
des symptômes et il vaut mieux
leur intensité =

traitement

taxis

— en fin symptomes diminuent mais les accidents longtemps et ont lieu — cependant douleurs durent — pouls petit misérable visage decomposé — &c.

— Voir le symptom. — primit. ...

Médication curative de la complication d'étranglement avec inflammation

— le but est de faire rentrer la hernie le plus promptement possible pour faire disparaître les accidents mais quels moyens

— appellé auprès d'un malade il a vu on doit tenter la réduction par le taxis ...

(réduction) taxis

saignée

- ne pas renvoyer la . jusque
on n'a pas de ... le jui...
par ... = cette ...
emollient ... =
emollient ... les boissons ... doivent être ... l'estomac
est ... il faut le
... l'estomac est trop irritable

par boissons les boissons produisent le vo
missement = on trouve
là ... par des tranches de
citron ... dans
la bouche avec une ... ou ...
= Le cataplas doit être
réitération des ... heures
moyens ... à
réduction = ... le
... dans un bain ...
= ... pas de réussite on
insiste sur ces cataplas et le bain
ou revient ... aux
bains tentatives de réduction avec
la circonspection qu'exige
la sensibilité de la tumeur

lavements = Des lavements pour

de varas les gros intestins ont u... passé

Malgré cela passée réussite, il ne reste d'autre

L'operation ressource que l'operation qui n'est praticque pour agrandir l'ouverture et faciliter la réduction

a quelle epoque? Mais il n'y a pas d'epoque fixe pour l'operation c'est fixée par les accidens c'est a la sagacité du chirurgien faire l'instant

tout ce qu'on peut dire c'est que cette operation n'etant pas dangers par elle même.

Son importance Et l'instant qui l'exige etant beaucoup il importe de la pratiquer de bonne heure ... il perit tant de malades a peine de hernies c'est qu'on a recours trop tard et après des tentatives qui ont ... la tumeur et irrité la gangrene

... les plus heureux de cette operation sont ceux qui se determinent

de [illegible] heure avant le [illegible]
ou 30 heures [illegible] peuvent
[illegible] ces [illegible] patient [illegible]
[illegible] et [illegible] le
troisième quinzième
= [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] promptement [illegible] l'opera
tion que quelquefois on opera
un [illegible] dont la hernie
était réductible par le [illegible]
mais cette operation [illegible]
[illegible] [illegible] la [illegible]
[illegible] qui en diffèrent
longtemps l'operation on verra
périr la plupart des [illegible]
tion qu'elle [illegible] l'opération
toujours [illegible] dangereuse mais
de [illegible] l'inflammation [illegible]
qui [illegible] propagée le long
du canal =
= [illegible] [illegible] [illegible] apres
[illegible] 30 ou de 4 heures
[illegible] à [illegible] des
[illegible] qui on [illegible]

operation par
elle même sans
danger

au reste avant de la prati
quer on tentera encore le réu[illegible]
[illegible] au [illegible]
appellé en Communication
on doit s'engager a faire
la même [illegible] =

2° étranglement par engouement — De l'étranglement pour engouement =

— C'est celui qui occasionne les matières arretées dans la cavité intestine qu'elles augmentent considérablement au volume de [illegible] que bientot la proportion est détruite entre le volume de la tumeur et l'anneau d'où difficultées [illegible] a [illegible] qui vient [illegible]

Ce qui le Cause — quels corps étrangers forment l'engouement?

étranglement par l'air — [illegible] c'est de l'aire qui tend la tumeur la ballonne, — traité par

par les excrements — [illegible] ce sont les matières fécales

Par l'air — l'étranglé par l'air arrive a ceux qui ont été vaincus a une d'origine cette air ... lui l'air ... égal
en effet jamais les intestins ont appliqués toujours ils ont distendus ou par des matières ... l'air qui en ... cet air l'arrête ... la tumeur deviendra ... tente, leur contenue mais que dans l'étranglement ... la ... possible

à qui il arrive

— un jeune homme très maigre ... un collège ... des douleurs de coliques ... a l'air — il partait une hernie, un jour ayant quitté le collège ... hernie ...

observation

elle devint irréductible – ou leurs
propagés (?) [illegible]
[illegible] l'étranglement [illegible] En
essaya la réduction – il en réussit
une partie avec un bruit de
gargouillement – il en resta – ces
accidents continuèrent. Boyer fut
appelé, il trouva une tumeur dure
rénitente ayant [illegible] relevant
promptement élastique. En la
pressant on y sentait un mouvement
de gargouillement – Boyer fit des
tentatives assez fortes car le
malade ne souffrait pas par la pression – point
de fièvre, peu de douleurs
internes ventre indolent [illegible]
= Boyer attribua la grosseur
à l'air [illegible] aussi [illegible]
ment précédant et le [illegible].
il conseilla l'application
de la glace pendant quelq
heures puis des tentatives de
réduction – on appliqua
la glace elle resta 3 heur

... a levée la tumeur
était diminuée et le jeune
... obtint facilement
la reduction =

= ou remedie donc a l'étrang
lement qui a lieu par
la pz des remigrans

étranglement par les excrémens

= mais le cas est rare
celui qui a ... matieres fecales est le plus ...

= est étrangle arrive aux
hernies volumineuses anciennes
qu'on ne reduit pas

à qui il arrive

qui ... qui reparaissent ...
apres ...

= ... ces hommes surtout
si elles sont inguinalles
l'ouverture tres dilatée
on peut y introduire
les ... doigts ... repousser
= en ...

de Causes et progrès
de l'étranglement par engouement

Des Causes et du Mécanisme

— le livre prend beaucoup d'aliments et de ceux qui contien beaucoup plus de matier excrementiques de nutritive. châtaignes pain noir
— ces matier passent par la tumeur, mais difficilement car les intestin ne sont pas contenus par l'action des parties voisines par la pression que leur action est diminuée
— les intestins se laissant donc distendre bientot la proportion entre la tumeur et anneaux est changée et les signes de l'étranglement par engouement se manifestent

Des Signes

— Signes de l'engouement
— Constipation de plusieurs jours augmentant le volume et les accidents qui viennent
— tumeur peu douloureuse
— point au toucher

ventre plutot bouffi
que tendu et non
douloureux = le luée-
rquit beaucoup de matiere
a des grands écarts et
a des distances très éloignées
(tandis que dans les étranglemens
par inflam. les vomissemens
sont toutes les ½ h. et plus rap
et peu de matière a la fois)
= la marche en un mot
des accidens est lente
ils peuvent durer 5 - 6 -
9 - 10 - jours chaque
a tems la conclusion
devient possible

= cependant quelquefois cet
L'inflammation vif jointe = engouement se complique
d'inflammation alors
les accidens sont plus
rapides et tiennent de
ceux de la hernie étranglée
avec inflammation
= Donc les hernies = quant
a la hernie volumineuse

plus considérables
Différence quant au développement et à la marche qui est plus lente ici
= il y a des différences dans leurs symptômes et dans leur marche il y a aussi des indications générales =

(Du 21 vendémiaire
Traitement de l'étranglement par engouement des excréments

Traitement

= Dans l'étranglement par engouement il faut commencer dès l'inflammation par les tentatives de réduction = le taxis se pratique ici cependant avec cette différence que les pressions étant peu douloureuses on peut se permettre des tentatives plus multipliées le chirurgien est autorisé même à pétrir la tumeur pour faire rentrer peu à peu les matières

taxis

= la saignée ne convient pas autant ici, on ne doit jamais la faire aux sujets vieux et faibles = on ne peut trop appliquer

point de saignée

Exception

torique.
fortifiant.

lavements
purgatifs

quand persone parles a peut se developper a tumeur un peu douleur ; si elle ne relache pas au moins gueri[illegible] de l'inflammation

= Les toniques excitants sont contrindiqués ils augmentent le relâchement ; il faut préferer les toniques [illegible] vineuses [illegible] résolutif ou fortifiant [illegible]

= Les lavements conviennent (non seulement) d'abord parce que la portion étranglée est embarrassée [illegible] de plus tout le reste du tube se trouve gorgé, ou les lavements diminuent le volume intestinal [illegible] en irritant les matières les rendent plus [illegible] expulsion [illegible] doivent par là [illegible] = Mais quels lavements ? le but est [illegible] il faut donc des lavements irritants purgatifs. = De [illegible]

de senez. huile de Noix, s'il purgatifs ou tout autre. Souvent employé pourvu qu'il soit purgatif = on a beaucoup vanté les lavem. de fumée de tabac pour faire rentrer les hernies par étranglement. De Haen ratio medendi, dit s'en être servi avec grand succès. Heister l'en ont été leur témoignage — ne s'opère que le fait l'heure il a peu pratiqué.

lavements de tabac ?

= voici ce que les essais faits à Paris ont appris.

= que la vertu de ce moyen se borne à procurer gélée des matières gros intestins la fumée ne passe pas outre les gros intestins que la douleur qu'elle excite ferme bientôt le passage à cette fumée = donc les lavem purgatifs ont le même effet évacuant, et n'ont pas celui de causer des coliques comme la fumée de tabac

leur effet

	ou la decoction de ...
	qui ... même produit
	des ...
ils sont à rejetter	= ou ...
	passer à la decoction de ...
	ou autre
	= Lorsqu'après plusieurs ...
borne aux lavements	... les matières
	... les lavements ...
	... simples ... ce qui
	toujours ... et augmente
	l'obstacle
	= outre les lavements ...
	... des legers purgatifs
legers purgatifs	= ils agissent en sollicitant la ...
	de la portion d'intestin ...
	... les matières
	et rend leur passage plus
	facile
	= Les effets de tous
effet des purgatifs en général	purgatifs en général
	= remedes irritans qui
	... la ...
	... conduit ...
	stimulus

augmentent le mouvement peristaltique de l'action de la tunique musculaire fonctionne même lorsque augmentée de [illegible] et ce qui convient augmente l'excretion des matieres fecales. Nous voyons aussi voit en les personnes purgées rendre plus de matiere liquide qu'elles n'en boivent. car les matieres peuvent deloger les excrements endurcis, et d'un autre coté

dans les engorgements — les frictions augmentent l'irritent et hatent l'evacuation et font disparaitre l'engorgement. mais on remarque que les purgatifs réussissent mieux si une petite portion lentement de 1/2h en 1/2h cela procure des evacuat. le dégorgement et la rentrée de la hernie

— on recourt donc souvent aux tentatives on applique des topiques antiphlogistiques on administre

Résumé du traitement — des lavements purgatifs on administre des purgatifs legers, des sels et

l'operation | l'on
inciser [illegible] jusqu'à leur [illegible] pron
ie et l'operation [illegible] [illegible]
= [illegible] quelle est cette époque
où l'opération devient la seule ressource?
= elle est plus difficile encore
à déterminer ici que [illegible] l'étran
glement avec inflammation on
a quelle époque | l'a vu réduire au [illegible]
[illegible] jours — on en a vu après
10 et 12 jours donc le délai est
ici beaucoup plus long
puis — [illegible] l'on peut continuer
pendant [illegible] tous les tentatives
[illegible] [illegible]
8–10 – jours etc. | au chirurgien instruit et prudent
à juger l'instant où [illegible] délai
ulterieur est [illegible]
= Cependant il est des
cas de délais moins long | [illegible] où il faut un délai
moins long =
= une personne agée a hernie
volumineuse elle s'étrangle
par excès [illegible] qui ne
chez les viellards | avait pas la [illegible] par
l'inflam— Cependant il faut

operer [illegible] on pourrait
perdre le [illegible] par l'affou
blissement on le jetterait une date
de 8 10-12 jours
= [illegible] que la lutte est prolongée
pendant les 8-9 jours pendant
lesquels on fait des tentatives — ne
pourrait être un vieillard de 70-
75 ans une faiblesse telle
qu'il ne peut plus en revenir

pourquoi?

— or pendant toute la durée
d'un étranglement les uns ne peuvent
rien garder ils vomissent les
liquides et a plus forte raison
les solides =
= il faudrait encore opérer de bonne
heure : la complication d'inflammation
venait à s'y joindre à longue
ment = ainsi
— 3-4 jours longuement puis
a l'occasion d'un effort inflammat
s'e joint : douleur plus que
tumeur douloureuse fièvre
febrile augmentat de tous les
symptômes de [illegible] alors
il faut procéder à l'opération
= on [illegible] pourquoi.

quand il survient inflammation =

temporise-t-on. Dans les hernies d'un enfant. C'est que pas de doute que rien peut faire ... douleurs à toutes les tentatives mais s'il vient inflammation cette raison n'étant plus, on est obligé d'agir comme aux hernies avec inflammation. —

pourquoi temporise-t-on?

= le moment d'opérer arrivé. on prépare l'appareil on incise la peau on dissèque on ouvre le sac ... on agrandit l'anneau et l'on procède selon les préceptes de la médecine opératoire pour cette partie = mais il faut prendre de la conduite à tenir après l'opération

Procédé opératoire. =

Des complications qui rendent l'opération et ses suites plus ou moins fâcheuses =

Complications qui rendent les suites de l'opération fâcheuses

= Lorsque l'intestin est sain l'opération faite à temps. on ...

76

radint et la difficulté qu'on y
trouve prouve combien il n'était difficile
de le réduire si l'on n'avait pas
opéré — divisé la peau le sac et
dilaté l'anneau,
= après réduction faite, si les potions
calmantes toujours purgatifs les accidents
ramènent le calme on a une
opération heureuse

= le vomissement cesse aussi
s'il persiste c'est mauvais signe
mais le hoquet peut persister

le hoquet vient par Sacheux

3 jours après l'opération et le
malade guérie = le hoquet
est un mouvement convulsif du
diaphragme et quand l'habitude
en est contractée il persiste
par cette raison d'aucune
autre cause.

?

= Sroyer a vu plusieurs
fois persistés a 2e jour
et deux ans. calmans — il n'est
donc pas de mauvais augure

exemples

pourvu que le vomissement
cesse et que les matières reprennent
leur cours

Mais il est rare que ces
erreurs se passent d'une manière
aussi heureuse

volume excessif s'opposant à la réduction. = quelquefois la hernie est très
volumineuse elle ne peut être
réduite tout à coup les
viscères ont perdu leur droit
d'habitation

= alors on laisse l'anneau
au dehors les parties non réductibles
les soutenir par un suspensoir
ce tout médiocrement serré —

remède. peu à peu s'y verront.
l'anneau et quelquefois on procure enfin la
réduction — si elle n'a pas
lieu des adhérences se forment à
l'anneau l'humeur reste
au point où elle est, et
on la soutient par un
suspensoir =

adhérences = l'intestin peut adhérer
aux parois du sac
on porte le doigt pour
détruire et il suit y des brides

en les coupe
= 1° être pressé l'intestin est épaissi resserré sa portion de perte de son calibre si elle se rencontrait faut retrancher cette portion car elle offrirait un obstacle aux corps. Résultat natures d'un arrêt rigoureusement symptôme de misérere douleurs de coliques violentes. derniers moments de la portion supérieure au lieu rétréci épanchement inflammation gangrène et mort =

épaississement avec rétrécissement

= Mais la gangrène est la plus fréquente des complications

gangrène

— la quantité de parties gangrenées varie. Ainsi les procédés suivre

trois cas

— trois cas peuvent se présenter
1° dans le premier petite portion de la circonférence de l'intestin pincée 2° ou moitié et trois sont pincés 3° ou enfin toute l'épaisseur du canal est pincée une entorse se plissa.

1er cas de gangrène

= Dans le premier cas symptômes peu intenses douleur modérées

petite portion gangrenée

... suivant

le rim des n'a je pellant pas de cours
le cours des matières nau ulté
pas de vomissem mais seulemen
nausées = l'inflam de la
portion pincée, la fait adhérer
a l'anneau = les adhérences
contractées la portion hors de

Ce qui en résulte =

l'anneau toujours en flam e s'ouvre, les matières s'épanch
dans le sac, l'inflam s'
propage à l'extérieur il s'
forme un vrai abcès gangre-
neux qui s'ouvre à l'exter
ieur =
= Le cas est bien léger
par lui même

Le cas est léger

= on on en fait l'ouverture
ou la nature seule agit,
alors progrès de la gangrène
ouverture à l'aide des escarres
sortie des matières pendant
certain temps = rétrécissem de la
fistule relativement au cours
des matières différemment
enfin la plaie se ferme

et le mal guérit bientôt ou il
persiste et suit le cours de la nature,
tout est par celle ci aidée des secours
de l'art = voyez les œuvres posthumes
de Petit et les memoires de l'acca
demie de chirurgie

cela y remedier

=== Lorsqu'il est appellé et
qu'une tumeur semblable paraît et
s'enflamme cataplasmes émollients = si

cas de cataplasmes émollients

la gangrène est deja manifestée
l'incision de la tumeur est la seule
opération a faire – point
de debridement – l'ouverture purulente fait cesser
l'arrêt des matières – on nui-
rait plutot car en aggrandissant
on rendrait plus difficile l'adher-
ence de la plaie et le retablisse
ment du cours des matières
par l'intestin

ouverture

point de debridement

=== l'ouverture faite les soins
soins de propreté a administrer
= l'inflam vient se dissiper les
levres les bords de la
plaie s'affaissent se rebaissent
et les cavern. favorisent le passage
par l'anus et la plaie se
ferme

propreté

la Plaie guérit

point d'étranglement alternatif a craindre
—
2e cas de gangrene
—
Moitié ou deux tiers pincé
—

l'ouverture formée l'intestin n'ayant perdu que le quart du [illegible] de son volume et le reste de son calibre, en dilatant un peu les matières ne s'arrêtent point en ce lieu. et il ne s'ensuit plus d'engouement pour la suite comme dans le 2e cas de gangrene qui est le suivant =

Du 22 vendemiaire

2e cas. l'intestin pincé des moitié ou deux tiers de son calibre tantôt accidens marchent avec rapidité d'autrefois [illegible] avec lenteur et le cas se rapporte du precedent mais [illegible] alors l'intestin contracte [illegible] adhérence avec le sac se séparent en [illegible] pour les externes [illegible] gangrene [illegible] [illegible] de même ou au [illegible] pour faire cesser les accidens [illegible] [illegible] disparaissent les matières n'étant plus retenues

quelquefois cela quand tranquille
maintenu les pieds ces accidens
consécutifs sont ordinaires
= la conduite est tout simple
on ne remarque la tête
traitement | plus = ramener la à ses naturel.
ouvrir | pour diminuer les accidens de
l'étranglement = surveiller la
marche de la nature
en vue de favoriser la guérison
si cela doit être, ou
la formation d'un anus
artificiel.
quand faut il laisser former ou &c. | = Mais le plus difficile est de déterminer il faut favoriser à guérison ou si
= Il y a beaucoup qui
si le P.C. du ... avait
été ... exposé
Danger de le faire | aux ... habituelles à
l'étranglement ...
de ... mort

nullité de l'arme

= d'un autre côté si
moitié seulement du calibre est
détruite et que suffisant pour
reste si alors on établit
aucun contre [illegible] au
[illegible]
[illegible] conséquemment [illegible]
même [illegible] accidens qui
étaient exposés =

peut on juger combien d'artère est privé à priori

— il faudrait donc déterminer
à priori quelle portion du
calibre a été détruite
pour [illegible] déterminer [illegible]
on a faire aux artifices
= mais la chose est difficile
sinon impossible car
la marche [illegible]
symptomes [illegible]
pour déterminer quelle quantité a été
détruite — au défaut de
cette connaiss il faut se
déterminer par l'ouverture selon
les symptomes suivans

Autre moyens d'en juger

= si on [illegible] percevait
qu'il a pris des [illegible] par la
[illegible] des [illegible]

pas de laisser guérir

se portait de bonne heure
et par les s'aide efforts de
la nature par un cas
quoique le cube vienne peu
de valeurs et quoiqu'il en ferme beaucoup qu'il
en paraît peu par la plaie, en
augmente que beaucoup de la libre
retté et on laisse guérir

Car d'établir un anus artificiel =

— Mais si beaucoup de
matières par la plaie — point par
l'anus ou bien qui ne donne
seulement ce qu'il faut une grande quantité
d'alimentes — on régiond
même point par la plaie
s'il en ressortait par l'anus.
une place les deux fermant
très tous heureux — on
fuge le calibre trop étroit
= alors au lieu de dire

moyen qui y réussirent.

etc. pour favoriser la nature de la
plaie mettre une tente, et cette
dernière à laissé étonnant des
à l'issue
... — le tout pour l'entretenir
ouverte, car la cicatrice rapproche
les bords et forme un anus artifi-
ciel

= il a résulté que les m[illegible] guérissent, aux fistules, aux inconvénient = d'ailleurs éprou[illegible] des liqueurs des accident ou la mort =

3e cas de gangrène aux[illegible] = gangrenée =

3e cas de gangrène aux gangrenée

3e cas = l'intestin [illegible] mant une anse plus ou moins [illegible] avec tantot marqué de taches gangreneuses ça et là, tantot gangrené dans toute sa [illegible] ou à sa majeure partie = on connait cette gangrène tout comme comme ailleurs mais a un gris d'ardoise plus ou moins foncé et à l'affaissement des parois sur elles mêmes = en effet quoique l'on [illegible] l'intestin vert pas gangrené, il est encore tenu remettre à réduire et guérir dans ces cas = mais lorsqu'il est d'un gris d'ardoise et affaissé la gangrène [illegible]

Signes de la gangrène de l'intestin

traitement

ouvrir. il n'y a que des taches

si l'autre est gangrenée

trois procédés

— Dans le cas où l'excroissance ou la portion gangrenée est étendue, si elle sort peu ou de contenir d'avantage — cette ouverture devient nécessaire pour donner issue aux matières retenues et faire cesser les accidens de l'étranglement. on voit alors à chaque évacuation le ventre tendu s'affaisser, vomissements, douleurs du ventre disparaître le visage auparavant étoit composé reprendre son expression naturelle

— Mais que fera t'on quand une anse considérable est gangrenée si le sac ou la gangrène s'étend un peu dans le ventre de sorte qu'on en altère une plus grande quantité qui se trouve morte — il y a trois procédés

Celui de Littre ou Lacunes — entre nature

— le procédé la première ou d'attacher les 2 bouts à la plaie et laisser agir la nature.

~~te~~ le procédé de Ramdor ou l'invagination

Procédé de Littre = anus artificiel.

= pour le premier ligature au bout inférieur etc: état dégoûtant incommode et exposé à l'invagination ou au rétrécissement qui produit l'ileus ... laisse. mais on a presque la certitude de sauver la vie du malade = tandis que l'invagination expose à des accidents consécutifs

Procédé de la Peyronie

= Pour la premier on passe un fil ds le mesentère on assujettit les deux bouts à la plaie on maintient = on traite simplement et alors on a un anus contre nature = on rétablit ensuite le calibre et la plaie fermée — Mais après

Son résultat

la guérison par plaie fermée coliques crise cutanée et d'ailleurs les deux bouts d'intestin forment un angle aigu favorable à l'arrêt des matières — étranglement à ce ... et mort

Procédé de Chandoc — Imagination

— le Procédé de Chandoc plus ancien que lui mais dont il a donné le 1er une histoire exacte — consiste à parvenir à engager le bout de l'épiploon dans l'inférieur et retablir ainsi le calibre etc — s'il réussissait toujours il conviendrait de préférer à tous les autres, mais il est de difficile exécution

Inconvénient — et est suivi d'accidens le plus souvent mortels — donc il ne faut pas le faire que d'après de bonnes raisons

Exemples — — Morgan n'en a vu qu'un exemple. voyez l'histoire du chaudronnier — le bout mourut d'inflam. et d'épanch. du sang des vaisseaux du mésentère détachés de l'intestin pour pouvoir invaginer — il pense donc que pour assurer la vie du malade l'anus artificiel est préférable

Ses inconvénients

Ses inconvé[nients] — les matières coulent continuellement sans avoir besoin de la résistance

malpropreté | qu'elles ont par les voies u
| d'où s'ablète, ejue, proau
| excoriation de la peau &c
| — mais un autre incon
| — Tenus artificiel de pourra cle
| Muscles qui un des du pluie
| n'oppose pas de résista
| a l'éclant ou dio p
renversement | et les muscles abdom
| l'intestin est poussé au
| dehors et fait saill
| en se retournant com un
| doigt de gant. dia
| tumeur d'abord petite
| puis s'allonge quelquefois porté
| a 8 = 10 pouces — 1 fois
| fert le bout supér. où
| les matières tecordées sortent par
| le bout de la tumeur — 1 autre fois
| le bout infér. et les matiè
| sortent par la face de la
| tumeur — quelquefois
| les deux bouts et 2 tumeurs
| dont une rend les excréments

ragissement / renversement

— ainsi cette l'intestin est très difficile à réduire que toutefois on est obligé de le contenter avec des cotillons Pommeau Pêcheur : une excoriation et si l'ouverture (anus) contre ce cœur étrangle l'intestin, sortie ensuite, on conseille le débridement la résection du bout étranglé — puis l'invagination, comme pour l'étranglement mais cela est impraticable

— Donc résulte du premier procédé guérison qui expose au rétrécissement — misère — mort.

Résumé des trois procédés

— du 2e on invag. inflam épanchement = mort le plus souvent

— du 3e on anus artificiel propreté incommode exposition au rétrécissement et à un étranglement toujours bien fâcheux

— donc, pour décider jusqu'à ce cas et consultons les malades est qui préfèrent la mort à une crime contre nature, on ... imagine et

Nécessité du Bandage après l'opération de la hernie

Lors — qu'un ma[lade]
a été guéri d'une opérat. de
hernie quelque soit la [com]pl[ication]
s'il n'y a pas d'autre
contre nature, h[...]
la cicatrice reste faible
et résiste toujours moins [aux]
efforts du [...]
le reste [des parois]
il faut donc que le m[alade]
porte un Bdge. que[lques]
praticiens pensent qu'on [...]
a pas besoin, mais la
récidive est d'autant plus
assurée que l'anneau de[venu]
conserve plus de largeur
il faut donc porter
un Bdge.

Ce qui est dit [...]
des hernies en général
mais il faut [...]
[...]

Hernie inguinale... la page 2.

hernie ingui-nale —

De la hernie inguinale

— C'est celle qui passe par l'anneau du cordon spermatique — il resulte de l'écartement puis du rapprochement des bandes dites piliers de l'anneau. Le pilier interne est formé de quelques bandes fibreuses tantot écartées, tantot rapprochées — le pilier externe est plus dense plus rapproché plus formé — l'anneau inguinal est plus grand chez l'homme que dans la femme non seulement à cause du cordon mais cause les enfans apportent souvent en naissant une disposition qui favorise la hernie — on peut distinguer

ce qu'est l'anneau inguinal

2 hernie inguinale

Hernie Congeniale

Ce que c'est =

anciennement connue

deux sortes de hernies inguinales l'une de naissance ou congeniale l'autre accidentelle ou ordinaire = la congeniale acquise par une disposition apportée en naissant = l'ordinaire à un age et au moins avec par un accident =

= La hernie congeniale = elle n'existe pas à la naissance mais peu après = les enfants n'ayant souvent que la disposition à la tumeur c'est-à-dire que la cause est à venir = cette cause efficiente est la respiration qui communiquant aux parois et aux visceres abdominaux jusque là immobiles = la hernie ne se fait donc que l'enfant a respiré la où que les visceres ont été poussés là.

= Cette hernie est connue anciennement = hernie et

Morgagni l'ont forme mais n'ont pas bien expliqué sa formation

= Morgagni a expliqué ainsi la hernie ou le testicule est en contact avec l'intestin ou l'épiploon. C'est une hernie congénitale dans laquelle le sac herniaire est rompu et la tunique vaginale également. D'où contact immédiat du testicule, mais qui trouverait cette rupture? si elle arrivait on trouverait une déchirure et qu'on l'observe; tout au contraire on trouve une poche lisse étendue sans traces de solution de continuité entière

Mal expliquée

= C'est plutôt le résultat nécessaire de la manière dont le testicule du traîne le péritoine et du défaut d'oblitération du collet du sac qu'il forme après la sortie du testicule =

Comment donc arrive-t-elle

— avant 6 mois les testicules
Il se trouve derrière le péritoine
recouvert par lui sur la face antérieure

Comment sort le testicule? — et latéral mais un peu plus en dehors au ... par le tissu ou grand psoas — en descendant il entraîne le péritoine il ne le pousse pas devant lui comme fait l'intestin dans les hernies mais placé derrière lui il l'entraîne et lui fait former un repli derrière lequel le cordon s'e trouve placé

L'ouverture qui le laisse passer se ferme — avant la naissance la ... se ferme ou ne fait seulement jette ou obture la communication le sac du péritoine et la cavité est close & il n'en existe plus que pas de trou autour

si elle reste
ouverte

hernie

= Si l'ouverture est donnée à leur ... par
des dispositions à la hernie
mais que cela s'change
que le commun existe
comme dans les quadrupèdes
dans la jouissent toute leur vie
toute leur vie. Les chiens que
= l'intestin vient s'y presser
... et ... engage et la
présence devient une stade au ... peut des progrès de l'ouverture
= voila la hernie
congéniale quand l'intestin a
descendu pour peu
il deviendra contact avec
le testicule et si par la
suite ... le sera
aussi il sera également
en contact avec lui = c'est
donc cette hernie) une
suite de ce que l'intestin
... glisse dans la

tunique vaginale du testicu[le]
= mais il ne faut pas
qu'on doive ajouter foi
à une hernie congeniale
Ne pas croire | la tunique vaginale du
aux hernies | cordon — en effet le cordon
en contact | est derrière la tunique vaginal[e]
avec le cordon | il n'en a point de particulière
= il faut pour bien juger les
rapports bien faire attention
à l'époque un adulte peut
epoque de la | avoir une her. de l'enfan[ce]
hernie congé | ce qui ne l'est pas
niale. | congeniale — parce que
elle n'est plus congeniale —
il est rare même qu'elle paraisse
après six à trois mois
= cette hernie congenia[le]
explication du | explique la pneumatocele
pneumatocele | des anciens = ce n'est autre
chose que de l'air contenu
dans les intestins de
la hernie congeniale —

du 22 vendemiaire

De la hernie inguinale ordinaire

hernie inguinale ordinaire

La hernie ingui. ordin. est celle qui arrive à un age plus ou moins avancé qui sort tantot par l'anneau tantot par l'evaillement de l'obliq. du . petit interne.

bubonocele

= Cette hernie est tantot bornée à l'anneau bubonocele

oschéocele

tantot descendant le long du cordon et s'appelle alors oschéocele qui descend jusque dans les bourses

enterocele

= tantot formée par l'intestin. jejunum et ileum ou colon par l'intestin colon par le coecum enfin tantot par les intestins

epiplocele

et l'epiploon du coecum tous

= quelquefois, les parties sortent à l'exception de la hernie elles paraissent dans le scrotum ce qui constitue la hernie

= le plus ordinairement les parties formant la hernie passent au dessus du cordon qui se trouve derrière la tumeur d'ordinaire à la partie postérieure du sac herniaire, de sorte qu'on sent le cordon au droit et au côté à travers le cordon

Cordon derrière la hernie

= quelquefois, mais bien rarement les parties passent derrière le cordon, la tumeur se trouve derrière le cordon, cela se connoît en portant au travers, en promenant les doigts on sent le cordon que le cordon descend devant et roulant droit

Cordon devant la hernie

... mitre

= il existe un rapport constant entre le forme ... et le ... astrique, aussi faut il avant d'operer s'assurer de la position du cordon

= mais le cordon est derriere l'artere epig. elle est poussée en arriere ... conduit ... elle ... au cote interne ... la peau ... le ... muscle ... son bord interne ... ensuite derriere le muscle—

= si au contraire les ... le cordon (ce qui est ... vue) l'artere epigastrique est poussée en dehors ... correspondance cote ... de l'anneau ... mais

rapports à ... interne—

cordon derriere l'art-epigastrique au coté interne

cordon devant artere au côté externe

cela est bien rare

= donc qd le cordon est pas à la partie anter. de la tumeur qu'il est derrière au travers, l'épigastrique est au côté interne de l'anneau & que qd le cordon est sur la partie antérieure de la tumeur l'artère épigastrique est au côté externe de ce même anneau

resumé

= on tire de là une induction relative à l'endroit de l'anneau où l'incision pour debrider l'anneau doit être faite

en tirer induction

= si le cordon est derrière debrider la partie externe & super. de l'anneau — si le cordon est sur la partie antérieure de la tumeur debrider la partie interne de l'anneau

cordon derrière debrider exterieurement —

vice versa

= inutile est de dire plus long, de ces remarques les généralités cy dessus

Cause

vigue

tumeur qu'on peut confondre

Causes des hernies inguinales

(les) mêmes que celles des hernies en général, tant prédisposantes qu'efficientes.

Signes

= tumeur plus ou moins volumineuse bornée à l'aine ou s'étend plus ou moins bas le long du cordon, sans changement de la peau, sans chaleur, sans douleur, cédant à la compression en faisant entendre un bruit (de) gargouillement = revenant après la compression ou à l'occasion d'un mouvement, toux, disparaissant le coucher.

= (Diagnostic) on peut être induit en erreur et prendre tantôt une hydrocèle, tantôt un (varicocèle) pour hernie inguinale ou une tumeur d'une autre nature.

à (prendre en) l'aine (?)

(accidents)

hernie il faut donc comparer la
avec les diverses tumeurs

= dans les enfans on a souvent
Hydrocele des enfans — confondu une hydrocele avec une hernie inguinale lorsque l'hydrocele est venu de l'anneau et qu'on peut la faire rentrer en partie ainsi on met a plus une bandage = mais cette erreur n'est pas commise par un chirurgien instruit

Ce qui la distingue de la hernie inguinale — = signes distinctifs de l'hydrocele et de la hernie inguinale

transparence — hydrocele = tumeur transparente plus que la tunique vaginale cette [illegible] c'est [illegible] en l'examinant avec une bougie impossible de s'y tromper

disparition incomplette — = un autre signe c'est que qd l'hydrocele rentre il n'y a pas disparition totale, mais le [illegible] la [illegible] de la [illegible] qui [illegible] ailleurs en la [illegible] qui s'engage

vous de anneau, enlever les
teguments puis elle revient
et il la tient après la pression
= par crainte de les confondre
dans l'adulte ou la tunique
vaginale s'est retrécie et déjà
près de l'anneau

Cirsocele

= Mais souvent on a confondu la
avec le cirsocelle
= en général les circocelles
sont inquiets et à tort
attaqués de hernie et pensant
comme eux ou deux font
un sage au lieu faire
grand mal =

Ce qui distingue de la hernie inguinale

= voilà ce qui distingue
le cirsocele de la hernie
inguinale épiplocele
= d'abord les signes
commemoratifs sont précieux
en effet le cirsocele commence
toujours dans le fond des bourses
vers l'épididyme par une
tumeur variqueuse qui augmente
successiv. monte et parvient
à l'anneau

Signes commemoratifs

l'épiplocèle = commence par le bas et s'avance en haut en long
= mais si ces indices ne vous ont point donnés

Signes tirés de l'état actuel — attention à l'état actuel de la tumeur

= l'entérocèle = c'est une tumeur nouvelle

Entérocèle dure rénitente et. — qui quand on est quelque temps debout devient plus dure, cède et se rétablit promptement

= l'épiplocèle = tumeur molle

Epiplocèle molle non élastique — inégale mais moins rénitente que la dilatation variqueuse des dessous, toujours plus molle et si il devient dur par la suite, toujours est il moins élastique =

Différence des douleurs — = 2° les douleurs de l'éculement sont rapportées aux lombes dans le circocèle = à l'estomac dans l'épiplocèle

Effet des — = si l'on applique des topiq. refrigérans astringe[nts]

pratique … figurent

Sur le Cirsocele diminution
très principe de la tumeur — le
et la chaleur la font sensible-
ment augmenter de volume
ce qui vient de la raréfaction
ou condensation

— l'épiplocele n'est point
susceptible de ces changements
subits, s'il y en a ils
sont moins sensibles

entrée ou non — l'épiplocele rentre quelquefois
le cirsocele jamais

l'épiplocele ne rentre pas,
en faisant tousser on sent
une impulsion plus marquée
et plus facile à distinguer
que celle que reçoit le cirso
cele par la toux

— attention à tous ces
signes car le bandage
devient très nuisible dans
le cirsocele — voyez l'article
Cirsocele —
— le cirsocele n'est pas la

...ule tumeur qu'on puisse
... prendre on a pris
un testicule pour une hernie
et une épiplocèle pour un
3e testicule —

testicule à l'anneau

— si part un testicule arrêté
à l'anneau — un seul par
dans les bourses, la tumeur à
forme de testicule la pression
... les douleurs &c.

un seul dans le scrotum

— mais une hernie épiploïque
congloméc, a épiploon ...
... a imposé pour un 3e
testicule — presque toutes les
personnes qu'on a vu porter
trois testicules n'avaient
autre chose qu'une hernie
épiploïque adhérente ...
par sa partie inférieure,
... dans le ... et for-
mant une sorte de pédicule
qui ressemble a un cordon

épiploon prise pour un 3e testicule

— Valsalva a fait plusieurs
fois cette remarque — il faut
faire attention car peut être
jamais aucun n'a eu
trois testicules.

exemple

— tels sont les tumeurs
qui peuvent en imposer —

Pronostic — | Pronostic de la hernie inguinale
 | Congéniale aux hernies générales

Traitement | Traitement — On l'obtient en réduisant et maintenant réduite la tumeur par un bandage bien fait — Le sujet s'il est jeune guérira, s'il est vieux il ne guérira pas, mais dans l'âge moyen ce n'est que vers l'âge de quarante ans

Réduction et | — Les enfans doivent ils porter toujours le bandage même durant la nuit tant ... que ce ne soit le seul moyen de les guérir. Car comme on dit les enfans sont remuans et pleurent facilement, la tumeur ressortirait la nuit et retiendrait la guérison.

Les enfans doivent ils toujours porter le bandage? — ou — | Quelquefois leurs hernies échouent et même ceux des hommes adultes — Et si des les congénitales les intestins adhèrent à la tumeur, avec replis qui la forment de manière qu'on ne peut les séparer,

Congéniale unie au testicule — tout réunir | il faudrait réduire tout à la fois

Observation — Un enfant avait une tumeur herniaire, volumineuse, [illegible] quelques [illegible] la firent d'abord [illegible] être irréductible entièrement, mais le testicule disparaissait avec [illegible] proposa un [illegible] pour [illegible] tenir la réduction, la mère craignant accident, consulta [illegible] qui décida que de l'enfant qu'il était indifférent pour les fonctions du testicule qu'il [illegible] dans les bourses ou dans l'abdomen, et tout fut maintenu réduit

hernie inguinale compliquée — Si la hernie est compliquée, on [illegible] la complication [illegible] ayant attention de débrider à la partie externe de l'anneau [illegible] ne paraît pas, et au côté interne quand elle paraît [illegible] partie antérieure de la tumeur

l'hemorrhagie est elle — attention au débridement — La crainte de l'hemorrhagie n'est pas chimérique [illegible] exemples dans [illegible] tions

qu'il regarde comme bien [illegible] ou [illegible] faites, [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] même [illegible] couleur [illegible] derrière la tumeur, et [illegible] [illegible] qui sans [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] un [illegible] interne —

possible ?

exemple

Hernie crurale

du 26 = vendemiaire

De la hernie crurale

C'est celle qui a [illegible] fait derrière le ligam. de fallope ou de Poupart, replié tendu depuis l'épine iliaque antér. jusqu'au pubis

Structure de l'arcade

= derrière ce repli se trouve le psoas et l'iliaque recouverts par l'artère, la veine fémorale et le nerf crural devant le [illegible] que décrivent les muscles psoas iliaque [illegible] [illegible] [illegible] vaisseaux [illegible] de tissu

collulaire des lymphatiques aux quels les vaisseaux avaient trop près de la [illegible] exposés

— il faut remarquer que le replis du ligam. de Fallope est continu avec l'aponévrose fascia lata

— La hernie crurale est plus fréquente ds les femmes que ds l'homme car le bassin est plus évasé l'arcade a plus d'étendue et plus le replis est long, moins il a de résistance. d'ailleurs l'iliaque et le psoas sont moins forts moins [illegible] [illegible] [illegible] par ce qui est [illegible] de tissu cellulaire. De là, la différence

plus fréquente chez la femme

Des hernies crurales de l'homme et de la femme

Les parties formant la hernie crurale ... les 2 e. xcc.
(partiès qui la forment) ne passent pas ... sous le ligament ... pouparts ... ou ... elles passent par les ... fibres aponevrotiques et quelquefois a travers des fibres aponevrotiques du muscle grand oblique alors la hernie est ... sous la peau tandis que ... elle passe par l'écartement
(passent elles toujours par l'arcade)
Elle passe par ... la hernie est ... latérale

... tant elle passe entre les ... et le ... et ... tantot près ... au côté interne
(elles sont du coté du pubis ou près de la crête)

et s'il est le plus [illegible]
car là est moins de resistance
et est un plan incliné sur
lequel le effort. C'est [illegible]
[illegible]
= [illegible] passe entre les vaiss[eaux]
épigastriques [illegible] qui sont
au côté externe de la [illegible]
qui est entre les vaiss[eaux] [illegible]
et [illegible] autre et [illegible]
de [illegible] des [illegible]
[illegible] au côté interne
donc [illegible] tantôt en de[hors]
tantôt en dedans [illegible]
le lieu qu'occupe la hernie.
= [illegible] quelque est
le lieu par où les parties
sortent elles paraissent [illegible]
[illegible] le péritoine qui leur
forme [illegible] constamment
un sac herniaire [illegible]
à moins de hernie de partie

qui le prend du [illegible] artère externe

qui le prend des [illegible] artère interne

indication

toujours un sac

[illegible]
de la vessie

sac derrière le fascia lata — le sac herniaire est derrière le fascia lata quand la hernie passe sous le ligament de Fallope =

sac sous la peau — = Mais quand c'est par l'écartement des fibres de la paroi des grands obliques le sac est immédiatement au dessous de la peau

parties formant la hernie — = Les parties formant la hernie sont le jejunum, l'ileum, le [redacted] du colon quelquefois, rarement l'intestin cœcum = cette hernie acquiert très rarement des grand volume à cause de la résistance que lui présente le fascia lata située devant elle, et quand elle devient volumineuse ce n'est que transversalement

signes — = Signes de la hernie crurale = tumeur aux l'aine de couleur à la peau

qu'elle disparoissait à la compression et qu'on explorait ... le doigt revenant vers compression ou par un effort, = voila les signes généraux ; mais on peut s'y méprendre

= la méprise ne peut tomber que sur les hernies crurales qui ne rentrent point =

Méprise à craindre

= voila les tumeurs qui pourroient en imposer pour les hernies crurales non rentrantes

par celles qui rentrent

= on a vu, et peut en citer un exemple, une tumeur formée par la dilatation variqueuse de la grande saphene en imposer à une personne peu instruite par ce qu'elle disparoissait à la pression = Mais il

par une varice

Ce qui la distingue

ya la fluctuation qui existe pas dans la hernie, la couleur de la peau est changée, les autres

partie de la meme sont
aussi cancereuses.
Par un dépôt par congestion — un depôt par congestion
du a un pareil des dos (?)
niveau
— si la tumeur qui en tente a
paru tout à coup a l'occasion
d'un effort ... si elle est
susceptible de disparaitre a
attention aux antécédens — la compression et si des colique
ont existé qu'on puisse ...
pris pour des douleurs de
coliques — exemple du
jeune homme de Rouen
cité a [illegible] dépôt par
congestion
— il n'y a donc que les
tumeurs cancereuses et les dépôts
par congestion qui puissent induire
en erreur mais avec un peu
d'attention pourra s'en mettre
a l'abri
pour celles non entrantes — a l'égard des hernies crurales
non entrantes l'impossibilité

de leu présence
... hern. ou d'étran-
glement
== quand sort la a
par étrangle- l'étranglem. elle s'écoulement
ment = ou ... tout repetés
de l'étranglement
== mais si le défaut de
par adhérence réussite vient d'adhérence on
peut confond avec d'autres
tumeurs des aines, un
bubon, p. exemple
— voilà les sympt. qui disting.
les hernies crural. non seulement
les autres tumeurs
== d'abord ne point
porter de prévention en faveur
d'une idée, ne pas croire
que toutes les tumeurs inguinales d.
un jeunes hom. soient bubons et dans
un vieillard soient hernies =
== ces hernies ont épiploïq.
ou intestinales
la hernie épiploï- — épiploïq. = elle est moll
que peut être
crue un bubon

nouvelle, à moins qu'ancienne elle n'ait contr. [illegible] intestinale [illegible] c'est une elasticité qui la fait reconnaître

pour les distinguer — on la disting. d'une tubur. parce qu'il a précédé un [illegible] une [illegible] une [illegible]

le bubonocèle avec inflammation locale — et d'ailleurs le bubon est accompag. d'une [illegible] inflammatoire bornée à l'endroit tandis que si la hernie est [illegible] des

la hernie avec accidents pas-tonques — symptômes indiquent la affection intestinale de l'estomac [illegible]

bubon adhère évidemment — Les bubons ont une base large très adhérente très résistante — résistance que n'offre jamais une hernie toujours un peu mobile —

hernie mobile — il est utile avoir égard aux circonstances commémoratives

attention aux antecedens | jeunesse impour mode uléreux précédente gonorrhée &c.

causes | causes — les mêmes

prenostic | prenos idem

traitement | si reductible une Bandage si autant — si irreductible remèdes selon la complication et si c'est nécessaire il faut en venir a l'operation

reduction &c.

operation | = on le operation pratique comme dans les autres hernies avec certaines modifications

qualités de l'incision | = incision a la ... oblique de dehors en dedans et de haut en bas, elle doit mettre a decouvert toute l'etendue de la tumeur et par cette incision au milieu de la tumeur ... tumeur

est très plein et oblique
en transversale ~~une~~ (ment) incision
seule ne suffit pas il
[illegible] faut une autre - on
fera une fois l'incision faite au
milieu de la tumeur et se dirigeant
circulaire ouvert il sort du sang et tripoli
ploor, mais l'arcade
a trouvé trop en dedans
pour être débridée, il fallut
faire une incision pour
détourner l'arcade et faire
le débridement
— il ne faut pas oublier
dicine. lorsqu'il existe la hernie
uerale . . . . . . sur laquelle
il faut introduire une
sonde cannelée puis à
couper pour découvrir le
débridement [illegible] en . . . .
en extérieure — . . . . incision
ment = dehors et vice versa

pour les raisons v[illegible] dites
= voila tout ce qu'on
peut dire de la hernie
crurale sans repetés espécialités

hernie ombilicale

**De la hernie ombili-
cale ou exomphale**

C'est celle qui se fait
par l'anneau circulaire qui forme
au milieu de la ligne

definition

blanche les trois muscles larges
de l'abdomen — par où passent
les arter et à veine ombilicale

Structure de l'anneau a la naissance

qui réunis constituent
un cordon vasculaire dit
cordon ombilical

après la naissance v aussi
ne passant plus s[illegible] les vaisseaux

après

leurs parois s'approchent
[illegible] tout souvent se eu
en un cordon ligamenteux

comme l'anneau diminue de volume le cordon remplit enfin l'anneau

= ce avant cette retrecissement, si l'on ne comprime pas les parties elles peuvent s'engager | précaution les 1ers jours pour prévenir la hernie.
à cette ouverture et former une hernie ombilicale, donc il faut avoir l'attention aux les 15 premiers jours d'exercer une compression modérée avec des petites compresses sur l'ombilic

= quand la hernie ne se fait pas là que chez les jeunes enfans, chez les vieillards les femmes ouvent encore l'anneau ecarté et les fibres de la tissu blanche trop foibles présentent un écartement plus où s'engag les viscères | la hernie passe quelque-fois par à côté de l'anneau — chez les adultes

aspect de l'eau — alors la hernie forme une
phale alors — tumeur allongée attachée par
un bout de boudin

le plus souvent — = Mais règle générale elle
sortie par — se fait par l'anneau =
l'anneau même — donc n'a pas assurément petit
que toujours chez les adultes
elle se casse par les carbon
ent des fibres de la ligne blanche

différence du — Donc = Cette hernie diffère
lieu de passage — 1°. par la partie qui permet
la sortie au l'anneau,
ou l'écartement de ses fibres

Du volume — 2° par le volume d'abord
très petite formant une
tumeur qui s'ouvre une
peau d'hiver peu à peu
elle acquiert devient extrêmement
grande et même acquiert
quelquefois un [illegible]
[illegible], elle contient
alors a [illegible] parties
des viscères et le [illegible]

ven per ...

les parties qui la forment ? c'est le jejunum, l'anse du colon qui est tirée près de l'ombilic le ... quelquefois l'estomac qui entraine l'epiploon ...
de même que le duodenum entrainé par l'estomac

Parties qui forment l'exomphale

ont elles un sac?

= ces hernies ont elles un sac herniaire comme les autres ou le péritoine ...

Petit croit que non

— Petit pense que ces hernies n'ont pas de sac herniaire

= le péritoine, dit il, est très fortement adhérent aux muscles abdomin. près l'ombilic; l'adhérence est telle

fondé sur l'adhérence du péritoine

que ces efforts conçoivent plutot
les peritoine qu'ils ne dilatent.
les adherances du peritoine
et des muscles —

elles en ont
ces — mais il faut remarquer
que ces adherences ne
sont pas a beaucoup pres aussi
adherences
desagreables — fortes qu'on les peut disseque
aisément chez un jeune
sujet — que la sortie
sortie graduée ne se fait qu'a peu a
qui les detache peu, que quand on
disseque on voit la surface
interne
des tegumens etre lisse et
recouverte du peritoine
maintenant comme la peau
l'interieure des est tres mince
tegumens tapissée et que le peritoine qui
du peritoine lui est intimement
collé est aussi
fort mince — de sorte
il

~~[illegible]~~
arrive le plus souvent
qu'en ouvrant on coupe
le sac avec la peau

Signes — Signes

tumeur plus ou moins volumi-
neuse sans chang. de couleur à
la peau — sans chaleur
tumeur molle sans fluctua
tion qui rentre quelquefois

Signe qu'elle passe ou non par l'anneau — si sa base est au milieu de l'ombilic et arrondie on juge que la hernie passe par l'anneau ombilical si elle est à côté de l'anneau on reconnait qu'elle a passé par l'éraillement [illegible]

Pronostic — Pronostic

= on peut réduire cette hernie la maintenir et la

guérir même radicalement
chez les femmes qui en
avaient étant grosses si
on les traite bien après
l'accouchement

traitement — ═ les bandages propres
a cette hernie sont difficiles
réduction a faire bons, il faut
et Bandages qu'ils s'é prêtent aux
— mouvements de la circonférence
qu'il augm. et diminue
de circonférence avec
la respiration et avec
la plénitude ou la
Choix des vacuité de l'estomac
Bandages ═ Les bandages a
— l'oeuillet et a ressorts
ne sont pas bons ils se
déplacent — ils faut en
employer avec un
demi cercle élastique

qui ne puisse vaciller
= mais il ne faut pas
que la pelotte entre dans
l'anneau comme un
bouchon c'est le moyen
d'entretenir la hernie — il faut
une pelotte pour la hernie
inguinale crurale &c.
De Lacomp ... l'oignait l'ouverture de la
hernie facile l'abdomen, une peau
de sa cavité mais jamais
assez pour boucher exactement
l'anneau avec cette
précaution il a guéri des
femmes plus que adultes
= Les enfans étant bien
exposés et ne pouvant
guérir que par un tems
très long ; on a proposé

Peut on guérir
les enfans par
une operation

la cure radicale par
la ligature ... Alors
le ... ne peut retenir
l'anneau et doit être re
jetté ... les ... utiles
ont procédé de Desault - voici comment
le praticien fait ... on l'on
réduit ... hernie on fait

Procédé — pincer l'anneau ... lie
Desault y a cru — ... peu ...
Propre = — ... d'avantage ... enfin la peau et le sac se coupent
= — ... il reste ulcère un
peu large qui guérit bientôt -
le procédé guérit pour
quelque temps mais près
il n'est pas — un ... mois la hernie
radical — revient ... obs
— erve le citoyen ...
= on ne pourrait ...
... après la reduction
qu'on vient faire porter
le bandage est — un ... celui ci
le seul -

peut toujours suffire

Si la hernie ombilicale s'étrangle on la réduit par les moyens cit. supra, et s'ils sont inefficaces on recourt plus ou moins promptement à l'opération suivant l'intensité des accidens, l'ancienneté de la hernie, la sensibilité &c. &c. cit. supra

Exomphale étranglée	
L'operation	
Debridement en haut et à gauche	
Difficulté de cett operation	

= incision cruciale à la tumeur, et pour écarter avec attention de blesser l'intestin — on débride en haut et à gauche parallèlement [illegible] ... ombilicale qui quelquefois n'est pas oblitérée = ... on réduit &c. = mais de toutes les opérations de hernie celle ci est la plus délicate — ou moins beaucoup l'epiploon est sorti et cache les intestins il faut bien les écarter bien les éclairer

avec le doigt pour arriver
à l'intestin et alors
on le bride — le bistouri
gastrique ou le plat
qui est a lame très
étroite est le plus convenable

bistouri a préférer =

mr. Boyer a été bien
trouvé de le porter à
plat sur le doigt

manière de le Porter =

Le retournant le tranchant
vers l'anneau quand il était
engagé entre celui-ci et la hernie

= la reduction faite des
intestins il reste q fois
une gde masse épiploique
difficile à réduire et qui
rentrée pourrait occasionner
causer des accidens &c.
dans ce cas il faut
rétranche, et ne
jamais lier — car il
en résulte des accidens

Epiploon restant après la reduction

le couper

La ligature est dangereuse

observation

toujours brandage après l'opération

ptômes semblables a ceux de l'etranglement — une fois il opera une femme ayant une hernie exomphale umbilicale volumineuse il trouva une grande quantité d'epiploon qui servait a l'exterieur du sac, son detachement fut difficile enfin il parvint à l'anneau qu'il debrida l'intestin fut reduit, beaucoup d'epiploon resta il voulut le lier après avoir mis un bolus de caustique et il fendit l'escarre la ligature sans douleurs attrai il falut alors perce et la malade guerit fort bien sans autre accident, l'epiploon s'ecicatrisant au niveau de la plaie servait de bouchon, mais cependant il conseilla l'usage habitud d'un brancage —

Du 27 [illegible]

= Les autres ouvert naturelles du bas ventre outre les precedentes sont le trou ovalaire et l'echancrure ischiatique

Forme du trou ovalaire = Forme du trou ovalaire =

= Le trou oval ou obturateur est une grande ouvert ovale dans le triang. que presente la partie inferieure de l'os innominé a l'union de l'os pubis reunit a l'os ischion

Structure du trou ovalaire et ce qui s'y raporte = Dans l'etat frais un ligament ou plutot une aponevrose remplit le trou [illegible] remplit a l'union laissant en haut une espace par ou passent les vaisseaux et nerfs obturat. = Est recouvert en dedans par l'obturateur interne en dehors

par l'obliquateur externe en
dessous du pubis passent les
vaisseaux obturateurs entre les muscles
obt. int. et externe =
= il en resulte que les hernies
suivant le trou ovale reduit a
une petitesse telle que le petit doigt
peut seul [illegible] porter
servent par
la que [illegible] les vaisseaux
suscitent qui sortent de l'excavation
du bassin =
= D'après la position de la partie
superieure du bassin de d'apres les
[illegible] et les efforts qui
font [illegible] les [illegible]
le fond du bassin on
peut tenter de croire les
hernies de ce trou impossible =
= Ainsi Desault [illegible]
avait

on croirait cette hernie impossible

Desault la voit

= Mais ce qui est vrai
ne paraît pas toujours
vraisemblable en pathologie
il faut s'en rapporter aux
faits

= Cette hernie a été re
connue par des hommes
célèbres et Verduc et Vich
qui Duverney — Garengeot
mais de tous les faits
qui la prouvent l'observation
de M. Baudelocque
est la plus frappante

Baudelocque
la trouvé

= M. Baudelocque trouva sur
le cadavre d'une femme
une hernie du trou
ovalaire qu'il montra
à plusieurs personnes
mais qu'il commença
en dissequant les

partie il [illegible] . ce [illegible] mais
il ne la montra pas
qu'à l'académie mais
[illegible]
que [illegible] et dit
que c'était artificiellement
préparé =

elle est très rare

= Mais cette hernie est [illegible]
rare de la pratique.

= Les parties qui peuvent
s'engager dans le trou ovalaire sont

parties qui la forment

les intestins grêles, l'intestin
[illegible] surtout [illegible] solutions
[illegible] de la [illegible]
la vessie [illegible]
[illegible] dans l'homme
et de sa matrice dans la femme

signes

signes de la hernie du trou
ovalaire -
tumeur à la partie [illegible] infé-

interne de la jambe au bas, le
pi il se collecte et devie
se convertir autour de la plan
et de la graisse =
= elle n'est pas cir-
voir circonscrite conscrite comme les 3 précédentes
= car les parties lâches
entre les muscles ne
peuvent pas rouler au dehors
soulever la peau et
permettre d'assurer au dessus
du niveau des muscles
pour la reconnaître
= l'on ne peut le faire qu'en se propre
signe tiré de a relâcher les muscles à l'avance
la réduction et outre le caillot plus
= lors que les muscles et presser
il ne se fait réduction
on y sent une vide
et la membrane est
avec gargouillement

= s'il y a eu douleurs
coliques en agissant n'
suggéra elles ont disparu
de même tems que
la tumeur est rentrée
— cette réunion des
signes en continue
Signe patho- un qu'on peut dire
gnomonique pathognomonique selon
= ce rapporte aux observateurs
= Cette hernie réduite en
moyen de maintenant avec le régime
la contention le bandage par ce après
des compresses appliquées sur
le lieu — =
= Mais si cette hernie
Elle venait à s'étrangler
s'étranglait et que l'opérat devint
nécessaire on la conçoit.

Tein digerée et même
impossible non que ces
liquides ne puissent être
de concert écartés et qu'on
ne puisse rejoindre
l'intestin même, mais c'est
que le chemin est diff-
icile presque impossible
expose à des inconvenients

inopérable

= La disposition du
muscle [illegible] au dessus
duquel passent des vaisseaux
la grand qu'il y a un
cordon apparemment attaché
[illegible] et par [illegible]
cordon entourant les
vaisseaux [illegible] de
toutes les parties

Par la
disposition des
parties

il n'y a que le ventre qui puisse étrangler il ne peut être l'extérieur externe les parties placées dessus = il ne peut être la portion rose de la courbature qui présente une échancrure laquelle ne peut étrangler
— Comment alors décider le centre a pour indique démontre ou à des portions ou rapport avec ces vaisseaux ne s'opère point pas à ouvrir ces derniers

l'étranglement non observé

— heureusement que l'on n'a pas vu cet étranglement sans doute que lors sortir les viscères ne sont plus assez fort dans le bassin pour former entre eux une grande quantité de graisse

hernie de l'échancrure ischiatique

= de la hernie de l'échancrure ischiatique

= celle ci est encore plus rare =

la structure de l'échancrure la rend rare

= cette échancr. est située latéral. et postérieurem. de sorte que les écarts qui pourroient les visceres en bas étant gêné a cette enchancr. et la hernie est rare = d'ailleurs elle est remplie par le muscle pyramidal bornée par le grand et petit ligam. sacro-sciatique = entre le grand ligament et le sac ne se trouve que le passage du nerf sciatique = et entre les 2 ligaments une petite ouverture pour le muscle obturat. interne et passage de très petits vaisseaux =

obzervée dans les femmes — lorsque cette hernie a été produite chez les femmes, & a été suite de l'amplitude du vagin et de son ouverture

Vaginer — vaginer

Les parties qui sont de la région du ... des cuisses sous le ... du ... et ... le trajet du nerf ... poussant le périnée ... allée tantôt la tumeur ... au ... du ... tantôt elle descend encore plus bas ... on a vu descendre ... jusqu'au jarret

— il y a une tumeur ... qui ... aux fluctuation

qui . cette prime . d'exposi-
tion . ... rentre
qui ... pouvant ... être
été ... augmentation ...
... par ses ...

traitement — traitement

= elle peut être réduite

- réductible — mais non seule-
ment, l'endroit est trop
- non contenable — profond la ... pris
... rencontrerait absorbé
par le ... ...

= les ... quime
a été observé ...
a ... fait = les femmes
... ont livrées
aux ...

d'éprouver
qui d'être eux seulement mais
avec une augmentation
de vie une laideur croissante

Hernie du ventre ou ventrale — Des endroits du bas ventre ou aux ouvertures qui peuvent donner passage aux viscères = abdominaux =

De la ligne blanche — La ligne blanche — on entend par la nom une ligne mathématique qui du pubis va à l'ombilic

Ce que c'est — et est le produit de la réunion des muscles abdominaux mais encore on y comprend tout le ventre toute la portion aponévrotique qui se trouve entre les deux muscles droits — cette ligne est plus large supérieurement

et moins inferieurement aux les
muscles se rapprochent.

Cette Ligne est composée
que des fibres aponevrotiques
des différens muscles qui
en s'en unissant forment
une Membrane mince
inégale et peu épaisse.
C'est par là que passent
les vaisseaux.

Hernie longue
par l'aillée de
la ligne blanche

Quelquefois les Muscles
droits s'écartent un peu
et toute la ligne blanche
peut céder et former des
tumeurs longues qui
menacent s'accroître
Ici c'est chez un
jeune homme où a
espoir qu'un bandage

On en arrête
les progrès chez
les jeunes gens

et guérison radicalement — bien fait on guérira l'enfant a une telle [illegible] des [illegible] qui y

= un enfant de 10 à 12 ans était [illegible]

Exemple

qu'il ne s'ouvrait aucune [illegible] au bout entre ces deux [illegible] Boyer [illegible] les [illegible] [illegible] qui [illegible] a [illegible] laquelle guérit radicalement

Mais chez les vieillards

= Mais chez un vieillard on ne peut que [illegible] [illegible] on n'a pas l'espérance d'une guérison radicale

hernie crurale (ou l'ombilic) par écartement

= il [illegible] plus souvent que les [illegible] s'écartent [illegible] de l'ombilic et par là se développent les [illegible] qui ne

jamais | forment jamais une tumeur
volumineuse | bien saillante & faire des
| elevations
| = on voit une tumeur
| molle ni résistante
verge | ni dure ne laissant
| pas une depression comme les tumeurs
| enkistées le même lieu
| qui lorsqu'on les presse au milieu
differences des | du ... qu'on peut prendre
tumeurs enkis- | pour l'ouverture une forme
tées = | Mais sur les tumeurs
| la peau est mince
| rouge ... luisante
| et l'on sent une
| ... fluctuation
| = sur la ...
| la peau est naturelle

[illegible] de [illegible] [illegible] a
[illegible] [illegible] [illegible] a fait [illegible]
effort &c.

traitement

traitement — On les réduit, et on les maintient par un bandage comme [illegible] pour [illegible] ombilicale. Mais le bandage [illegible] a [illegible] plus [illegible] [illegible] a [illegible] [illegible] aussi faut il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] en [illegible] par un usage constant guérir radicalement. Mais c'est trop tot on veut cesser l'usage de ce moyen

réduire

maintenir

cure radicale possible

Mais ne pas cesser de long-tem l'usage du
Bandage

les effects de la compression reunient et forcent les ouvertures de lan- (?) pend (?) que lquels peuve le produit de 5 ou 6 mois de lusage du bandage = C'est ce qu'il

observation

a vu depuis peu le sujet c'est remis à lusage du bandage et espere sa guerison

= les hernies de la ligne

Les hernies ne s'etranglent pas

blanche sont etrangl car les ouvertures ne peuvent assez revenir sur elles memes pour etrangler &c. cependant comme

on en connait la possi-
bilité il faut recommander
l'usage continuel du bandage et si
l'étranglement avoit lieu y remédier
par l'opération avec les précautions
indiquées en parlant de la hernie
ombilicale

= indépendamment de la ligne
blanche on a vu des
hernies ailleurs dans l'étendue de
la surface abdominale
= petit en a vu une

hernie sur la crête de l'os des iles
la crête de l'os des iles entre le bord postérieur
du grand oblique et le bord
antérieur du muscle grand
dorsal

= on a fait que cette
disposition anatomique a contribué beaucoup

l'a- l'autre [illegible] l'aure
même en [illegible] Et en même
temps le transverse et
le petit oblique mais
quand le grand [illegible]
[illegible] peut beaucoup
il reste un intervalle
entre le bord de ces
deux muscles et par

Comment elles arrivent — [illegible] le transverse et du petit oblique la hernie est possible

= il peut encore [illegible]

hernie par les cicatrices — [illegible] très [illegible] les points de la [illegible] a [illegible] bas ventre par une cicatrice de plaies [illegible] opération

---

l'abrile qui resiste moins que le reste par consequent i e' l'aine des hernies

== on fait porter des bandages pour ces frienuies Et i i en survient il faut repousser la tumeur la contenir et l'empecher de se repro- duire par un Bandage

le remède est un bandage

== hernie des parties superieures et inferieures de

hernie des parties supres et infres de l'abdomen

== Plusieurs de ces hernies il se fait entre par la partie super et bien sous la partie inferieure de l'abdo

== les premieres sont

Hernie thoraciques / supérieure / inférieure — les hernies thoraciques ou inférieures dans lesquelles les [illegible] passent par la poitrine

Ces hernies a [illegible] de différentes manières

Par division du diaphragme — on a vu des conformations vicieuses du diaphragme ce muscle refoulé en haut comme une [illegible] et [illegible] laquelle les viscères peuvent s'engager et former une tumeur thoracique ou hernie [illegible] la porte une observation d'une hernie par division du diaphragme

Contenant le Stomac le foie, la rate &c on

voit bien le diaphragme

avec division du diaphrag-me — présente une ouverture ... naturelle ou par le fait d'une plaie qui donne passage aux viscères

Leur Cause — Le diaphrag est ouvert ... naturellement ... [illegible] en permettant ... [illegible] ... [illegible] ... les viscères s'engagent peu à peu ... l'avantage ... forme une ... différente ... en ce que les viscères ... [illegible] ... poumon

possible seulement à gauche

Mais on sent que cette tumeur ne peut se rencontrer que du côté gauche Morgagni qui en a beaucoup recueilli d'observation n'en a point vu du côté droit en effet le foie remplit tout cet espace ... même au delà du ... aussi ... la ... de ... que ... il y aurait une ouverture rien ne pourrait s'y introduire et elle serait exactement bouchée par la convexité du foie

Parties qui la forment

= c'est l'asthme parce
… Colon, …
… … ilz … …
… … quelques
… convolutions … …
qui la forment

Signes

= Signes de la … thorachique
= sont … … …
… – Mais difficulté
de … …
… asthme … …
… … plus
le caractère … …

Ce qui la distingue de l'asthme

= … asthme
… mais … …
… a … le … pas

pour la hernie [illegible]
respiration plus facile
a opéré [illegible] le pas
[illegible] l'estomac se porte
en bas par le [illegible]
pousse et entraine les
autres parties et
opère la réduction
[illegible] il est trop
Large pour s'engager
[illegible]
qu'il y ait aucun
vide

traitement — Au reste [illegible]
a [illegible], qu'on
a [illegible]
qu'on a prescrit de
[illegible] aisément

ne se rassasient pas
a chaque ... on a
fait tout ce qui ne
peut faire ...
... a ...
... il vient ...
... pour l'opera
tion affaire le ...
... la nature ne ...
n'opere la reduction —
du 28 ...

Examen
des hermies
suivant le
viscere

après avoir parlé des hernies en
général et avoir parlé du lieu
par où elle passent et des differences
qui en resulte, il faut examiner
les differences qui resultent des
viscère formant ...
— La hernie des intestins ...
... de plus a dit que ce
qui a été dit —
Du duodenum
cependant ... quelques particu
larités ...
— ... duodenum ...

On ne l'a vu un seul dans les [illegible]

de manière à ne pouvoir se déplacer étant [illegible] [illegible] dont on a vu [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] colon [illegible] [illegible] [illegible] je [illegible] et on a remarqué qu'[illegible] le duodénum [illegible] entraîné mais la mort par [illegible] du duodénum puisqu'il [illegible] [illegible] par [illegible] et avec tout le reste

L'S du colon

— L'S du colon [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] ils remarquaient [illegible] à remarquer que [illegible] les [illegible] [illegible] les appendices [illegible] [illegible] pas pourraient faire [illegible] la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] petit — un [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] volumineuse qui [illegible] [illegible] petit [illegible] [illegible] et petit [illegible] [illegible] [illegible] qu'il n'y avait point d'[illegible] mais [illegible] du colon avec des appendices [illegible] d'un très grand volume

Couvert des appendices

Le cœcum

— L'intestin cœcum [illegible] la région iliaque droite et recouvert

... peritoine ... 3 ... auteur et dire ... quart posterieur environné de tissu cellulaire qui l'attache a la fosse iliaque il semble au premier ... ne pas ... cependant ... un ... par l'anneau crural ... anneau inguinal droit = ... ce qui est ... par cette partie l'anneau inguinal gauche = c'est une observation ... mais ... qu'il existe quelquefois transposition des viscères ... ce ...

Se presente de 3 manières = il se présente de 3 manières = quelquefois le ... par le caecum ... appendice vermiforme qui s'échappe et passe ... l'anneau avec l'épiploon ... gangrene ... et l'on ... fistule ... qui ... guerie ...

1° par appendice.

2° le caecum avec un sac = ou le caecum ... comme les autres viscères en poussant devant lui le peritoine qui lui forme un sac ... alors cette hernie ne differe

3°
Le cæcum
sans sac

importante à savoir

hernie du foie

plus des autres mais on a vu, fin de ... la fin de la vie (?) de une hernie volumineuse ... étant, cette hernie devenir considérable le péritoine entraîner l'intestin cæcum dont partie ou la totalité peut être portée au dehors mais sans sac herniaire, c'est rarement s'envelopper le sac herniaire comme les hernies de quelques hernies inguinales ou crurales
= on ne aurait trop faire attention à cela car si le sac était très ... et qu'on voulût le retrancher on pourrait ... le cæcum et qui serait un accident très fâcheux.
... du ... voyez ci après
= les autres régions abdominales peuvent faire aussi des hernies
= Le foie est trop volumineux pour ... et ... aussi

Il on a vu [illegible] beaucoup les
après la naissance.

= Mauran a vu des enfans
venir au monde avec un
vice de conformation des intestins
[illegible]
[illegible]
[illegible] cela s'observe encore
[illegible]

…le critique De Naissance

= Nous avons vu le foie [illegible]
[illegible] mais sa forme est
changée il est oblong, et
forme une masse [illegible]
[illegible] laquelle on ne reconnoit
plus sa figure = cela doit
influer sur les vaisseaux
qui en sortent et qui y entrent
[illegible] = aussi
les [illegible]
[illegible] ont vu [illegible]
[illegible] cause vice par
une autre vice d'organisation

Vigues

on ne crit pas ainsi conformé

= La rate se forme aussi
[illegible]
[illegible]
[illegible] encore [illegible]

hernies de la rate

L'estomac peut former hernie

ne dit il que dire que la
rate pouvait former hernie
dans une femme dont il
parle par l'anneau ombilical

— L'estomac peut aussi
former hernie mais de différentes
manières.

— on a vu qu'il pouvait
former hernie de 2 manières
dans la partie épigastrique
on a vu les signes qui prouvent
cette hernie &c.

— on a trouvé aussi l'estomac
de la hernie ombilicale bien quelquefois
mais comme il n'y était pas
seul, on ne pouvait regarder
cette hernie comme une gastro-
phale — celle qui mérite ce nom

hernie de l'estomac

hernie de l'estomac

on a rapporté ainsi que les
tumeurs qui arrivaient vers l'appendice
xiphoïde du sternum tantot
a droit tant a gauche
dans l'intervalle des 2 muscles
droits

non prouvé qu'il en

— mais tous les praticiens
n'en [illegible] pas [illegible]

forme seul — | dissection [illegible] par [illegible] cette hernie purement gastrique ... jugée que d'après les symptômes qui l'accompagnent [illegible] ... [illegible] voici

observation — | — La Peironie — une femme avait hernie épigastrique de l'abdomen disparaissant à la compression [illegible] ... du retour produisant des [illegible] mortelle — on la [illegible] purement gastrique — mais la femme étant morte on ne trouva [illegible] la tumeur qui était occupée [illegible] ... du colon

Caractère de cette hernie — | Caractères et différences de la hernie de l'estomac

— toutes la hernie de l'estomac [illegible] parties qui peuvent [illegible] par leur [illegible] pour

elle est de deux espèces | l'estomac présente une [illegible] à côté de l'appendice xiphoïde à droite [illegible] ... quelque fois [illegible] hernie [illegible] pincement

pour les hernies ...
et quand le sujet est ...
et ... ne peut s'en apercevoir
hernie
avoir = Vue ... les ... voyez
les Memoires de l'academie de ...

1°
hernie ... apparente
= ... il y a assez de parties
sorties pour former tumeur elle
est molle ronde, elle signe
non fluctuante ...
... rentre ... ...
... vomissements)
= l'estomac vide, tumeur plus
volumineuse = diminuant
quand le viscère est plein ...

Vertigue
= tant qu'elle reste au dehors
elle produit des envies de
vomir et des ...
qui durent tant qu'on ne
... pas la hernie ...
...

= ... dit dans les memoires
de l'academie
Observation
= qu'un jeune ... chirurgien
portait une tumeur epigastrique de nature
ignorée il eprouvait des
vomissements = il s'embarqua
et continua de vomir il voulut
... ... toujours

étroitement = il était presque guéri = on le revit en France = il vivait à Paris ... le jour de ... et s'inclinant ... la ... de l'estomac. reconnut la ... construisit un bandage ... = quand on trouve à côté de l'appendice xiphoïde une tumeur avec les caractères ci-dessus on reconnaît la hernie gastrique.

traitement — traitement de la hernie gastrique réduction et usage d'un bandage propre à la maintenir = pour réussir l'opération ... réduction = le bandage doit se ... à la forme de la ... et ... ... douleur.

2° Pincement de l'estomac — = Mais l'estomac peut être pincé ... ... à travers ... de l'estomac = pincé en petite quantité ... de tumeur et être ... difficile à reconnaître

symptômes — = symptômes pour reconnaître ce pincement = douleur locale habituelle

nature de douleur

leur effet

de l'épigastre augmentant qu'on les sujets sont debout, tout effort pour se moucher, éternuer &c. et alors par un instinct machinal les sujets y portent la main = cette douleur suivie d'angoiss. de la région épigastrique, d'un tiraillem. incommode qui augmente q[uan]d ils sont debout et d'une vive feu intérieure (?) les sujets = s'ils ... ou respiration ... marqué et quelquefois d'expiration ... la douleur

= Ces douleurs dérangent l'appétit et les digestions aussi les sujets les plus ... tombent en ... sensible et tombent en marasme =

= quand cela ... une personne ... on sent ... mais on acquiert la certitude par l'examen

[illegible] que le [illegible] et l'effet du bandage =

Maniere d'examiner.

= L'examen se fait le malade etant couché, les muscles abdominaux relachés alors l'examinateur attentif, sent quelquefois resonnant un écartement, dans le trajet ou même à la toux on distingue une impulsion &c. pour que l'on en ait la [illegible] [illegible] le bandage mais [illegible] l'usage de ce bandage dissipe les accidens et on reste plein de doute sur la nature de la maladie =

Signe tiré de l'effet du Bandage

= on a remarqué que non seulement le bandage compressif était utile mais encore que les boissons legeres tout toniques de camomille [illegible] petite centaurée étaient avantageuses =

Utilité des toniq

Hernie de la vessie

= après l'estomac il faut examiner la vessie à [illegible] de l'intestin rectum

= La vessie peut former des tumeurs qui tantot sont urines tantot non, mais qu'il faut connoitre

Conformation vicieuse de la vessie hernie

seraient une vue l'organisation on
a vu la vessie tendue en
avant [illegible] l'ex-
terne une tumeur longueure
que l'on pourrait prendre
pour une champignon [illegible]
[illegible] =

= Voici les signes de cette
tumeur vesical par vice de
= Conformation =

Signes

= la [illegible] de l'abdomen
et avec elle la vessie sont
ouvertes depuis ombilic jusqu'au pubis
les bord de la fente vesicales
sont unis et se collés avec
les bords de la fente des
parois abdominales = ouverture
lieu ou les [illegible] interne
et la [illegible] se réunissent
Ordinairement les os pubis ne
sont pas unis aussi [illegible]
ils sont mobiles

Comment se forme cette tumeur

= les parties étant ainsi structurées
les viscères abdominaux comprimant
la vessie poussent la vessie
au dehors et la [illegible]
sa face interne devient
externe et [illegible] sa face

Hernie forme une poche ... s'engagent les intestins — ainsi on voit une tumeur ... ovale ... que l'on peut toucher ... sans douleur la membrane interne étant habituée à la friction des habits ... ces sujets n'ont point ... mais le sang ... de la rouge est une ... qui ... au ... faible ...

— on voit ... sortir ... ... mal les urines ajoute ...

— L'art ne peut rien ici cependant il faut connaître le ... pour ne pas prescrire des remèdes qui ne pourraient être que nuisibles. —

— il y a au gros caillou une tumeur ... à un enfant

— La vessie ... les ... de l'abdomen. Si le tissu cellulaire ... ... de ... cette hernie a ... ... mais bien reconnu et

aspect de cette tumeur —

que peut l'art —

vraie hernie vésicale —

de deux premiers | et bien porta tié entièrement le puis peu
= la vessie peut s'élever au dessus et au devant du pubis
au dessus du pubis | = au demis = tantot par hameau inguinal et fait le plus ordinaire ... à l'entrée ...
= cependant elle peut encore ... par l'arcade crurale
La femme
= mais pour qu'elle puise former hernie il faut qu'elle ait été distendue peu à peu
elle ne peut sortir que très rarement | et depuis long-tems de manière à ne plus revenir sur elle même et à rester au dessus du pubis par les efforts que produiront les hernies, ... cela la poussoraient en bas et prendraient être hernie plutôt que de la penétrer
= mais cela ne peut avoir
chez les vieillards | lieu que chez les vieillards où la vessie perdant

cette a peu d'ou surtout
l'origine de l'urine. Ce qui la
dilate quelquefois au point de la
remonter jusqu'à l'ombilic

— on voit quelquefois de la sorte

hernie vésicale primitive

elle se présente dans les ouvertures
[illegible] ouvrir poussé
le péritoine devant elle, alors
elle n'est recouverte que de tissu
cellulaire, mais quand elle sera
devenue très considérable

peut se compliquer de celle des intestins

elle entraînera pour une adhérence
à son fond les intestins qu'ils viendront
se loger dans la poche
que formera le péritoine entraîné et
la hernie de vessie sera
compliquée d'une hernie intestinale

[illegible] vésicale

— d'autrefois la vessie s'est glissée
dans les hernies d'intestin et
peut-être qui vient les compliquer

— au reste, dans les 2 complications

Mais vessie toujours derrière le sac

la hernie se trouve
toujours [illegible] le sac
herniaire formé de la [illegible] =
ainsi même attention pour
[illegible]

Différence de son volume

== la hernie de [illegible] est plus ou moins considérable suivant son ancienneté etc. le plus souvent elle est réductible mais si elle est ancienne la vessie étant habituellement au dehors formant une hernie et ne peut plus être réduite

elle a la forme d'une callebasse

== la hernie ainsi passée par une des ouvertures anneau en [illegible] ent par la partie [illegible] de portion en une une calle basse [illegible] quant [illegible] par le lieu retrecie qui correspond a l'anneau

Du 29 vendemiaire

Causes de la cistocele inguinale

Causes de la cistocele

non conformation vicieuse

== on a cru d'abord que la cistocele inguinale etait l'effet d'une conformation vicieuse on ne pouvait la concevoir autrement mais si conformat vicieuse elle est [illegible] de tous tems tandis qu'elle ne vient qu'a un age plus ou moins avancé et [illegible] de la [illegible]

Due à la distension de la vessie.

= La grossesse dépend de la
distension extrême de la vessie
car ce séjour de l'urine l'a
ainsi devenue vaste, elle dépasse
les os pubis et répond aux
ouvertures inguinales et crurales alors
si le [illegible] fait des efforts
pour expulser l'urine, [illegible] comprimée
violemment par le poids
de tous les viscères elle s'engage
dans l'anneau [illegible] plus [illegible]
[illegible] passante [illegible]
[illegible] [illegible]
sans prévenir hernie [illegible]
[illegible]

elle descend seule

= si la vessie est flasque et
peu vaste elle pourra entraîner
et descendre seulement dans l'anneau
vaste et moins élevée, elle s'engage
encore et sera fortement poussée
en bas elle ne pourra avancer

elle entraine le Péritoine

sans [illegible] entraîner
le péritoine qui formera une
poche laquelle [illegible] pour
les intestins =

causes

Causes de la hernie =

= [illegible]
beaucoup d'urine [illegible]

= Ds le ..... = tumeur ... plus ou moins volumineuse ds le ... sur le cordon ... ... tantôt manifeste tantôt ...

Mais ce qui surtout la caractérise c'est qu'elle diminue après avoir uriné et si elle reste toujours, la vessie ... par l'urine ... partie intra-abdominale et lorsqu'elle ... manifeste de nouveau =

Ses signes caractéristiques

= On ne confondra pas avec ... qui est molle ... ... par la compression ... mais ... l'éjection de l'urine ... par le ... ... = avec l'entérocèle car les signes ... manquent ... gargouillement ... à la réduction

ce qui la distingue de l'épiplocèle

de l'entérocèle

= Mais ... ... par l'urine elle est ... formée par les ... qui ... autour de l'ordre ... au ... ... réduite ... à la ... aussi et ... même quelquefois ... ... aura

la Sonde, mais quand les urines
[illegible] supérieurement [illegible]
[illegible]

Pronostic

Pronostic =

= Une [illegible] peut être [illegible]
[illegible] avec autre [illegible]
[illegible] que celle de [illegible]
= quelquefois [illegible]
[illegible] que l'étranglement [illegible]
[illegible] les cas [illegible]
au [illegible] qui [illegible]
= Elle compliquée [illegible]
presque = ou la [illegible] petite [illegible]
[illegible] elle est [illegible]
et [illegible] au [illegible]
[illegible] la [illegible] entier et.

Traitement

[illegible] traitement =

récente et réductible

= Dans le 1er cas [illegible]
[illegible] il faut [illegible]
et maintenir par les moyens de la
bonne [illegible]

irréductible

= Mais si irréductible la [illegible]
[illegible]
toile [illegible] qui [illegible]
a la [illegible]
[illegible] [illegible] la [illegible]

Suspensoir qui tend à la réduire | expose à une foule ... parce que la partie ... par la machine de l'extérieur

— par ce moyen quelquefois on a ... complètement arrêté les progrès

réussit | et maintenu la tumeur par une pelote ... = d'autres ont eu à ... heureusement

on ne fait que maintenir | = dans les cas d'irréductibilité on pourrait peut-être guérir en employant un bandage qui

moyen qu'on pourrait tenter | puisse comprimer la portion extra-abdominale pour en chasser entièrement la cavité mais il faut procéder peu à peu per ... ... =

Cirsocèle étranglée | = la Cirsocèle est susceptible d'étranglement mais cet étranglement est plus rare qu'aux hernies inguinales ordinaires — mais cela ne peut être que par un calcul

Signes | = sont les symptômes de l'étranglement par un calcul =la tumeur devient tendue et douloureuse, le malade éprouve ... et le ventre ... ...

niculrent quiqueles - Jean Louis Petit Poit a dû remarqué que le Bruquel il a prenne toujours les avancissemens tandis que sont les contraires à hardie à l'urine, mais cela merite confirmation car on ne veut pas trop que ce qu'il a fait au faire étranglement de ce j'est que plutot qu'entre cette le ~~la ~~ ~~
étranglement et le vomissement =
= quoique pit en s'est. il faut
que l'on a le moyen d'aggravé une pierre, on doit faire

Il y a une calcul l'extraire

par incision longitudinale
les pour donner issue aux urines
et pour extraire le calcul
= cette operation a été faite avec succès, seulement la pierre

Quand même il seraitlibre

étant arrêté, mais encore la pierre libre et sortie de la portion extraabdominale = ce qui est cent fois plus avantageux que de tenir la pierre et de faire la taille par en bas

Sonde contre la fistule

= Mais pour empêcher la fistule sonde élastique de l'urètre constamment le bouchée

= si c'est une hernie de vessie
poite pour une longue du
[illegible] étoit ouverte, si
faisant [illegible] [illegible] se [illegible]
[illegible] survenue la fistule

= si la cistocele est compliquée
Cistocele avec intérocele étranglée — de hernie intestinale il faut
s'il y avoit étranglement opéré
[illegible] = [illegible] en entrant
le [illegible] ne pas trop prolonger
l'incision inférieurement car
on pourroit ouvrir la vessie
précaution pour ne pas ouvrir la vessie — il faut aussi observer cy
[illegible] [illegible]
sortir de peur d'ouvrir la
vessie

= à l'égard de la cistocele crurale
Cistocele crurale — observé [illegible] les [illegible] fait
une tumeur molle circonscrite
présentant les symptômes ci-
dessus relatifs à l'urine
= on la [illegible] avec
les tumeurs existant au même
lieu par les signes relatifs à
l'urine
traitement — = [illegible] elle doit être
traitée [illegible] [illegible] [illegible]

par [illegible] ce terme par un terme [illegible]
[illegible] par un [illegible]
a [illegible] rétractile

Distinction des hernies

Hernie de la vessie au dessous du Pubis

= La vessie peut devenir hernie au dessous du pubis et se diriger au périnée et se porter chez la femme dans le vagin.

Dans l'homme

= Il y a un exemple de la hernie de vessie au périnée dans l'homme [illegible] mais on n'en a [illegible] la [illegible].

périnéale

Par où elle passe

= Elle ne peut y parvenir qu'en passant à travers les fibres du muscle releveur de l'anus. Ces écartant

= les 2 muscles forment une voûte concave qui [illegible] le rectum, or on voit ces sujets où ils présentent des faisceaux fibreux parallèles séparés par du tissu cellulaire

[illegible] la [illegible] poussée par
devant venant de l'[illegible] pour l'
intervalle petit [illegible] il peut e-
présenter à côté du raphé
et les [illegible], entre eux et
la tubérosité ischiatique.

Observation

= On cite un homme qui
avait [illegible] sur un [illegible]
et qui eut une tumeur à
la partie latéral. du périnée
allongée de [illegible] deux ans
sans changement de couleur
à la peau — il urinait
souvent et rendait [illegible]
pour faciliter les urines
il pressait la tumeur cela lui
procurait avant [illegible] l'issue
et la tumeur disparaissait puis
revenait les urines se trouvant
accumulées

Bandage de Piplet

= Piplet construit un bandage
avec plaque d'ivoire [illegible]
[illegible] pour la fixer à une
ceinture. Et bandage servant à [illegible]
et une rigole qui répondait
à la saillie de l'urètre

Cistocele Périnéale chez la femme

Cistocele Périnéale chez la femme

= on a vu la Cistocele périnéale
chez la femme mais rare-
ment dans la suite des grossesses
= on a dit que la vessie
comprimée par la matrice pleine
s'applatit = or cette compression
n'auroit poussé le bas-
fond à travers les fibres du
releveur de l'anus et a
produit hernie périnéale
= on la reconnoît par les signes
de l'urine retenue [illegible]
ut supra =
— elle disparoît après l'accou-
chement [illegible] ut
supra pour l'homme de Piplet

Dans la grossesse

Signes

cure

Cistocele Vaginale

— Cistocele vaginale.
— c'est la saillie de la vessie
dans le vagin = elle arrive dans 2
circonstances
= quand le vagin est
renversé et qu'il entraîne
le bas-fond de la vessie
c'est ici la cause à l'action consécutive
de la matrice [illegible] article

avec renversement du vagin

Cure — ou y remédie par la réduction du vagin et l'usage d'un pessaire —

— Quelquefois on a trouvé dans cette cavité entre le vagin et le canal urinaire des pierres, on les a reconnues à leur bruit — on les a extrait par une incision

Vraie cistocèle vaginale — Mais la vraie cistocèle vaginale se forme de la manière suivante — quelquefois la portion anter. du vagin est tellem. relâchée que

Mecanisme — les muscles abdomin. poussant en haut la vessie, la font s'engager dans cette partie antérieure qui devient convexe intérieurement, se dirige vers l'orifice du vagin et sort même quelquefois au dehors

A qui elle survient — Cette hernie a lieu chez les femmes qui ont fait beaucoup d'enfans

Signes — Tumeur se pressant ou se compressant vers la vulve, rouge, fluctuante et présentant les signes de l'urine retenue ou ... est supra

Ce qui la distingue de la perte des eaux

— [illegible] la fistule vagin[ale]
paraissant[e] [illegible] le travail a été
[illegible] pour la perte des eaux =
[illegible] au lieu [illegible]
[illegible]
derrière la tumeur
— elle paraît aussi après l'accou-
chement [illegible]
occasionnée par le [illegible]

traitement

— quand la fistule est petite
et récente il faut recommander

éponge

l'usage d'une éponge imbibée
de décoction vulnéraire et tonique
— mais le plus souvent [illegible]
[illegible] requis que quand les
fistules vaginales sont [illegible]

pessaire

et alors on [illegible]
[illegible] un pessaire en
bondon — mais il tient
difficilement et il faut
le fixer par des cordons à
une ceinture = aussi plusieurs
femmes préfèrent [illegible]
[illegible]
à cette hernie, à l'assujettissement d'un
bandage

affection de la vessie chez les femmes non hernies

— on a mis au nombre des hernies de vessie les affections suivantes

— une depression du corps de la vessie enfoncé et s'y arrête formant le cul d'une bouteille et le bas des intestins s'y logent là et causent irritation, douleur, dysurie — on a pris cela pour un calcul et l'on a voulu tailler mal a propos

depression du fond

— on a vu la membrane interne de la vessie se relacher chez les femmes, sortir par le meat urinaire et representer une tumeur fongueuse forme, mais on la distinguera parce que ce qui ne [illegible] pas [illegible] même mais vont neanmoins a côté

renversement de la membrane interne

le distinguer de fongus

— on ne peut empêcher les accidens qui ont difficulté d'uriner que par le moyen de remettre l'instrument dans la vessie

traitement

= les Etranglemens de la matrice et du rectum étant moins des hernies que des accidens qui ne méritent pas ce nom, on les renvoie aux considérés suivant les parties qu'ils affectent =

Du 1er (commencement)

Mdies organiques des intestins

Des maladies organiques des intestins qui produisent les accidens de l'étranglement

Intestin passé dans le mesentère

On a vu une portion intestinale s'engager dans une ouverture du mesentère produite par une intorsion ou par conformation particulière — cela a été suivi d'étrang et de la mort des malades =

Bridé par une adhérence épiploique

= on a vu des [illegible] intestinaux formés par l'adhérence du bord inférieur de l'épiploon à la paroi interne de l'abdomen étrangler l'intestin qui

avait placé derrière — Ce ...
été trouvé par le Sault ...
un corps qui était étranglé ...
Histoire. — la personne était
morte des accidens d'étranglem...
après la réduction d'une hernie
des mille a récidive dont
exqu... Et mort —
= on peut en inferer que ...
une réduite
hernie donne lieu à des acci...
à ... de faire ... la tumeur
=== il est arrivé quelquefois

torsion du colon — qu'une intestin ... des
...aine du colon en se contournant ...
elle même à portion entre ...
postérieure et par cette torsion
les matières ont été retenues
et les symptômes d'étrangl. ont
emporté le malade ainsi mourut
Moppeart

mort de Moppeart — === Moppeart était sujet de tout
en tout a des coliques

qu'il rapportait à la region illiaque gauche = ces coliques s'è passaient seules ou par des lavements et attribuait cela a une sensibilité particulière et vivait de régime — environ 48 heures avant sa mort ayant mangé des petits pois il éprouva douleur de colique avec vomissements qui continua jusqu'à la
[illegible] — la douleur de colique étant jour de vomissement car les intestins [illegible] de matières = les lavements revenaient presque aussitôt = accidens de mort 18 h. après
= l'ouverture montra les poumons sains et libres, = le ventre [illegible] les intestins grèles remplis d'air et en examinant la position [illegible] du colon on le trouva renversé [illegible] sur lui même et [illegible] tourné

(?) un état inflam. p...

— il faut mettre au nombre
les affections organiques dont
invagination ou volvulus — l'intestin est une invagination ou
intussusception d'une portion
d'intestin grêle.

— on en trouve souvent
les cadavres des enfans et adultes
qui n'ont pas éprouvé
les symptômes d'étranglement,

— Mais elle a lieu aussi
quelquefois et donne lieu à tous
les symptômes de l'étranglement
on appelle cela colique de
Miserere. Iliaca ileus...

on peut guérir seule — si l'invagination est
telle que le mouvement peristaltique ... agisse pour dégager
... intestins ...

par le progrès

l'intestin se dégage quelquefois la portion intestinale invaginée se montre ... gangrené sort séparé ... par l'anus ... 2 bouts ... réunis ... les malades ont guéri =

par gangrène et chute d'une portion

traitement

traitement =

= on a proposé le mercure avalé dans un état métallique

= on a proposé la gastrotomie pour aller ... l'invagination mais cette opération sera ... pour les raisons suivantes

peut on faire la gastrotomie?

= on ignore si les signes d'étranglement ont lieu au rétrécissement à une bride ou à une torsion, = on ignore le lieu de l'intussusception la douleur étant générale

peut on aller faire de
les hernies par tout le ventre
... tombant sur le
... ont deja
inflam la degagement etait
impossible =

retrecissement

épaississement et retrecissement

on peut mettre au nombre
des vices organiques qui
donnent lieu aux symptomes
d'engorgement l'épaississement des par
d'un intestin qui peut
de son calibre de sorte
que les matières ont peu
a peu ...
a fait et les accidents
= Ce cas n'est pas ...
il n'est pas de pratic
qui n'ait trouvé l'ileum ...

Vignes

vignes
= Souvent ... trouvé ...

région iliaque droite, avec les symptômes de l'étranglement. Survient quelquefois un accident de la séparation des bouts [illegible] et [illegible] au quatrième jour par l'ouverture on donne la certitude

Pronostic

— ou, suivant la circonstance, où est le [illegible] d'être enflammé, où il tombe [illegible] la fièvre lente et la consomption qui produisent le même effet. L'art ne peut rien ici, mais voici un cas où il peut apporter du secours —

Cas où l'art peut secourir

— quelquefois une contusion des parois de l'abdomen s'est étendue au canal intestinal = cette contusion a été suivie de douleurs locales — les douleurs ont augmenté [illegible] les malades [illegible] [illegible]-cave [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Signes d'un rétrécissement par contusion externe

[illegible] symptomes [illegible] vont [illegible] peu à peu et q[uan]d le passage est devenu si étroit que les matières ne peuvent plus s'effectuer enfin le malade meurt avec tous les accidens de l'étranglement

= on ouvre et l'on trouve l'intestin retreci adhérant aux parois du bas ventre au lieu qui a été contus et la portion supérieure de l'intestin distendue remplie de matières [illegible]

La gastrotomie conviendrait

= voila le cas où la gastrotomie pourrait avoir lieu si on [illegible], la suite et la gradation des accidens auront averti le praticien et ne lui auront pas laissé de doute, d'après cela il ne devrait pas hésiter [illegible] en venir à ces [illegible]

puis la partie superieure de l'intestin [illegible] pour procurer une guerison assurée et sans conserver un anus artificiel =

retrecissement a la suitte d'ecarre des hernies

= Enfin si une anse d'intestin gangrené dans une hernie la plaie s'est resserrée que la majeure partie du calibre manque, qu'on a traité par la maniere de la gangrene et laissé guérir ; = dans ce cas les matieres trouvant un passage trop étroit par de l'anneau [illegible] et s'accumulent surtout s'il a pris plus d'alim. que de coutume ou plus venteux, il survient tous les symptômes de l'étranglement et dans ce cas il ne faut plus balancer a pratiquer une ouverture pour donner issue [illegible] et établir un anus artificiel

79

Du Panaris

Panaris

on entend par panaris une tumeur inflamm qui attaq les doigts et les orteils mais plus souvent aux doigts et assez rarement aux orteils

Distinction ancienne en 2 espèces — Les auteurs en ont distingué plusieurs selon le siège qu'il ont attribué au pus et la relation au lieu où il s'est formé

1° le premier a son siège entre la peau et l'épiderme on l'appelle tourniole il fait le tour de l'ongle et il sépare l'épiderme

2eme — 2° le 2eme est le tissu cellulaire sous cutanné entre cette

... la gaine des tendons

3e — Le 3e Entre la gaine et les tendons

4e — le 4e entre le p...

distinctions rejettées — Mais ces distinctions scholastiques ne s'accordent ni avec l'experience ni avec la structure anatomique

la tourniole n'est pas Panaris — En effet la tourniole ... dite tourniole qui n'est point comme une phlogose de la peau ou entre laquelle l'epiderme s'etant ... tout autour de l'angle ... merite t-elle le nom de panaris

la 3e espece ou de la gaine est impossible — Le Panaris de la 3e parait impossible car l'inflammation ...

lieu de la q[illegible] tissu

ou [illegible] tissu cellulaire mais

[illegible] des tissus [illegible]

[illegible] tissu

[illegible] quelques [illegible]

= comment [illegible]

[illegible] aussi [illegible] aussi etendue que le panaris

puisse avoir son siège en cet

endroit

la [illegible] espece sous le rapport inconcevable

= le Panaris de la [illegible] espece est [illegible] le même

car comment [illegible] figurer

un tel phlegmon [illegible]

Collat[illegible] le petit [illegible] los et

le perioste ?

siège du Panaris

= le Panaris [illegible]

[illegible] siège [illegible]

le tissu [illegible] cutané sous la peau

et ses differences viennent
de ses degrés — tantôt cette
tel que la gaine est tend
et se déchire quelquefois
même tel que l'on
lui même fait amendé

de la tourniole

= De Panaris appellé tourniole

= L'inflammation légère de la peau
qui avoisine la racine de
l'ongle est appellé tour-
niole elle se termine toujours
par suppuration mais les
accidens sont si légers qu'il
ne mérite pas le nom de panaris
= = aussitôt l'épiderme est

toujours elle suppure

détaché de la peau la
matière épanchée se bat
autour de l'ongle en
son point — qui

la suppuration se fait autour
de l'ongle le corps se détache
il en revient un autre
quelquefois un peu différent
du premier et bien conservé
une legère difformité
mais quelquefois le premier
ongle ne tombe pas
un second vient s'y
ajouter ce qui produit
difformité incurable mais legère

Cure — On traite avec l'emplâtre
d'onguent de la mère, puis
de cérat etc

pour les excroissances — Si la suppuration s'est
faite sur le côté de l'ongle
il vient y devient une
excroissance fongueuse [illegible]
[illegible] plus [illegible]
avec [illegible]

ou détruit cette fongosité avec l'alun calciné, tranche-couille ou pierre infernale qui est encore préférable

= Du vrai Panaris =

le vrai Panaris

= quant au véritable Panaris Souvent il attaque indistinctement le médius, l'annulaire et plus rarement l'auriculaire mais le pouce y est aussi très exposé ; de tous les doigts le médius y est le plus exposé

quels doigts il attaque

= ? il est de cause interne le médius en est le plus souvent affecté on ne sait pourquoi

= ? de ? les 3 premiers doigts dont on ? ? est le plus et qui sont les plus exposés aux blessures en sont plus souvent le siège

Causes

Causes internes

internes — Les panaris de cause interne sont les plus fâcheux et on remarque que qd les sujets n'ont pas voulu se permettre l'ouverture prématurée du phlegmon ils sont plus exposés aux caries à l'exfoliation des tendons et à la courbure des doigts =

Les plus fâcheux

= Les personnes sujettes aux affections scrofuleuses aux écrouelles sont les plus souvent affectées de panaris

externes

Causes externes

= Ce sont les plus fréquentes = quelquefois une blessure qui atteint le nerf qui est sur le côté du doigt = D'autrefois une piqûre

Ces moins dangereux

Mais a moins d'une très profonde piqure il est rare de voir résulter un panaris bien considérable d'une cause externe.
= Car : les causes externes qui sont communes le plus souvent d'une piqure contusion violence externe &c.
= Le panaris peut présenter de la différence dans son intensité et sa profondeur ce qui a donné lieu aux distinctions des anciens.

Symptomes

Signes et symptomes.
= Douleur chaleur battement dans le doigt qui

soit être ... ecté = si
la douleur est vive dès
avant que le gonflem paroisse
on peut conjecturer que le siège
étant profond le mal aura
fait des progrès à l'intérieur
avant de paroître à l'extérieur

signe qu'il sera grave

= si la rougeur et le gonf-
lement viennent au même
tems que la douleur qui leur est pro-
portionnée c'est que le phlegmon est
moin profond

signe contraire

= Cette douleur est très vive
cause fièvre et insomnie
de plusieurs jours

accidens
fièvre
insomnie

= on voit que la douleur
est ... raison du nombre
... d'une partie enf-
lammée ... ait ...

la cause

les doigts présentent sa fracture la plus considérable à une vive douleur par la multitude de leurs nerfs et d'ailleurs les parties étant très serrées les nerfs sont plus longs et plus droits dans le gonflement inflammatoire
= Cette douleur se propage

Propagation de la douleur

le long du bras jusqu'à l'aisselle où les glandes se gonflent ou par irritation sympathique ou par la lésion d'une humeur âcre et irritante qui enflamme les liqueurs qui se portent dans les glandes où il se crée

gonflement des glandes axillaires

tout Cela ne peut pas arriver
sans une fièvre plus
ou moins violente effet
de l'irritation transmise au
système en général par la douleur
d'une grande quantité de nerfs très
considérables en effet les doigts
ont des cordons nerveux volumi
neux qui leur fournissent des
expansions nombreuses ramifiées
le tissu et terminées à la peau
à qui leur doit ~~[illegible]~~ la finesse et la
délicatesse du tact =

Du 2 Brumaire

Propagation de l'irritation à la main — La douleur & le panaris sur-aponévrotique ne se borne pas au doigt
[illegible] on voit le dos de
la main se gonfler se
tendre devenir rouge même
devenir le siège d'un abcès — la
paume de la main en fait
autant et sous l'aponévrose
palmaire existe un gonflement

Du tissu cellulaire le [illegible]
[illegible] en cette partie une
dont très vive = l'irritation
se communique le trajet
a l'avant bras — des nerfs median et cubital
et [illegible] avant le tissu des
environs ainsi que les tendons
du [illegible] et du [illegible]
[illegible] la peau antérieure
de l'avant bras devient
saillante = alors le ligament
annulaire [illegible]
[illegible] les 2 [illegible] de la m[ain]
et de l'avant bras =
= quelquefois l'irritation [illegible]
aux glandes axillaires — [illegible] loin, les glandes
axillaires se gonflent.
[illegible] par l'irritation
qui [illegible]
[illegible] par les mal[...]

mot Saisantes venant d'une plaie faite par des instruments acérés d'un principe d'engourdissement et l'apetit inhibé d'une Sorie portrait dans la Direction

= ces symptomes se modifient suivant l'étalonité de la forme incisante et la sensibilité du sujet

terminaisons — terminaison du panaris

= la plus ordinaire est la suppuration il est rare même de voir un panaris

resolution rare — tout soit peu considerable se terminer par resolution a moins quil ne depende de cause externe comme

gangrene qd. cause externe — d'une corps étrangé qui irrite et qu'on a découvert = par ex = un piquet

Suppuration rentrée	= la suppuration se fait plus ou moins promptement et si l'on attend la manifestation à l'extérieur très souvent
ses effets	nombre de ces abcès se convertissent même souvent remède qu'on a trop attendu =
gangrene quelquefois	= la gangrène est quelquefois la suite du panaris et alors elle paraît venir = tantôt de l'application indue des répercussifs
Effet des répercussifs	qu'il faut jamais proscrire de cette maladie car l'expérience a prouvé qu'ils détruisent la chaleur organique et font le ... et produisent gangrène =
de la violence de l'inflam- tion	= d'autrefois la gangrène est l'effet de la violence

le lin flam = et [illegible] ouvert
on doit plutot l'attribuer
a une disposition de
humeurs et vices [illegible]
disposition generale le
la vraie nature comme de
certaine phlegmone de cause maligne.
= qui devient en [illegible]
abandonné a lui même ?

— il est tres peu [illegible]
il non rendu en [illegible] de la
premiere [illegible] abandonné à lui-
même il se termine par
suppuration apres les [illegible]
vives [illegible] il s'ouvre
de lui même c'est un
pus épais et si point de
l'ondulation guérison cependant
= quelquefois ce pendant il sur-
vient un developpement
du tissu cellulaire qui produit
des vegetations qui sont primer

D'une disposition ulcereuse

Marche d'un [illegible] livre a lui même

leger Suppuration

guérison

végétations

profond dans la 1ere phalange — Mais si dans la 1ere phalange
il est profond et qu'on
fait ell confié à la nature
il est possible que cette
ouverture reste fistuleuse, un
stylet enfoncé sent la phalange
fistule — nude et alors ou le malade
se laisse amputer ou
on laisse faire la nature qui
exfoliation — exfolie, et le doigt est
raccourci à son extrémité
guérison — ce qui est un grand avantage
pour le malade
— Un Parisien du pouce condamné
à la nature, un jeune
homme ouvrit, resta fistuleux
exemple — et la carie s'étendait
jusqu'à la tête de la phalange,
il vint à Paris déterminé
à se faire amputer son
pouce [illegible] était [illegible]
— Mais comme la tête

de la vre phal était rude,
comme pas de gonflement
comme il est désagréable
de perdre le pouce, & comme
peu d'accidens ni de danger
à attendre, j'engage fortement
à attendre. [illegible] [illegible] [illegible]
j'eus de voir [illegible]
[illegible] et avec la même
[illegible] il conseilla retourner
au pays et [illegible]
mois après accident, augmentation
gonflement [illegible] le jeune
homme était revenu à paris et j'engage
amputation ou pouce
au bout de 2 mois exfo-
liation de presque toute la
phalange, diminution de gonflement,
enfin guérison
et quoique cette jeune personne
conserve. lui rend des
services importans

= Donc si le cas de panaris ouvert seul et suivi de fistule avec carie, si pas d'accidens [illegible] m'oblige d'amputer préservez des bains alkalins émolliens et attendez des accidens plus graves pour couper la phalange puisqu'on en voit quelquefois guérir seules =

Quand ne pas se presser d'amputer

= Mais quand le panaris occupe une plus grande étendue du doigt reprend a 2 phalanges etc

= la peau enlevée en avant [illegible] et il y fait une petite ouverture = cependant souvent, la suppuration a usé le tissu et mis a nu la gaine du tendon — le pus est infiltré sous l'épiderme par une petite ouverture à la peau dans laquelle

Panaris occupant 2 phalanges abandonné etc.

peau percée

pus sous l'épiderme

ou ... et introduit un court
a gaine = ... le ...
a été ... coupé la main
a été ... de la main tout cela
étoit fistuleux =

Fistules du doigt de la main

== Si l'on incise longitudinalement la partie antérieure du doigt
on voit les tendons du sublime
et du profond et l'intérieur de la gaine à découvert

On incise

== Cependant ces tendons s'exfolient ... la perte de ... ... pas
... la plaie ...
rapproche le ... guérit
...le doigt roide,
tendu, plus ou moins
... et ... ce dont
il faut prévenir le ...

exfoliation des tendons

guérison avec roideur

== quelquefois abcès à
l'avant bras et ... par

abcès à l'avant bras

important à ouvrir de bonne heure

très promptement convertit cette l'engorgement, qui tuble toujours d'ailleurs et le malheur de perdre le membre = tel est la marche d'un panaris abandonné traité par les bonnes femmes ou des chirurgiens timides qui n'osent pas faire des incisions =

Traitement

Traitement du Panaris

favoriser la suppuration p. les émollients

= Le panaris inflammatoire qui doit se suppurer dont doit tendre à promouvoir la suppuration ainsi appliquer cataplas émollients anodins pour calmer p. élever la favoriser la suppuration

point de répercussifs ni de narcotiques

= l'abstention des répercussifs = aussi emploiera l'opium qui cette circonstance pection.

Car il peut produire gangrene — le Cataplasme de graine de lin et d'eau de guimauve souvent quand le phlegmon est externe; évidemment = les cataplasmes maturatifs :. L'inflam est prolongée = alors graisse rance enfant, l'oseille et farine de graine de lin ou bien oignons cuits sous la cendre avec oseille ou sain doux

= L'inflam est propagée a la main, cataplas. en en lieu l'enveloppant et a chaque pansement, faire fomen. d'eau de guimauve pour detacher le Cataplas et relâcher les parties

= mais ne pas oublier que la suppuration est profonde que la peau resiste et avant de paroitre, le pus detruit

Car des émolliens

Car des maturatifs

Bains émolliens

mais prompte ouverture

les tissus l'inflamm... faisant
les progrès extérieurs, ...
d'abbrevi... ...

= si les chirurg. étaient
assez hardis ou assez
assez patiens pour qu'on
incisât avant le ... apparu
les ... servant à l'abri
des accidens = à
... l'incision, dès le com
mencement ... tout
à coup les accidens
... à la
...

L'incision dès le principe prévient les accidens

= une servante à 22
... où il était
allé avait un doigt
du milieu gonflé ...
causait des ... incon
... beaucoup
les ... de la ... car une fois
... tout ... était éloigné

exemple

Blyer pratiqua sur la partie antérieure du doigt affecté vers la première et la 2e phalange une incision cruciale comprenant peau & le tissu cellulaire mais n'allant pas jusqu'à la gaine = Cette [illegible] à l'incision. il ne sortit que du sang [illegible] [illegible] excellent = sommeil dès cette nuit la plaie suppura & le panaris fut arrêté dans sa marche =

Autre

= Un Curé de l'ancien régime était renommé par la cure des panaris voici ce qui lui valait cette réputation =

= Aussitôt qu'il reconnaissait des [illegible] attaques de panaris quelqu'un fut [illegible] il pratiquait sur la partie antér.e du doigt une incision cruciale à laquelle les paysans attribuaient une grande vertu à cause de la figure -

Mais cette incision était
d'autant plus efficace qu'elle
coupait en travers les nerfs
qui se rendent aux doigts =

avantages de l'ouverture prématurée

Voici l'avantage d'ouvrir
de bonne heure les panaris
qui siègent à la ...
devant ~~[illegible]~~ la 1ère
et 2e phalange
= c'est qu'on arrête
l'inflammation, prévient la
suppuration et ... de
l'inflammation du tissu qui
entoure la gaine et
même les tendons
= or rien de si
avantageux que de conserver
les doigts dans
l'état naturel. Sans
cela on serait estropié quoique

l'exfoliation des tendons "donne aussi re" ne peut procurer guérison qu'en faisant adhérer le tendon aux parties voisines, il en résulte roideur du doigt qui n'est plus susceptible de flexion &c.

= Mais si les sujets refusent, il faut leur exposer les suittes afin qu'ils ne disent pas qu'ils se seraient déterminés s'ils avaient connu les résultats = Q. le panaris est très avancé ouvert seul ou non ouvert,

quand un panari se présente toujours ouvrir

sitot le sujet determiné il faut ouvrir, aller toujours pour l'étendue de la cheville. mais dire que si le tendon est découvert le doigt restera roide =

mais si tendons denudés doigt roide.

= un Cuisinier sujet des cataplasmes sur un

exemple

[illegible] qui [illegible] [illegible] que
panaris s'ouvrit s'en
point d'autre changement
que diminution les douleurs
enveloppe légère
= il vint beaucoup Nargeo
qui ouvrit pour découvrir
le tendon et le [illegible]
[illegible] procura la sortie du pus qui
et corps irritant = il lui fallut
[illegible] ensuitte d'autres
petite [illegible], enfin le doigt
guérit Mais il resta
droit et [illegible] lorsque
le chirurgien le fit amputer

= Le panaris avec
tendon gangrené non à
découvert pansement avec [illegible]
cataplasme pour demi
bains émollients
en attendant l'exfoliation
= elle se fait le
doigt guérit mais

pansement
quelque soit
l'état
___

il reste droit et gros

= mais suivant ce livre

Si abcès à la main	toujours même quand des inennons [?] considérables ont été faites il se forme souvent des abcès au dos de la main ou dans le creux de la paume de la main = il faut inciser jusqu'au fistule, le peu perte de la peau au dos, en fin pour absorer et promptement =
incision	
à l'avant bras	= si abcès à l'avant bras et pus sur le muscle carré pronateur et si le tibia qui s'enrichen [?] s'étendant jusqu'à la ligne et du profond, il faut la suppuration.

manifeste ouvrir l'abc-
ouverte sitot — le pus se separant d'un
pu formé — côté à l'autre et
un sang or.
= il faut toujours ouvrir
quand on se trompera
sur le siege du pus
Dût ou — on s'exposer a toujours
manquer — le vide — cela m'
le foyer — est arrivé il ne sortit
que du sang et
cependant desgorgement puis
ou par degrés guérison
= quelquefois hemorrhagie
venant de l'ouverture
Si hemorrha- — de l'artere qui suit
gie — le nerf median et
passe avec lui sous
le ligament annulaire
= il ne faut pas attribuer
cela à l'artere cubitale

quand l'incision est au lieu
du bras du reste on en fait
la ligature la compression vient dans
une

ligature

— On a recommandé de
ne pas couper la gaine
des tendons des fléchisseurs
et cependant les tendons
n'étant pas retenus le
mouvement est gêné, mais
à cet une raison pour se dispenser de
faire des incisions dans la
en les faisant plus
paume de la main il faut
aussi faire les incisions
nécessaires pour débrider
l'aponévrose, avec la précaution
de ne pas couper profondément

Précautions dans les incisions en général

— quelque soit le moyen
il reste toujours une raideur
que l'on diminue par les
bains émollients, en
plongeant le bras dans un
animal nouvellement tué
et par les bains d'eaux minérales

il reste toujours raideur

Du 3 Brumaire

Plaies par les animaux

Des Plaies faites par des animaux =

— ils sont sains ou affectés d'une virus qui peut se communiquer par la morsure

Morsures des animaux sains

= Les Plaies par morsure d'animaux sains une [illegible] un cheval ne present rien de plus que les plaies des [illegible] qui [illegible] les [illegible] des plaies [illegible] contuses

Ce sont des plaies contuses

sont suivies de plus d'irritation que les tranch[illegible] simplest — d'où en consequence qu'on [illegible] et [illegible] des [illegible]

guerissent plus lentement surtout s'il y en a plusieurs dans le même endroit

— quelquefois l'irritation de ces plaies est si considérable que le tetanos en est la suite
(marginal note: plaie entrainant le tetanos) on en a nombre d'exemples
il en a eu un a Auteuil un homme blessé au bras par son cheval qui lui fit une plaie avec dechirement il fut attaqué de tetanos et le malade mourut

— Mais les plaies meritent surtout attention quand l'animal est attaqué d'une (marginal note: morsures des animaux enragés) maladie qui peut se communiquer par l'absorption comme les animaux enragés, les vipères (marginal note: meritent attention) sans parler du serpent a sonnette qui n'existe pas dans ce pays

Des morsures des
animaux enragés

Ce qu'est la rage

la rage est une maladie particulière dans laquelle les personnes ou les animaux affectés ont une repugnance invincible pour les boissons également une horreur extraordinaire pour les corps brillants qui pourraient rappeler l'image de l'eau. à leur aspect ils manifestent un mouvement d'horreur et d'indignation qui va jusqu'à produire des convulsions

Ce qu'offrent les cadavres

les organes de la déglutition et de la respiration sont affectés — il parait que les muscles du pharynx sont dans un état d'irritation et la membrane interne du larynx enflammée pendant que les organes salivaires filtrent abondamment

une salive infectée susceptible
de transmettre le virus
par l'absorption — les
terminaison de la rage — convulsions augmentent au bout
de quelques jours le rien
mort ou milieu de
ces mêmes convulsions violemment
atroces

se communique par une morsure — = cette maladie comme seulement par ses effets peut
être communiquée lorsque la
salive d'un animal
infecté est appliquée même
en très petite quantité
sur la plus légère
blessure =

une personne est mordue — = la première chose à faire
quand une personne est ... été
mordue d'un animal
constater la rage — enragé est de ...
s'assurer si ... l'animal est effectivement ...

ent curage

= or cela est bien difficile l'animal s'échappe aux poursuites il ne reste que des incertitudes et pour le seul et rien n'offre la conviction au médecin

difficile.

les chiens sont très exposés à la rage

= de tous les animaux qui sont affectés de la rage le chien l'est le plus souvent de tous

signes qui font connaître un chien enragé

signes qui annoncent dans ces la maladie

= air triste abbatu quoique cependant ils sont encore toute quelle route faire ils s'en vont chancelant au lieu d'avoir une marche assurée = ils sont reconnaiss. leurs maîtres daignent leurs caresses et ne s'imposent à les morde-

= Cette passion de Mordre est telle que les enragés s'y se jettent sur les personnes et les animaux et mais encore sur les corps inanimés —

= ils ont répugnance pour l'eau qui leur fait donner des marques d'horreur et entrer en convulsions — la salive coule abondamment de leur gueule, et en 3 à 4 jours libres ou renfermés ils périssent —

= il est encore d'autres indices la Communication de la maladie a affecté a un animal mordu c'est un signe que les personnes mangent

horreur de l'eau

mort

autre signe la communication

mesure des travaux de la rage — lorsqu'aucune personne est mordue les travaux sont proportionnés à l'endroit de la blessure et à la profondeur de cette blessure

partie nue plus de danger — si c'est une partie habituellement à nud les mains le visage le danger est plus grand que quand la partie est couverte de vêtements épais. de sorte que peu de salive a pu être imbibée = car (271)

vêtue, moins — la quantité de pus ou absorption qui est la mesure du danger

plaie profonde beaucoup — par la même raison les plaies profondes sont beaucoup

plus dangereuses que
lorsque la peau est a
peine entamée =
= De même outre
morsure — le danger sera plus
multipliées — grand si les plaies
beaucoup — de morsure sont multipliées
plus il y a eu
de facilité a abreuver tous
les endroits imprégnés de salive —
= Mais indépendamment de ces
circonstances l'état moral
de la personne influe sur
crainte inquiétude — l'événement d'une manière
sûre — les personnes
pusillanimes celles qui
beaucoup — sont frappées de l'idée
de la rage qui la
redoutent beaucoup,
sont plus exposées
que les petits [illegible]

intrepidité
de coeur

---

epoque vers le developpement de la rage

---

et toutes inde feroces ou tres grandes - on a remarqué que la securité etoit un des meilleurs moyens de prevenir le developpement de la rage - donc des les moyens à employer pour prevenir cette rage il faut faire entrer tout ce qui peut rassurer

= la rage resultant des morsures des animaux enragés se declare plus ou moins longtems après la blessure - tantot 20 = 30 = 40 jours après l'accident = quelquefois 3 ou 4 mois

on a le même des dépôts
de plusieurs années. Mais
règle générale c'est
dans l'espace de 8 à 10 jours
= la plaie de la case
se couvre 9 fois sur 10.

signe de
le développe-
-ment

tumeur = alors une répugnance
insurmontable pour les boissons
quand on les leur
présente elles sont malades
elles ont horreur qui
les éloigne = bientôt
l'envie de mordre vient
on en voit même
qui écrivent que cette
passion s'était devenue
= la salive coule
ils la crachent abondamment
— l'horreur de l'eau

augmente — les convulsions viennent et en 3 ou 4 jours le sujet périt

= a l'ouverture on trouve d'horrieux d'un ou moins de flammèches en cette aucune autre vestige nulle part

ouverture des cadavres

—

Traitement

Traitement d'une plaie d'un animal enragé

= on peut prévenir mais en y cherchant à temps et employant les moyens convenables — mais plus tard q'd elle est manifestée nul moyen ne reste

on ne peut que prévenir

moyens externes

= pour prévenir —

= faire vivre partie mobile. des ablutions

—

réunions	tous leurs sortimées
	faisant tomber de l'eau
	tiède sur la plaie
	au d'un pot, ou y
	exprimant un linge &c
	ayant soin de bien
	essuyer pour enlever
Degorgement	exactement la salive et
	faire beaucoup saigner pour
	la même raison
	= la plaie bien dégorgée
Cautérisation	il faut cautériser
	la plaie pour detruire
	la partie infectée du virus
	lyssiph. et empecher l'action
	des vaisseaux lymphatiques
	de la partie qui en
	absorbant ne manquer
	aient pas de porter le virus a
	tout le systême =

Choix des Caustiques

= Pour foutenir on se servira tantôt du cautère actuel tantôt du potentiel

Cas du Cautère actuel

= l'actuel souvent quand la morsure est près d'une partie important ou le caustique pourrait étendre son action qu'on ne peut borner comme au visage près les yeux près les yeux &c = mais comme malgré son appareil d'ominéable il brule plus profondement son progrès, en général toutes les fois que la prudence permet de s'en

Cas du Potentiel

servir, les cautères potentiels la préfère

souvent, ou mieux le
beurre d'antimoine qui
produit facilement en un
instant une escarre de 2
lignes — pour l'appliquer
tantot on se sert

Moyen de l'appliquer

d'un pinceau trempé
dedans, ou, d'un
morceau de bois taillé
en cône imitant la
dent de l'animal, pour
l'enfoncer dans les plaies

—

— mais toujours il faut
l'agrandir en scarifiant

Précautions en cautérisant

un peu et toujours
brûler plus que moins
évitant le pénis, les vaisseaux
les ligaments, les tendons
qu'il faut cautériser

—

Je n'ai pas mettre a decouvert

= on a encore proposé les carificat. ablation de la partie, l'application des ventouses a pointes et carifications = mais l'experience a appris que l'application du causti: plus prolonge est le meilleur moyen que l'on puisse employer pour neutraliser le virus et detruire la partie

Autres moyens externes

Leur preferer le caustique

= Dans les cas douteux le malade étant inquiet, il faut agir comme si l'on avait la certitude, car on se reprocherait toujours

Conduite dans les cas douteux

d'avoir négligé des moyens
moins vite quand de aucun
pour lui ? utile =

= il n'y a pas de
Songer a faire une application
le sude en est quitte
pour une plaie qui
guerit aisement, tandis
que si on neglige
on s'expose a voir au
bout de 40 jours &c.
paraitre l'hydrophobie.

avantage de toujours cauteriser

moyens internes

= outre la cauterisation
on ne doit pas negliger
les autres proposés et usités = plusieurs
il y en a nombreux
et surtout le mercure
a fixé l'attention des observateurs
douce pour plus de

le mercure

les discours rassurans

faire saliver

antispasmodiques

souvent il faut l'employer en friction et a l'interieur mais le plus efficace des moyens ce sont les propos rassurans — on lui dit que ce l'animal n'était enragé, on a la certitude par nombre d'experience que les moyens que l'on emploie les mettront a l'abri de la rage —

— on donne le mercure friction et mercure pour faire saliver — on soutient la salivation quelque tems = 20 ou 30 jours et l'on associe les

antispasmodiques —
les moyens réussissent
ont-ils été réellement pré-
venir la rechute

— Mais si par de
l'autorisation ; ou si trop
tardive, ou si pas assez
profonde, la rechute se
développe et plus
de ressource — aucune
observation ne constate
d'une manière positive
la guérison de personne
par lesquelles l'horreur
de l'eau s'était manifes-
tée, tous les faits cités ne
sont pas assez authen-
tiques pour compter
sur leur véracité

(l'horreur de
l'eau mani-
festée
plus de
remède)

Ces moyens ont souvent reussi —

quand aux moyen preservatif cy dessus quoi qu'on puisse croire qu'ils ont été administrés plusieurs fois a des personnes mordues de chiens non enragés ou qui n'auroient pas enragé — cependant on ne s'auroit s'empecher de croire que plusieurs personnes qui ont été preservées par ces moyen auroient veritablement enragé si l'on ne leur eut administré aucun remede

Dans la Belgique il y a un certain Prestre de Marconnis ou sont deposées les Reliques de St Hubert — les

dans ce lieu
guerisons operées sur grand
nombre de gens mus[illegible] mordues
de chien enragés inspire
une grande confiance au
peuple qui accourt de toutes
parts pour implorer le
secours du saint. Ce
saint bienfaisant se sert
du ministère des chanoines
pour mettre les personnes
mordues a l'abri de la
rage. et voici comment ils
s'y prennent. ils font rougir
la clef de leur patron et
l'appliquent mysterieusement
sur la plaie en proferant
certaines paroles mystiques
cet instrument, quoique tout
bien un autre, aussi effec
tivement le plus souvent
en detruisant la portion
imbibée de la salive de
l'animal ou empoisonnée ou
verolé non et les funestes effets
qui auraient eu [illegible]

Morsure de la vipere

Du Le Commaire.

De la morsure de la vipere

Le quatre venin de la vipere

Celui de la vipere produit les effets les plus facheux

De toutes les morsures des animaux qui peuvent introduire dans l'economie un principe delettere, capable d'en troubler les fonctions d'une maniere plus ou moins energique, celle de la vipere est celle ... qu'en ... les animaux elle peut ... de la ... une matiere ... particuliere laquelle est un veritable venin qui tue les animaux. C'est ainsi que la vipere tue les rats et les souris dont elle fait nourriture

La vipere n'attaque l'homme que ...

en l'irrite mais alors
elle lui fait une morsure
dans laquelle elle lance la matière
susdite qui est bien
dangereuse mais non mortelle

il n'est pas mortel

(aucune observation ne constate
positivement qu'une personne
mordue ~~par~~ une vipère ait
perie de cette seule morsure

= Mais les accidens qui
en resultent sont plus ou
moins graves suivant que
l'animal est plus ou moins
vigoureux et suivant
que la vipère est plus
ou moins irritée
lors bien irritée elle lance
plus de venin et le
venin est plus actif

Ce qui rend cette morsure grave..

= Mais ce qu'il y a
de sûr en prenant soin
on avale impunément le venin de la vipère — qu'on peut l'avaler
sans incommodité tandis
que le venin introduit
par la morsure de l'a-
nimal produit les
accidents suivans

accidens qui resultent de la morsure d'une vipère — = accidens qui suivent
la morsure de la vipère
— ils sont locaux
et généraux =

locaux
= la morsure est suivie
immédiatement d'une douleur
accidens locaux — extrêmement vive comme de
brulure — cette douleur
ne se borne pas au
lieu blessé, elle s'étend

Au long de le membre
du doigt par exemple, il se tend
jusqu'a l'aisselle elle est
suivie d'un gonflement
le membre est luisant
et se couvre de taches
quelquefois qui lentement
la gangrene se declare

= generaux

accidens généraux

= trouble de l'economie
aussitot apres le gonflement local
= angoisses a la region
precordiale nausées
vertiges la vue s'obs
curcit meme quelquefois
mais de tous les symp-
tomes le plus inquietant
est l'etat d'oppression
et d'angoisse de la poitrine

jouit a un état de
prostration considérable comme
quand tout principe délétère
agit sur l'économie

Si la mère est
abandonnée — les enfants
se sentiront quelque
temps — puis graduellement, la
tension diminuant, les
symptomes se dissipent
mais on a remarqué
que les enfants
guérissent très difficilement
se rétablissent très lente-
ment quand on fait
un traitement quoi
qu'aucun ne résulte
de la suite de cette manière

Marche de la phtisie abandonnée à elle même

traitement des anciens

Traitement des anciens

Les anciens traitaient cette maladie comme toutes les affections malignes où le principe vital est attaqué par une cause délétère qui opprime les fonctions vitales. Ainsi la thériaque ou le [illegible] sur la plaie, le même remède ou d'autres alexipharmaques à l'intérieur étaient les moyens des anciens, le remède [illegible] l'établissait mais la maladie devait être long-temps qu'elle ne dure après le traitement actuel

embrocations d'huile d'olive proposées

= on a aussi propo[sé] l'huile d'olive pour faire des embrocations sur la plaie A cela a reussi sur un morceau de vipères qui se faisait mordre a dessein pour faire des experiences

traitements des modernes

— traitement d'un pou[r] bien

pour la morsure d'une vipere irritée

= lorsque la morsure a été faite par une vipere bien irritée qu'elle a mordu profondem et qu'il soulache vive

= il faut s'attacher a detruire de la

plaie le virus qu'il faisant que l'animal y introduit = puisque le venin s'absorbe sous celui de la rage il faut le détruire comme lui = aussi Fontana a-t-il reconnu que le meilleur moyen pour prévenir les accidens était la cautérisation

Cautérisation

= On pourrait donc suivant le conseil de ce savant cautériser la plaie en cautérisant toute l'étendue soit avec un morceau de potasse caustique ou d'un morceau de bois

Choix du caustique

—

en cône tronqué de
le Muriate d'antimoine (?)
en forme de la plaie, en
réitérant autant qu'il le faut
pour bien cautériser, tout =
= si la plaie était [illegible]
il faudrait [illegible]
pour l'agrandir [illegible]
[illegible] on y applique le caustique
pour toute sa [illegible]

Moyens internes

Remèdes internes sont
les Cordiaux propres à
augmenter l'action du
cœur et à mettre
le principe de la vie
en état d'expulser
ce qui a été absorbé
du virus

Cordiaux

— L'expérience a appris

l'ammonia-
que

l'eau de
luce

que le meilleur moyen
était l'ammoniaque ou
alkali volatil donné
a dose assez forte
pour exciter la sueur
avant les recherches de
fontana on regardait beau
[illegible] luce ou l'ammoniaq
avec l'huile de succin
comme un moyen effica
tant appliqué sur
la plaie que donné
de tems en tems à dose
de 5 ou 6 gouttes, un
verre d'eau jusqu'à
produire des sueurs
mais aujourdhui au lieu
d'ammoniac sur la
plaie ou fouterire et
l'on donne l'ammonia
que

a l'intérieur

= Cependant si la piqure étoit faite par une vipère en colère, l'on pourroit se dispenser de la cautériser, alors ammoniaque sur la plaie et des embrocations faites avec de l'huile tiède et l'usage interne des excitans, sont les remèdes qu'on applique et qui suffisent pour dissiper les accidens

= on voit bien qu'il y a similitude de communication entre les deux venins

pour la morsure d'une vipère peu animée

ammoniaque sur la plaie


embrocations huileuses


Comparaison du virus rabieux et de celui de la vipère

rabieux et de la vipère, tirant les accidents qui en resultent sont bien differens l'un etant mortel la rage l'autre ne l'etait pas le venin de la vipère

= De Juni et l'autre car la fermentation est le seul moyen de prévenir l'absorbtion et ses suites

= voyez l'ouvrage de Fontana, ce que Mr Garnier a ecrit la dessus et les memoires de l'academie des sciences =





11 Blank Leaves Not Scanned

